

ANATOMICE

ALEXANDER
BENEDICTUS


1514










200









CAlexandri Benedicti
physici Anatomice siue
historia corporis hūani.

Eiufdem collectiones
medicinales seu aforismi.

Venales habentur Parisijs in officina Henrici Stephani chal-
cographi/e regione scholarum Decretorum.

249
¶ Primo libro de vtilitate anatomices, de membrís si-
milaribus & dissimilaribus tractatur.

Secundo, mēbra naturalia & genitalia continētur.

Tertio, spiritalia (quę supra septum transuersum ha-
bentur) tractanda sunt.

Quarto, cerebrum & capitis partes, & multorum ner-
uorum ratio describitur.

Quinto, de venis, arteriis, spinę medulla, musculis, os-
sibusq; denarratur.

Libro primo hæc continentur.

Præfatio ad diuum Maximilianū Cę. Aug.

De vtilitate anatomices, de cadauere eligendo, deq;
theatro temporario constituendo cap. i.

De humani corporis figura & dignitate. cap. ii.

De corporis partibus quę extrinsecus cernūtur et ea-
rum nominibus. cap. iij.

De humorum et membrorū qualitatibus cap. iiij.

De membrorum functionibus cap. v.

De ossibus et eorum natura cap. vi.

De chartilagine cap. vii.

De neruis cap. viij.

De natura arteriarum & venarum cap. ix.

De musculis siue lacertis cap. x.

De omentis cap. xi.

De adipe & medulla. cap. xii.

De cute cap. xiii.

De vnguibus cap. xiiii.

Libri secundí capita hæc sunt.

Præfatio ad amicos cap. i.

De ventre & vmbilico cap. ii.

De sumine cap. iii.

De musculis ventris
 De peritoneo & omento
 De intestinis et primum de aluo
 De colo et ceco intestino.
 De tribus grandioribus intestinis
 De mesenterio & venis eius
 De stomacho
 De adipe et pancreo
 De liene
 De iecore
 De venis iocineris
 De flauæ bilis folliculo
 De renibus
 De venis seminariis
 De semine
 De testibus
 De scorto
 De pene
 De vesica & eius meatibus
 De mulierum meatibus seminariis
 De locis mulierum
 De mensibus
 De ano

Libri tertii capita.

Prefatio ad amicos
 De membris spiritalibus
 De septo transuerso
 De mammis
 De musculis pectoris
 De pleuretica membrana
 De pulmonibus

2
 cap. iiii.
 cap. v.
 cap. vi.
 cap. vii.
 cap. viii.
 cap. ix.
 cap. x.
 cap. xi.
 cap. xii.
 cap. xiii.
 cap. xiiii.
 cap. xv.
 cap. xvi.
 cap. xvii.
 cap. xviii.
 cap. xix.
 cap. xx.
 cap. xxi.
 cap. xxii.
 cap. xxiii.
 cap. xxiiii.
 cap. xxv.
 cap. xxvi.

cap. i.
 cap. ii.
 cap. iii.
 cap. iiii.
 cap. v.
 cap. vi.
 cap. vii.
 a. ij.

De trachia arteria	cap. viij.
De venis & arteriis in pulmone	cap. ix.
De cordis principatu	cap. x.
Quibus magna sunt corda	cap. xi.
Quare manus dextra, sinistra accommodatior sit	ca. xii.
De cordis ventriculis	cap. xiii.
Quæ in dextro specu contineantur, & de venis eius	ca. xiiii.
De medio cordis domicilio	cap. xv.
De specu sinistro	cap. xvi.
De gula	cap. xvii.
De epiglottide & arteria	cap. xviii.
De tonsillis & vula	cap. xix.
De palato	cap. xx.
De lingua	cap. xxi.
De dentibus	cap. xxii.
De labris et gingivis	cap. xxiii.

Libro quarto hæc describuntur

De capite	cap. i.
De intellectu hominis diuino	cap. ii.
Quæ cerebro contineantur	cap. iii.
De capillo	cap. iiii.
De cute capitis	cap. v.
De exteriori membrana calvarie	cap. vi.
De calvaria	cap. vii.
De futuris calvariae	cap. viii.
De membranis interioribus	cap. ix.
De cauis cerebri	cap. x.
De cerebelli sinu	cap. xi.
De tramite medio inter utrumque sinum	cap. xii.
De ceteris cerebri partibus	cap. xiii.
De septem neruorum syzygijs secundum veteres medicos.	cap. xiiii.

De nervis oculorum secundū Aristotelem.	cap. xv.
Secunda neruorum coniugatio.	cap. xvi.
Tertia neruorum syzygia.	cap. xvij.
Quarta syzygia.	cap. xviii.
Quinta syzygia.	ca. xix.
Sexta neruorum syzygia.	cap. xx.
Septima syzygia.	cap. xxi.
De syzygijs alia obseruatio.	cap. xxij.
De reticulo admirabili.	cap. xxiiij.
De capitis osse validissimo.	cap. xxiiij.
De oculis.	cap. xxv.
De causis colorum in oculis.	cap. xxvi.
Qui oculi acute cernant.	cap. xxvij.
Quæ vitia oculorum sint.	cap. xxviii.
De membranis oculorum.	cap. xxix.
De cornea oculi.	cap. xxx.
De funda oculi.	cap. xxxi.
Secunda & tertia oculorum tunica.	cap. xxxij.
Alter numerus membranarum oculi.	cap. xxxiiij.
De humoribus qui inter tunicas sunt.	cap. xxxiiij.
De hyaloide humore.	cap. xxxv.
De crystalloide.	cap. xxxvi.
Quomodo suffusiones manu curentur.	cap. xxxvij.
De auribus.	cap. xxxviii.
De naso.	cap. xxxix.
De maxilla inferiore.	cap. xl.

Libro quinto hæc narrantur

De venis, musculis, ossibus, nervis, cum præfatiōe ad amicos.	cap. i.
De sanguine & spiritu.	cap. ij.
De vena maiori & aorta.	cap. iij.
	a. iij.

De ramis venæ maioris et ahortę.	cap. iiii.
De vena medię frontis et temporum	cap. v.
De communi vena brachii.	cap. vi.
De venis quę renibus copulantur.	cap. vii.
De cæteris venis.	cap. viii.
De ahorta.	cap. ix.
De arteriis crurum.	cap. x.
De venis et arteriis quę mutuo inter se rñdent.	cap. xi.
De mēbris ad quę sanguinis venę tantum deriuāt ad quę ahorta dūtaxat vel vtraq.	cap. xii.
De fibrarum ratione.	cap. xiii.
De neruorum origine	cap. xiiii.
De neruis qui ex spina medulla oriuntur.	cap. xv.
De ceruicis neruis	cap. xvi.
De lumbis	cap. xvii.
De musculis	cap. xviii.
De musculis thoracis	cap. xix.
De brachiorum musculis	cap. xx.
De dorsi musculis	cap. xxi.
De crurum musculis	cap. xxii.
De ossibus, & primū de ceruicis vertebris	cap. xxiii.
De spina	cap. xxiiii.
De medulla vulnerata & spina luxata.	cap. xxv.
De scoptulis opertis & humero.	cap. xxvi.
De brachio	cap. xxvii.
De manu & eius prolapsu	cap. xxviii.
De ossibus inferioribus	cap. xxix.
De coxa & pectine	cap. xxx.
De scemine & eius prolapsu	cap. xxxi.
De cruribus & patella	cap. xxxii.
De maleolo siue talo & eius prolapsu	cap. xxxiii.

De calce & digitis
Laus dissectionis

4
cap. xxxiiii.
cap. xxxv.

Auctores quos in hac historia secuti sumus hic prete-
ximus, nō ingrateq; eos suis locis nominamus, ne in
furto deprehendamus manifestum.

Ex grecis:

Hippocrate, Platone, Aristotele, Galeno, Polluce,
Ruffo, Alexandro Aphrodisieo.

Ex latinis.

Lucretio, M. Varrone, M. Cicerone, Cornelio Celso,
C. Plinio, A. Gelio, Macrobio, Lactantio.

a. iij.

Quintij Hæmiliani Cimbriaci Poetę Hendecasyllabico epos in anatomicen Alexandri Benedicti Veronensis ad lectorem.

Quorsum sidereos globos nitentes,
Aut tractus pelagi remotiores
Scrutari iuuat, exteramq; Tulem?
Si quę sunt propius, suaq; sponte
Occurrunt meditatio reposta,
Ac sic obuia negligis tueri?
Audi quid tripodes sacri loquuntur,
Ne erres, ortygos, aure de vapore,
Te ipsum noscito. Non iubent subire,
Qua mundi celeres rotantur orbes,
Fac sic, & sapiens decem Cleanthas,
Ergo, vt te pariter queas videre,
Et tanquam in speculo reciprocanti,
Interna omnia membra visceratim,
Pæanti legito resectiones,
Scitas (Iuppiter) & bene expolitas,
Quas si legeris, & videbis intus
Quæ natura oculis negat patere,
Istuc transpicere, et tueri ad vnguem,
Plus est, q̃ æthereas plagas subire,
Metiriq; animo domos deorum.

ALEXANDER BENEDICTVS VERO-
NENSIS PHYSICVS MAXIMILIANO
CAESARI AVG. ROMANORVM RE-
GI INVICTISS. SAL. Perpetuā Dicit.



Istoriā hūani corpis ,
quā anatomicen grēci,
nos mēbrorū resectio-
nem vocam⁹, tibi Ma-
ximiliane Cæsar Au-
guste dicare cōstitui, o-
pus a phīa ad medēdi
vtilitatē conditū, vbi cō-
ditoris dei opificiū mi-
rabile diuinūq; perspi-
cimus. hoc est, corpus
(vt iquit Plato) aīe qua
si vehiculū tēporariū,

vnde fœlices etiā inspecciónes (quas theorías vocant)
imágenes siue phātasīę, cogitatiōes, memoria, ratioq;
orianť, cōsideram⁹. pro quib⁹, oculos, aures ceterosq;
sensus in corpore patefecit naturalis solertia, vt p̄ eos
aditus, scientia pueniret ad mentē. Medēdi quoq; ra-
tio omnis, vsusq;, ac chirurgica disciplina hinc pēdet.
Quando quidā morbi, plura mēbra vel singula inua-
dunt, vel si abscessus innascunt, aut vomica intus latē-
tat, aut vulnera inferuntur, aut mēbrū cōuellitur, aut
luxatur, aut quid simile euenit, nichil horū sine huma-
ni corporis dissectione recte dephēdi potest. Ex hac
diue Imperator qui religione moribusq; & doctrina
pręstas, deū illū mundi procreatorē, rerum omniū cō-
ditorem, ex intima veluti naturę contēplatione, & offi-

cina arcani operis egrediēs, cōtabūdus religiōsius ve-
neraberis, qui nichil ociosū, nichil inane cōfingit. Et ad
mundi vniuersi habitū facili⁹ oculos cōferes, cuius spe-
ciē pusillus homo refert. Singulatim prēterea mēbro-
rum omnium potētiam cognosces. eorūq; nomina tā
græca q̃ latīna, omīssis barbaris, pcurres. quę Pollux
author exquisitissimus, ad Cōmodum Cæsarem sum-
matim persecutus est. Quæ si videre volueris (chirur-
gis, horrido resecandi officio, & medicis, materia suo
theatrali digna spectaculo, relicta) subtiliusq; perscru-
tari cuiusvis particulæ vires variosq; effectus, tuæ ali-
quando licebit maiestati de naturę munere effusim di-
iudicare. Decuit & Alexādrum magnū, cupidine no-
scendi animalū naturas & proprietates, inter tot, tan-
tosq; rerum gestarū triumphos, insectorū etiā vires
intelligere. In Aegipto (qđ maius est) reges ipsos, cor-
pora mortuorum ad scrutandos morbos insicare solī-
tos, scribunt. Hanc philosophiæ partem, quam medi-
cinę ars ex disciplinę cōfinio in sese familiarius recepit,
tibi dicare decreuim⁹. nichil enim maius quod te prin-
cipe dignū nobis esse videretur offerre potuimus, hoc
munusculo tibi litandum censentes, quod religiōse do-
narijs tuis iā diu cōsecrauimus, quoniam plebs, nobi-
litasq; non eodē modo deo supplicant, adorantium ta-
mē preces parī gratia suscipiuntur, nec carmē cōposi-
tum, rusticæ præfertur garrulitati. Neq; id facimus vt
te immortalē mortales reddamus, quippe qui immor-
talis, & diuis simillimus genitus es princeps. Nec no-
bis elaborandū est, vt tibi maior gloria comparetur,
qui per te humanitate, pietate, abstinentia, liberalitate,
iustitiaq; admirabili, vel teipsū vincēdo maximū pos-

fides triumphū. Tu eapropter Cæsar Aug. omnium
 consensu, & parens reipu. christianę semp optatus es,
 et iampridem electus. Itaq̃ inter laureas coronas, hu-
 manissime princeps hos libellos de historia membro-
 rum hominis, quos latinos pro virili parte fecimus, su-
 scipias. in quibus nō sine aliquo labore multa annota-
 uimus, quę a recentioribus prætermissa sunt, qui lati-
 nam linguam externis, immo barbaris vocabulis va-
 rijsq̃ erroribus dedecorarunt, miliaq̃ vulnerū medi-
 cinę studijs sua inscitia intulerunt. quę iuniorū ętas in
 tanta rerum caligine misere secuta est, et barbarie fla-
 tu præceps impulsæ cernitur. Vnde medicinę nomen
 a gręcis ad arabes iam diu translatum est. Quo succes-
 su, ita arabica creuit audacia, vt de medicinę origine
 palam cū gręcis contendere audeant. At furta rapi-
 nęq̃ in hac arte præsertim deprehenduntur. Scio ple-
 rosq̃ priori rubigini assuetos, qui hæc ceu inania & si-
 bi iaudita adunco suspendent naso. Hi hoc vnum sci-
 ant, nos nō sibi, si nostra displicet, sed tibi Princeps hu-
 manissime, & latinę linguę prestitisse. Has itaq̃ nu-
 gas nostras cum per ocium licuerit, leges. Quę si præ-
 maturius q̃ volebam æditę sunt, id in causa fuit, q̃ mo-
 rę impatientes, vt te ocius salutarent, abortiendū pe-
 riculum nō extimuerunt. Vale diue Aug.

Venetijs.

M.IIID.

Calendis aug.

Alexādrī Benedīctī Veronensis, phisici, hīstorię
corporis humani Liber primus.

De vtilitate anatomices, & de cadauere eligēdo, deq;
temporario theatro constituendo. Cap. primum.



Nocentes homines ex carcere acceptos, viuos resecasse, reges ipsos publicę saluti consulentes traditum est, vt spiritu etiā remanente, naturę arcana, & quid natura magna solertia intra se agat, pquirent, membrorum posituram, colorem, figuram, magnitudinē, ordinē, processum, recessumq;, ex quibus multa in defunctis mutantur, distincteq; magis q̄ pie annotarēt, vt illatis vulneribus, quid integrum, quid corruptum sit intelligeretur. At id religio nostra vetat. quoniā truculentissimum est, vel carnicī horroris plenū, ne morituri inter tātos cruciatus desperatiōe futurę vitę spem misere amittāt. Hęc barbari externiq; ritus, qui excogitarūt faciāt, qui ea piacula et ostēta adamāt. At nos clemētius viuīs parcētes noxiorū cadauerib⁹ intima, atq; naturę arcana indagabim⁹. Obseruauereq; priores medici, vt si qui ignotis morbis interiissent, dissectis cadaueribus, occulta morborū initia perscrutarēt, vt parī exēplo viuīs prodesset. Idē in sinia sua facere Galenū nō pudit ignota mortis causa. sicut et nos in morbo gallico fecimus. Hūc resecādi modū pōtificales cōstitutiōes iā pridē p̄ misere, alias execratissimū, atq; abominabile, siue irreligiosū haberēt. Eorū p̄terea animę purificatiōibus p̄ ritu occurrit, atq; offēsiōnē eorū p̄cib⁹ ppiciam⁹. Idq; ipsi quādoq; viuētes in custodijs petūt, vt potius medicorū collegijs tradātur, q̄ carnicis manu publice tru-

cidētur. Nec huiusmodi cadauera sine pontificū consensu attingi possūt. Ad resectionē igit̃ ignobiles, ignoti, ex longinquis regiōibus, sine vicinitatis iniuria, p̃p̃inquirūq̃ nota, iure dūtaxat peti possūt. suspēdiōq̃ strāgulati deligūtur, mediocris etatis, nō gracilis, non obesi corporis, stature maioris, vt vberior materia, eui dentiorq̃ sit spectantibus. Ad hoc pergelida hiems requiritur, ne cadauera protinus putrefiant. Loco p̃terea amplo perflatili, tēporarium theatrū constituendū est circūcauatis sedilib⁹, quale Romæ ac Veronæ cernitur, tantę magnitudinis, vt spectantiū numero satisfaciāt, ne vulnerum magistri, qui resectores sunt, a multitudine perturbētur. Hi solertes esse debēt, quiq̃ sēpius resecauerint. Sedēdi ordo pro dignitate distri buendus est. Ob id p̃fectus vnus esse debet, qui omnia intueatur, ac disponat. Custodes dādī sunt, qui ingredientē importunā plebem arceant. Quęstores duo fidī deligūnt, q̃ ex collectis pecunijs necessaria cōparēt. Ad id nouaculis opus est, cultellis, vncis, terebris, modiolis (chenicia gręci vocāt) spōgijs quib⁹ sanguis in secando rapiatur, recisorijs ac catinīs. Funalia p̃terea pro nocte parata esse debent. Cadauer vero in medio theatro, editiore scamno collocādum est, loco claro, resectoribus apto. Tempus adeundi statuendū est dum conuentus dimittitur, vt anteq̃ materia putrefiat, opus penit⁹ absoluator. Primūq̃ de humani corporis forma figuraq̃ ac dignitate, pauca percurramus.

De humani corporis figura ac dignitate. CAP. II.



Corpus humanum animę gratia conditū est, et inter cętera animalia erectū, vt quod diuina natura rationeq̃ cōstat, sursum cōmodius

Anatomices

spectaret. vnde nomen græci dedere. Solus homo vim obtinet cogitandi. vnus item reminiscitur. memoriam tamen et disciplinam (vt inquit Aristoteles) cum pluribus animalibus cōmunem habet. Membra, officiorum & munerum gratia constant, ad quæ singula accommodantur quæ dissimilaria vocantur. In humano enim semine calor est, tantam talemq; habens vim & actionem, vt sensim ad quauis corporis partem accommodetur. et primum cor constituit, quoniā in eo principium vite, ac sensus cōtinetur. mox cerebrum et iecur. deinde quasi pictoris officio fungatur natura, cetera mēbra liniamentis describit in humore prolifico, quæ paulatim colores recipiunt ex sanguine, qui in homine plurimū inuenitur, et caloris plurimū excitat, vnde ceteris erectior est, qd̄ facile nō esset si vasta corpis moles subsideret. Quāobrem caput homini minime carnosum est, et superiorē obtinet situm, quo mundi vniuersi habitum referret, vbi mens illa diuina habetur. At reliqua animalia grauiora, caput in terrā depressam habent, quibus natura pro brachijs manibusq; crura priora subdidit. At hoī vero brachia et manus emolita est, ceu omnium animalium prudētissimo, quibus ad artes plurimas cōmode vteretur. Oculi in suprema capitis parte, totius corporis custodes sunt, quorū vices aures in sono retinent. Capilloq; caput ceu velamento pro frigore estuq; integit. Supercilia addita sunt ad sudoris profluuium. Ciliaq; ad incidētium incommoda. Nasus, animę reciprocationem reddit, de esculentisq; prior diiudicat. quinetiam genarum ossa pro oculorum tutela prominent. Labra voci dentibusq; necessaria sunt. Collum, caput excipit ad circūagendum

idoneū, pluribus vertebris accommodatum. Latera, costarum crate pluribus ossibus constant, & cum pectore veluti murum cordi faciunt, respirationi facilio-
ra, quam si vno osse constarent. quod & in spinæ ratio-
ne conspiciamus. At venter sine osse, cibo & foemina-
narum vtero aptior. Pubes os habet quo intestina ge-
stamus, & conceptum mulieres. Genitale, nervis con-
stat, nō osseum est, vt quibusdam animalibus, ceu vi-
uerris & mustelis. Præpuciū glādem integit, ne foemi-
num attritu lædatur, quod iudei amputant mundiciæ
gratia. Maribus prominet, foeminis intus genitale ceu
vagina collocatur, quod si præcidit, virile inguem appa-
ret. Nates tanquam stragulum subditæ sunt, quia non
facile erecto corpore stādo durat homo, sed requiem
desiderat sedendo. At brachia quoq; ac crura mira ra-
tione flectuntur, crura introrsum, brachia extrorsum.
hæc ad artes, illa ad incessum flexus habent. Quin &
digitos ad capiendum premēdumq; cōmodatissimos
dedit natura. Pollex crassior breuiorq; a latere a parte
inferiori sursum premit, cæteri a superiore, deorsum.
Pollex ipse plurimum multisq; pares vires habet, vn-
de nomen. Medius, longus est tanquam nauigij me-
dius. Omnes digiti præter pollicem in comprēden-
do equales sunt. Crura homini maxima sunt magni-
tudinis proportionē, quia totum corpus et erectum
sustinent. Digiti in pedibus breues sunt, quia ad nul-
lum alium vsum præterq; ad ambulandum dati sunt.
Vidimus tamen mulierem sine brachijs enatam, pe-
des pro manibus ad nendi suendique artem habuisse.
Vngues propter imbecillitatem adiuncti sunt. Sed
exteriorum partes nominaque, ordine exequamur.

Anatomices

Bonique consulat legentes, si quando latina verba non habuerim, grecis uti maluerim, omissis barbaris.

¶ De corporis partibus que extrinsecus cernuntur, et eorum nominibus. CAP. III.



Principales corporis partes sunt, caput, pectus, venter. Secundarie, collum, brachia, crura, ac venter. Capitis partes exteriores his nominibus vocantur. Summum enim capitis, vertex dicitur, qui aliquibus duplex reperitur. i. macrobij & biuertes dicuntur. Bregma deinde siue sinciput, in frontem vergit, quod infantibus palpitat. Frons postea & oppositum occipitium. Aequametum capillorum, ad summum verticem bregma diuidens. bina utrinque tempora. aures. oculi. anguli exteriores, paropie. interioresque qui fontes dicuntur, unde lachrimarum profluuium. Et Eon oculorum magnus ambitus. Supercilia. quorum medium, mesophrion dicitur a Polluce. Palpebre. in quibus lineae rhitides & cilia. genae deinde. maxillae. nasus. Ethmus, narium interseptum. globus. pterygia siue pterygones. buccae. miltax. labia. os. mentum. quae omnia faciem numerosae varietatis efficiunt. Collum priore gutturo, iugulo, & ceruice extrema constat. a stropheia usque ad athlitem vertebam. Ab eadem ac iugulo ad veredam usque & os sacrum, thorax colligitur. cuius eae partes sunt. Iugulus uterque, dexter ac sinister, ossa enim versus humeros vergentia. pectus. mammae. papillae. malum punicum. chondrus. hypochondrion. os stomachi. cinctus. venter. umbilicus, in medio corporis libramento. in cuius medio, acromphalum. circa quem corrugata vetula sita est supra umbilicum. Epigastrium, ad iecur & lienem. subter vero, hypogastrium. Vtrinque, ilia. lagona, & ceneona vocant. sume. pecten, qui & de pilis dicitur, & membrum,

vt dictum est in utroque sexu. Dorsi vero partes, scapulae siue metaphrenū, mēsa, & spina, ī qua cynolopha, latera, renes, lūbi, os sacrū, nates, anus siue sedes, a cinctu vsq; ad nates osphys dicit. Verēdorū, sunt penis, preputiū, scortum. At brachia ijs constant, humero, alis, gibbero, et flexu, hoc est ancone, et olecrano, cubito, manus flexu, procarpiō grēci dicūt, manu auersa, quē opisthenar dicitur, palma deinde siue vola. Ir demum, quod thenar grēci vocāt. Ab idice ad minimū hypothēnar. Pollex digitorū, vt supra dictum est, primus, index, medius vel infamis, p̄ximus deinde minimo qui medicus a quibusdā dicit, postremo minimus. In digitis internodia, et digitorū prominētiē quē condyli vocantur, internodia vero siue scytalides singulis digitis terna sunt, pollicis bina tantū, vngues deinde & radices vnguiū. At crura a vertebra siue coxa incipiūt, femora deinde et interiora fœmina, genua, poplites. At tibias crura continent surasq; a genibus vsq; ad pedes, sub sura sphyrōn est. Tali in homine nō sunt, etsi tibiārū processus imi, qui maleoli dicūtur, talorum nomina acceperint, vnde talaria dicta sunt, simileq; in cane est, quod & a. M. Varrone talus dicit. Collū sequit pedis siue mons flexus, perna, vnde perniones, calx, carnosum vestigiū, planta, digitū pedū qui nominibus maiori ex parte, manū digitis respōdent, pollex scilicet, minimus & medius, reliqui minimo & pollicis p̄ximi dicuntur, vngues demum, qui neruorum postremo clausulę sunt, & operimēti gratia dati, vt extremos digitos integant, & tueant. sed de ijs quę manifesta sunt satis diximus. Hinc de humorum & mēbrorum qualitatibus differendum est.

Anatômices

De humorum & membrorum qualitatibus: CAP.III.

Sanguis primus inter omnes humores quatuor qui in humano sunt corpore, calidior est et humidior, aeris naturam referens, cæteros in sese commixtos humores continens. Flava vero bilis, calida et sicca est, ignis proprietatem imitatur, cum externo calore præsertim accenditur. vapore enim vniuersa perturbat, vt in pernicioſa cauſa de conſpicimus. Phlegma vero frigidū & humectum est, aquæ vim poſſidens. Atra bilis ſicca ac frigida est, terre naturam continens. Hos humores peculiaria conceptacula continent. venę sanguinem. ſtomachus pituitam. in iecore veſica bilem cōtinet. lien vero atram bilem, etſi hos eoſdem ſanguis contineat humores, qui vna per omnes venarum riuulos plus minusue p corporis habitudine diffundi in ſingulas corporis partes recta ratione comprehendimus, qui membris alimentum ſubminiſtrant, adeo neceſſarij, vt eorum quocūq; aut per vim, aut ſpōte priuetur homo, eum in perniciem agi certum ſit, vt atra bili tota reddita. Per venas itaq; & meatulos quoscunq; alimentum reſudans (quemadmodum aqua per crudiuſculū vas fictile, dū apponitur humor) ſimile ſit, & demū vnitur et (vt verbiſ Galeni vtar) in carnem cōuertitur, aut aliud ſimilare membrū, ex calore, frigore conſiſtens. Ex quo ſit, vt caro ab igne reſoluatur. Calor enim nō ex quolibet carnem facit, nec quolibet modo, aut tempore, ſed ex materia apta, et vt apte et cum apte effici poteſt. Carnem inter cutem et oſſa cōſtituit quę natura ſuſſilis eſt, ſtaminea veluti vena quam vilum nominant, in venas

fibraſq; trāſit quoties animal extenuatur, macreſcītq; vertitur item in pingue, quoties cibi copia vel alimentū ſuppetit. Quibus multum eſt carnis, ijs venę arctiores, et ſanguis rubentior, et vēter ac viſcera parua, quibus parū, venę ampliōres ac ſanguis ater, viſcera maiora, & venter ampliōr. At in arterijs quę ſpiritus receptacula ſunt, quę ex corde oriūtur, ſpiritalis ſanguis continetur, quem vitalem vocant, peculiarē enim vitā membris omnibus inſpirat, et ad oſſa etiam penetrat. Ex ijs pulſus ille, vitę index certiffimus cōſtat, qui per modulos certos, metricaſq; leges armonię mō in membris mouetur, vnde vitę gubernacula habentur. Cardiacis, defectis, & morientibus venę intercidunt, et quibusdam ſanis naturali vitio, quibus ſepe medici incauti decipiuntur, de quibus nunc ſatis dictum ſit, reliqua de ſpiritu et ſanguine & de eorū venis libro poſtremo diffuſius dicemus. Rurſus corporis partes quędam calidę, quędam ſiccę, alię frigidę, nonnullę humectę ſunt. Ex his, cor calidum eſt & ſanguis quoq; nā ſpiritum temperatum eſſe exiſtimamus. Ariſtotelis ſentētia, iecur exinde, et caro peculiarī ſua caliditate, muſculi deinde, renes ac lien. At ſicca eſt pilorum natura, oſſa deinde, cartilago, chordę, oſſium vincula, venę, arterięq; & nerui qui vocales dicuntur a medicis. Frigidiora ſunt eadem ferme, pili, oſſa, chōdros, cartilago, mēbrana omnis, quę hymen dicitur a gręcis, nerui, ſpinę medulla, cerebrum. Humentia ſunt pingue, adeps, cerebrū, ſpinę medulla, adenes in māmīs ceteriſq; corporis partibus a nobis dictę glandulę. Hęc circa tēperiem (quā gręci craſim vocant) conſtituuntur. Vna dūtaxat pars eſt maxime ſenſilis ī hūano corpore, hoc eſt cutis, ī palma p̄cipue, aut ſūmo indicis, cui

b.ij.

Anatomices

temperata cōmixtio data est a natura, inter qualitates siccum, humidum, frigidū, ac feruēs, quę in viuētibus Deus rerū conditor parī cum mundo ratione inter se repugnātia mirabili nexu deuinxit, per qualitates enī suas, singula per cognationem & conciliationem quandam, singulis adhærent.

De membrorū functionibus.

CAP.V.



Artes quoq; corporis aut omeomeriæ sunt, ita græci vocant, nos similes recentiori vocabulo appellare incepimus, quę in similes partes diuidi possunt, ex elementis & humoribus tanquam rerum primordiis constituuntur, vt caro, os, ex quibus dissimiles constant, quę in partes dissimilis naturę diduci queūt, vt musculus & facies. Ex primis, hoc est similaribus, sensoriæ partes habentur, ex carne veluti, cute, neruis, quoniam singulorum sensibiliū sunt capaces. Ex dissimilaribus, actiones motusq; existunt, officiaq; diuersa, quoniam ex varia similarium natura constant, vnde organicas, officiales, et instrumentarias partes appellamus. Ex membris quędam, quod recipiūt statim transmittūt, vt gula, pyloron. alia recipiūt et cōtinent, vt fellis vesica. alia corpi necessaria. alia superflua, illa vt stomachus, hęc vt aluus, & vesica. horum item alterū, siccū excremētum, alterum humectum tenet. quædā item ipsi indiuiduo, alia successionis functioni necessaria sunt, illa, vt iecur, stomachus, hęc, vt penis, testes, vulua.

De ossibus & eorum natura. CAP.VI.



Ossa inter omeomeria firmissimæ sunt materia, totamq; corporis molem sustinent, minime animata (vt inquit Plato) plurima atq;


crassissima carne adoperta. Ideo caput & pectus minime carnosae sunt, præterquã in lingua, quoniã ad sensum præcipue accommodata est. At carnis vnius gratia, ossa, nerui, cutis, venę, arterię, vngues, pili, a natura dati sunt. Ea omnium partium sola, tangendi sensum possidet. Ossa itaq; ad motus quãmaxime necessaria, inter quę spina vt nauis carina, data est, ab ea costę recuruatę patescūt, resurgūtq; ad latera. Ossa quędam, aut corpus tuentur sicut caluaria, costę, radius, aut occurrentia arcent, vt quę Cynolopha in spina appellata canina prominentia, vnde nomen, aut inanitates complent, vt quam in genu patellam nominant. alia solidiora sunt & robustissima, aliqua foraminulenta, vt calua. nonnulla medullę plena pro nutrimento, robustiora, vt femora, tibię. Omnia omento integuntur, quo diuulso protinus sideratur, nec sine eo sensum habet, quoniã frigide (vt sepe dictum est) ac sicce sunt nature, frigido eni indurueri, calido vero discocta sūt, siccescente humore, vnde resolui ab igne non possunt. Præter caluariã oia ex spina oriuntur, et prima partium constitutiõe ex seminali excremento gignuntur. cūq; homo augetur, incrementū capiūt aduētitiõ alimēto, siue a matrice siue foris adueniēs. itaq; ossa sicut cetera membra certo augēdi termino describuntur, sicut et animalibus, magnitudinis meta habet. Ex carne et osse nerui naturā mediā temperauit, inter eos & ossa similiter cartilaginē constituit. In homine ossa (vt facile videri potest) circiter. cc. xlvij. cōnumerantur. Ea corruptio nouum nō est. Sed abscessus innasci mirū est, vt nuper vidimus, dū mulierē quandā gallico morbo interemptā resecaremus, causam morbi perquirēdo, ossa sub omētis suis integris tumentia & ad medullam vsq; suppu-

Anatômices

rata inuenimus, ea dūtaxat ratione, quoniam & ipsa nutriuntur, abscessibus ob id afficiuntur.


De chartilagine.

CAP. VII.


 Chartilago, quę chōdrus, ex nerui ossisq; natura constat, Polluce et Galeno testibus, in quā omnia ferme ossa desinūt, alioqui attritu siue concursu lederentur. Chartilago rupta nūquā ferme solidescit, & inter flex⁹ veluti lectisternium inseritur.

De neruis.

CAP. VIII.

 Eruos primū oriri a corde credit Aristoteles, in quo priusquā cetera mēbra formentur appareant, verum omnes fere (vt euidentius constat) a cerebro veluti eius vicario, spineq; medulla nasci magna ex parte cernūtur, vnde & spūs animales & sensifici semitas habēt. Ij quidem albi sūt, lenti, sensificam atq; motricem vim diffundētes, incisi non solidātur, vulnerati summū dolorē sentiunt, præfecti nullū. Qui chordę dicūtur, teretes sunt, musculis idonei in brachijs ac cruribus, interiores nerui mēbra conducunt, superiores reuocāt, quod præfectis intelligitur. Neruorum præterea natura, non materiæ venarum continua de eodem initio procedit. Sic & vincula ossibus nodisq; corporū qui vocātur articuli, adnexa, neruorū naturā habent. Circa neruos quędā mucosa lenticia, q̄ p̄ alimēto a natura data est. At de neruorū origine ac natura numeroq; suo dicemus loco.

De natura arteriarum venarūq; CAP. IX.

 Rterię ac venę quę ex neruorum materiā constant ex corde oriuntur, crassiore iuxta ortum stipite, frigide ac sicce naturę, calore decoctę, ac frigiditate coactę, illę, spiritus conceptacula

sunt duabus membranis cōstituta, dilatant̃ vicissim ac perpetuo cōprimuntur, sponte an sp̃ritus motu, alibi tractandum, hinc vitę gubernacula habētur. At venę sanguinis conceptacula sunt, mēbrana vna dumtaxat constitutę, immobiles, quę mēbra omnia riuulis irrigant adeo plerumq; tenuissimis vt vix cerni possint, A hortę postrema quę fibrę dicūtur, neruo omnino cōstant, quippe quę nullo intus cauo distingūtur, tendūtur modo neruorum, quā desinūt applicata ad nodos ossium lubricos ex Aristotele.

De musculis siue lacertis. CAP. X.

Musculi inter officiales & dissimilares partes annumerātur, mouendi volūtariā virtutē pstant. Ij neruo, carne, mēbrana, velamine ambiente, neruis, summis ossibus adherētibus cōstant, medio, crassitudine ampliores, intus carnosī, neruosa huc illuc discurrēte materia, vtrinq; capitibus in tenuitatē desinētibus ob similitudinē appellantur. Hinc mēbra functionē exercent, distendūtur vel pten duntur, vulneratis non sine vitę periculo distentiones eueniūt, gręci spasmata, latini distentiōes vocāt. Ij, in labore lassitudinē sentiūt. Pluribus modis in corpore variant, tum figura, tum virtute, quoniā alij retinent, alij expellunt, calidis exacuūtur, stupefacientibus hebetant̃, retinendi itē vis vnctuosus lēditur, stypticis recreat̃, alij oblongi sūt, alij cōpactiles, alij latiores, quidā adeo mixti sunt, vt vix diuelli queant, varijs tamē motibus cōsiderātur, et numero intelligūtur, quod in frōte & in labijs p̃cipue cōm̃phenditur. Alij aliter p̃ut corporis figuratio possidet, supra quingentos a diligentissimis authoribus colliguntur, de quorū ordine ac situ, postremo libro seorsum pertractabitur.

Anatomices

¶ De omentis.

CAP. XI.

Omenta sequuntur siue tunicule, quę ex neruosa materia emolita est natura. sicut quę cerebrum & medullam continent, & membra cum neruis annectunt, vel ambiunt, vt iecur, renes, quibus sensum habent, alioqui non sentiunt.

¶ De adipe & medulla

CAP. XII



Adips in homine inuenitur, circa enim membranas adnascitur. Pingue sub cute est. Seuum in cornigeris circa renes inuenit. Pingue sicut & omentum calefacit, in temperato enim corpore sanguinis exundantia a membrorum saturitate congeritur, alioqui immenso pinguitudinis pondere sensus opprimitur, & saepe comoriuntur membra. Lardum in sue, sensus expers habetur. Medulla in cauis ossibus sensum non habet, pretenui tamen ambiēte membrana integitur, quę in iuuenta rubens est, in senecta albescens, minusque circa ossium capita, vbi medulla sanguinea cernitur, ac minus pinguis. Ossa fracta non ferruminantur, quod defluente euenit medulla.

¶ De cute

CAP. XIII.



Vtis carne siccescente efficitur, quomodo (vt inquit Aristoteles) in polētis crustula. Materię enim lētitudo cum euaporari non possit, residet, quoniam id lentum et pingue est. Itaque cutis ex eiusmodi lenticia consistit, similis pars est, cum animali in vtero congenita, homini tenuissima, aerique qui nobis circumfusus est opposita, leuiter foraminulenta, vnde vapores exhalant. Quod euidentius apparet tyrannorum sequitia, cum miseris inter maximos cruciatus diuellitur & exiccatur, tum cutis foramina cribri triticeae magnitudine cernuntur. Hinc sudor emanat, hac ta-

Et ilium rerum species transigunt. Per medium veluti temperamentum sensifico tactu dijudicamus. ideo sine sensu est. Sub ea mucosus humor habetur. Vbi cumque cutis sine carne est, vulnerata non coit, ut in genis, buccis, ac preputio, & his similibus.

De vnguibus

CAP. XIII.



Vngues ex terrena admodum oriuntur parte, parum humoris calorisque adepti, qui dum refrigerant, humore ac calore euanescente in aerem, duram terrenamque formam capiunt, sicut vngule, cornua. Quamobrem igni molliuntur. Inter ossis et nervi naturam possident. Vidimus in creta dum haec condereamus, vulnerato genu sagitta, cornu nigrum rupi caprae capitis simillimum produsse, materiamque, quae in ossis substantiam conuertere debuisset, in corneam naturam, aeris afflatu facile conuersam, continueque gummi modo indurescentem. Plantarum quoque ratio persimilis est, quarum partes quae terra operiuntur, radicis naturam habent, quae vero aere perflantur, frondes ferunt. Id obseruare, qui arborum ramis propagines fieri docent. Nam ex summis arborum cacuminibus plantaria transferunt, & radices traiectionis per vasa fictilia ramis sollicitant. atque eo blandimento impetratis radicibus, inter ipsa poma & cacumina aliam arborē longe a tellure constituunt. Vngues in manibus magis excrescunt, quoniam (ut inquit Alexander Aphrodisieus) augmentum sursum magis defertur. Haec summatim dicta sint dum corpus resecandum lauant, et nouaculae pro more preparant, et quae dissectioni necessaria videtur. Hinc ad partes interiores transeamus.

In librum secundum Anatomices.

Anatomices

¶ Alexandri Benedicti physici de membrīs naturalibus & genitalibus quę sub pręcordiis continentur.

¶ Pręfatio ad amicos.



Dmonet Plato Christophore sorouen-
stane Cęsaris nostri orator facūdissime,
ne qui erga amicos & pręcipue patriam
suā ingrati videantur. Vtrūq; facimus,
si te ad hoc theatrum a regijs occupa-
tionibus auocamus cum Christophoro
Lamphrācho, Iusto Leliano, comitib⁹ Andrea pere-
grino, Dionysio cepio Veronensibus meis iure cōsul-
tiss. inter quos & Ruffum meū, & Iacobū Mapheū
interesse volo, qui primi ad has partes spectandas nō
incongrue accedāt cum serenissimo Rege Maximilia-
no Augusto. Quū vos omnes nouerim tum cibo tum
potu tēperatissimos esse, & ventris importunitatē sæ-
pe coarguētes, et ad arcendā eius intēperantiā bonos
domitores esse et acres. Qm̄ partē quę in nobis diuina
est, sua inexplebili auiditate sepe perturbat, et clamo-
re suo strepituq; cōsultorē nostrū animū iniuste arcet.
Iustus igitur aderit noster, vt nos in ocio pmittat trā-
quillo. Nec ob id egre a vobis ferēdum est, si exta vos
hec spectare voluero, cū nulla in re naturā sine admi-
ratione cōstare tradāt. Nam & Heraclitus, qui in do-
mo fornaria forte sedēs calorīs gratia, ad sese quosdā
accedere fidēter iussit, quoniā eos tēperantes viderat,
Deos imortales (inquit) hic adesse nescitis? Itaq; in oī-
bus, naturę numen reperiri certum est, et plena animę
esse omnia. Iocineris naturam inter exta Plato p̄cipue
cōmendauit diuinatione & simulachris, qđ speculi in-
star ad imagines exprimendas accōmodatum fuerit,
genitaliūq; subinde mēbrorum officiū humanitatem

per indiuidua ppetuantū. in quibus mirū gignēdī de-
siderium atq; amorē incredibilē inseruisse, deū cognos-
cetis. Ea membra nō ab referre morā plurimum indi-
gnātur. etsi ipsa se in foeminis letaliter sepe pcludant,
vt animal cōceptū proferāt in lucē. His cōspectis, ven-
tris petulantia, & libidinīs violētiā sequentes, dānabi-
mus. quoniā (vt Plato fabulatur) in varias degenerare
bestias, nō intēpestiue illos demōstrare videmus.

De ventre et vmbilico

CAP. II.

IN partes tris corpus humanū, quod dissecan-
dum est diducitur, in supmā, mediā, & imā
partē. Prior sensifica caput cōtinens. Media
spiritalis. Ima naturalis in qua vter subiacet, appella-
tur. In prima, sensuū nobilitas locū possidet. In secun-
da, vitę fons & ratio sedē habet. Postrema naturę offic-
cina est, a qua hac in parte initiū sumendū est, quoniā
intestina ocius corrūpuntur. Ordiendū igitur est a ma-
larū oīm partiū pessima, hoc est, a ventre, cuius gratia
mortaliū maior pars ppetuo inseruit, nec vilitatē eius
extimant foedo retrimētorū opere, cū pleriq; maris
ac terrę infinita pene pericula subeāt. Addo qđ omni-
bus vt molestissim⁹ creditor instat, nec diē sine appel-
latione prętermittit, omniū mēbrorū deterrimū vas.
Illud est pfecto quo vitā cū brutis cōmunē habēt ple-
riq; infimū ppterea in corpore et abditū locum tenet
ob res imundas, veluti mēbris principalibus parcente
natura, ob id sedes hęc a ratione animoq; longius rele-
gata est, septoq; diducta fuit ne rōnalem animi partē
importuna vicinitas pturbaret. In hac ceu popinę lo-
cus, sordiū, ac excrementorum sedes, vt in edificijs ar-
chitecti auertūt, ab oculis, naribusq; dñorum, quę ne-
cessario tetri, foediq; aliquid habitura sint. Hęc supe-

Anatomices

rioribus mēbris ancillantur, ex quibus alia, in succum cibum cōcoquūt, quēdam in varios humores digerūt, quēdā exundātiā propellūt, sed de ventre exteriori prius agendum est. Hic ab ima parte mali punici intra ilia inguinaq; collocatur, cuius ps sumē est, osse caret venter, quia cibo (vt dictū est) increfcit, residetq; in fame, quod & fœminis vterū gerētibus contingit. In medio vētre vmbilicus situs est, geminas arterias ac totidem venas cōplectitur, veluti extremo putamiē circū dante, nā & utrūq; venarum par mēbranulis suis circundatur. Eę quatuor venę ex vtricoli acetabulis, hoc est cotylidonibus, per secundas cōceptui alimentū prębēt, q̄ vteri venis atq; arterijs respōdent, adherētibus iter se venarum orificijs, de quib⁹ mox dicturi sumus. Iecoris enim portas venis duabus quę in vnam coeūt, pertingit, ac geminis arterijs ad ahortam vbi finditur e regione vesicę, & duę de vna efficiuntur. In prouectiori etate vmbilicus iam diu emeritus, pluribusq; induratus annis, exanguis apparet, & exilior veluti nervus videri potest. Ita vt tam venę quā arteriæ nullo modo cerni possint, verū resectores in secādo caueant, ne incaute præcidant, quod & in cæteris obseruari præcipimus.

¶ De sumine siue abdomine.

CAP. III



Ars quę infra vmbilicum sitū habet, sumen dicitur, ab antiquis abdomen, venas prętenuas habet, subter cutē dispersas, quibus in vtero concept⁹ aquas emittit, quod in abortu euidentius cōprehēdimus. Exinde pecten vel pubes subest, quę infimam partem occupat ad naturalia spectās, venter deniq; his constat (vt iam secādi initium faciamus) cute, pinguitudine, mēbrana carnosā, musculis, nervis,

ac interiori demum mēbrana, quæ omento iungitur, peritoneon a græcis dicta, ea omnia intrinsecus exta integuntur, ab ilibus ac pube, sursum versus ad præcordia peruenit. ¶ Vniuersam itaq; cutē intacto vmbilico per transuersas líneas a summo stomacho ad pubē, a leuīs ad dextra ilia hoc modo incidito. † Sub cute pingue est, ab hoc carnosā mēbrana, deinde nerui, & musculi, & membranę interioris abdominis firmissimum (de quo diximus) inuolucrum, omnia interinuoluens intestina.

¶ De musculis ventris.

CAP. III.

Musculi in ventre octo inueniuntur Galeno teste, horum duo ab imo pectore carnosiores pectini iunguntur, in quibus longissima staminea ceu filamenta filili quadā natura, sursum deorsumve tendentia cernuntur. sub his duo sunt, qui iuxta priores vtrinq; a costis tenuiorib; mollioribusq; (quas græci rhoas vocant) oriunt, & in neruos desinunt, transuersimq; pubi annectuntur. alij totidem ex aduerso a pectine sursum versus tendunt ad eadē præcordia ad chi. x. literę figuram, alij demum duo subter priores rectori angulo per transuersum ad vtrāq; lumborum partem perueniunt, ubi adalligantur. Quidam tamen musculorū neruos quibus annectuntur, supra musculos maiores coire existimant. Alij vero sub musculis maioribus cōiungi putant, quia ex diuersis locis in vnum conueniunt. Hęc a natura constituta sunt vt interanea intus robustius cōtineantur, cibiq; facilius regesto calore concoquantur. Astringunt enim, dilatant, reuocant, accipiunt, retinent, expellunt, laxantq; cū opus est, pro neruorum situ naturāq; septi trāsuerſi auxilio superne cōprimētis, primi attrahunt, postremi com-

Anatomices

primunt, medijs vero continent, quibusvis tamen vulneratis alius difficulter comprimunt. Superiores rursus qui ampliores sunt, cibum continent ne retro fluat, imi vero ne priusquam opus sit per aluum transmittatur, verum si quid succi adhuc superest, absumi possit, constituti sunt. Hi obiter muscoli ab hac contemplatione non abijciendi sunt. Ventrem indecorum reddit hydropisis, cuius species ascites dicitur, ex qua extrahenda ratio aqua in alijs libris dicitur, locum enim ad illa versus deligimus, ubi peritonei sola fere nuditas est, summis enim crassitudo omnino vitanda est, cutisque digito dimouenda, immissoque cultello usque ad omentum, quod primum sub peritoneo occurrerit, penetrandum est (quod paracetesim vocat Paulus egyneta) nec id nimium audacter, ne temere intestina vulnerentur, tantumque humoris colligendum est, ne vires intermoriatur, vitale enim spiritum is humor continet, demum remissa cute, vulnus per se obstruit, atque ita sensim singulis diebus demittit aqua, in qua re vires idoneo cibo tuentur medici.


De peritoneo et omento

CAP. V.

His emotis propter umbilicum, abdominis membrana interior apparet, firmissima est ne grauiori fasce, aut retento spiritu (quod sepius contingit) ruptur, supra enim inguina id euenit ubi tenuior est, quae si ruptur, inguinis siue bubonis tumorem imitatur, bubo noxae dicitur, quo decepti plerique chirurgi immisso scalpello, cum pus subesse putarent, intestina vulnerarunt, unde odoris foeditas statim subsequuta est, paucisque diebus egri mortui sunt, foeminis enim id malum sepius accidit, ea membrana ad excrementa flatumque cum enitumur propellenda necessaria est. Laxatur in foeminis mirum in modum uterum gerentibus, dorso adalligatur. Huic venae quaedam comit-

tuntur quę ad mamas a partu statim ad lactis genera-
tionē sanguinē ex vtero deferūt, his cucurbitulas ad-
mouemus cū lactis copiā inhībere volumus, sub mā-
mis vero, cū mēsiū abūdantiā timemus. Hac vero mē-
brana emota omentū subest (ita enī speciali⁹ dicit⁹) vnī-
uersa pene intestina & stomachi inferiorē partē conte-
gēs. a medio enī ventre oriūt ac inde depēdet, vnde cibi
cōcoctionē veluti stragulū iuuat. Inuenti sunt qui sine
omento vixere, digestionī tamē ineptiores Galeno tes-
te. ex tenuissimis ab vtraq; parte mēbranulis medio
inato adipe, nō sine arterijs ac venis exilib⁹, ex iteriori
pte leue, et supiore molli⁹, sēsu alioq; ex toto caret, car-
nosę dorsi mēbranę scđm diaphragma sese applicat.

¶ De intestinis & primū de aluo. CAP. VI.



Biecto itaq; omento, intestina insinuatīs
quibusdā girīs longissima apparēt, qui nō
nullis animalibus a ventre ptinus, recto ve-
luti intestino ac breuissimo emittunt per al-
uum excrementa, sicut lupi ceruarij ac mergi, propter
ea insatiabilia habētur, sepissimeq; aluū deiiciunt, qđ
humanis actionibus maximo foret impedimēto, intē-
pestiuacq; fames sēp adesset. Intestina, excremēta, hoc
est materiā supuacūā, recipiūt, quorū actiones vt tem-
pus diuersum habēt, sic etiā diuersa loca possident vt
Aristoteli placet. Iis neruosa materia est qua recipiūt
continēt & expellūt & quicqđ succi quod a stomacho
superest penitus pficiunt, nam & crenas habent quib⁹
succū coquunt et mutant, stamineo vilo diuerso, mō
alstringūt, mō laxāt cū op⁹ est, intestina vim attrahēdi
manifestā nō possidēt, quoniā stamina p longū obdu-
cta nō hnt. ¶ Sed ab inferiori intestino hoc est aluo ordi-
endū est, hac ps ita spāliter appellat suillæ similis qua

Anatomices

excremēta eduntur. Ab alijs longanon, ab aliquibus rectum intestinū dicitur, spyrīs nō circumplicatū, crassioris intestini pars, in tenasmo procidit, vnde sedis procidentia reuerētiore appellarūt antiqui. Extrema alui pars anus dicitur vel sedes, Galenus sphigetera vocat. Sursum versus ad ilia extendit aluus, reflectiturq; ad renem sinistrū, mox ad stomachū, deinde ad iecur pertinet, minus q̄ reliqua intestina carnosum, ad hanc partem venę quēdā, ex messenteriacis perueniūt, quæ extremā succi portionem exugūt, iisdem item si quid infunditur per clisterem alimentū recipiunt egri, non nouo vt quidam putant inuento.

¶ Decolo & ceco intestino. CAP. VII.

SVpra aluum collocatur colon crassioris intestini pars. peruiū est ac late fūsū, cellulis plurimis insinuatū, in quibus excremēta diutius immorantur, indeq; quādam recipiunt effigiē, catoceliā gręci vocant, ab aliquibus aluū etiam vocari scio, reni sinistro inuolutius anectitur, vnde nephreticis colicisq; morbis dolores consimiles sentiūtur, abstinentia tamen inter ceteras notas discernūtur. illos leuat, hos aggrauat cibus. deinde id intestinū lienem attingit, sursum versus ad dexteram stomachū scandit, huius ob id intestini noxius humor os stomachi afficit & præcordia. vnde lipothymia saepe concidunt ægri, in fela aluum deicientes, nec sine ratione id intestinū inter inferiora annumeratur, etsi locum superiorē obtinere videatur. iecori item iure proximū est, vt inde meatu ipso ex folliculo fellis bilem excipiat, quo retrimēta eius mordacitate ad exitum præcipitētur, ob id ea pars cui porus felleus committitur lutea est, ac gustatu amara. Huic coniungitur quod cæcum cognomināt, a dextra

enim parte sub rene collocatur iuxta coxā. cecū ideo dicitur quoniam duo opposita orificia nō habet vt cētera .nam eodem quo excipit, etiam remittit orificio. eiusdem cum superiori naturę habetur, iisdemq; morbis vexatur.

¶ De tribus gracilioribus intestinis. CAP. VIII

DRacilia deinceps intestina ventriculo ānexa sunt, quæ in homine lactes appellantur. Horum primum quod tenuius vocatur, in sinus tortuosos vehementer implicitum est & orbes, & intestino quod medium latini, gręci messenterion vocant, singuli connectuntur, in dexteriorē partem cōuersi, & e regione dexterioris coxę finiti, superiores tamen partes magis cōplent, & quia circa ilia positum habent, ilibus nomen dedere, a quibus ileon, et iliac⁹ dolor. At paulo supra versus stomachum ad sinisteriorem partem spinę, intestinū est quod ieiunum nominant, nō ita vt reliqua implicitum. ieiunitasq; ei nomen dedit, quoniā nunq̃ quod accipit continet, sed protinus per inferna trāsmittit, semper enim vacuum reperitur, hiraq; ac hilla appellatur a quibusdā. Quare igitur ex eo ita subito cibus labatur, est quia mordaci felle citatius redditur. Huic demū ea parua iunctura alligata est a mediā fere ventriculi pte parū in dexteriorē partē cōuersa, Pyloron gręci vocāt. Quoniā portæ modo, in inferiores partes, quæ excreturi sumus emittit, cēteris intestinis arctius. Ad hanc portam felis meatus pertinet vnus, eadem de causa. hæc. xij. digitorum mensuram continet. Inter secundum meatus ille cauendus est integerq; ostendendus.

¶ De messenterio, et venis eius.

CAP. IX.

Anatômices



Mesenterion (quod medium vel medianū latī
ni dicunt) neruosum est, mēbranulis, glādu-
lis pluribus refertum, quas adenes Galenus
vocat, circiter crispum est, cui lactes in sinus
(vt mox dictum est) tortuosos, adherent impliciti. vi-
cinitasq; mēbri errorem dedit nōnullis qui lactes pro
mesenterio sepe dixerunt. In eo venarū fibrę a natu-
ra constitutę sunt, quę ab intestinis ad venā maiorem
et ahortam pertinent, sine eo membro succus alioqui
ab intestinis incōmode attraheretur (habent enim cui
adhereant venę) quę ceu radices in materiā intestino-
rum desinunt, nec transigunt, has mesenteriacas vo-
cant medici, oppilationis sepe originem. septo trans-
uerso alligatur & dorso, vel ex vena maiori & ahorta
pendet, vt Aristoteli placet, vnde sanguinē et spiritum
deferre certū est, venę ipsę solidę duręq; sunt, a ventre
et ab intestinis alimentum capiunt, veluti arborum ra-
dices, quę humorē a terra attrahūt, aluntq; stipitem,
animalibus enim intestina & vēter pro terra sunt. Qui
harum venarum orificia inter intestina ampliora pu-
tant in viuentē, quę in cadauere delitescant, longe de-
cipiuntur, arbitrātur enim ciborum frusta per easdem
fibras tenuissimas attrahi posse, putantq; virginē eta-
te nostra Venetijs dū hęc cōderemus, quę crinalem a-
cum quatuor digitorum longitudine, quam inter den-
tes dormitura continebat, incauteq; per somnū deglu-
tiuit, per vrinā post menses, x. demissile maximis cru-
ciatibus, quoniā in vesica collectis viscosis humoribus
lapidē circa sese inuolutū rotūdauit gallinacei oui ma-
gnitudine, & a venis pri⁹ mesentericis acū haustā eise
contendūt, nec quas vias inuenerit natura ignorāt, eā
fibrę in ipsis intestinis in neruos desinunt tenuissimos

ac in eorum materiā oblitterant, hic numerosiores sunt ac crassiores, ijs q̄ a stomacho ad iecur ferunt, ideo pl⁹ alimenti cōferuntur. at ille citius defectis subueniūt. verum si oēs vī ex maiori parte lāguescūt vel obstruunt, cōcitato fluxu ad miserā maciē deformāt hoīem. His pactis intestina emouebis, folleq; stomachū in pylorō iniecto inflabis. tū viuentis stomachi similē posituram euidentius rēp̄sentabis. ¶ De stomacho. CAP. X.



Ia quē ab oris faucibus ad stomachū tendit gula appellat. ex neruo & carne constat, hac cibus potusq; in vētriculū suū receptaculum deriuatur. Nam & cibi porta vocatur. medio enim ventriculo nō annectitur, sed in latere, ne capitis inclinatione, cibus ipse facile redundet. Sicut & alterū eiusdem vētriculi ostiū (quod pyloron paulo ante nominauimus) in fundi medio nō cōmittitur, sed paulo altius, ne deuorata in aluum incocta citius q̄ opus sit, delabatur. Hac de causa in crapula septum transversum plurimum supprimitur, nec tamē quicq; esculenti euomitur. Hę geminę portę loco et magnitudine differunt, nā superior amplior est, inferior āgustior. hac ratione, quia magis cōtrita a cōcoctione trāsmittere debet, Vētriculus intestinorū p̄cipiū canino similis est, quippe qui nō multo āplior est q̄ intestinū, sed quasi intestio similis āpliori ex Aristotele, sub septo trāsverso circa p̄cordia sua angustiori pte. os enī stomachi dicit, vbi. xiiij. spinę vertebra inueniūt, collocat⁹ est. cōcoquit enī & imutat, pater familias vocat⁹, quia totū aīal solus gubernat. nā si egrescat, vita in ancipiti est. iter lienē et iecoris fibras ab vtroq; latere cōprehēdit. supra infraq; inter diaphragma & intestina mediū positū habet. hunc in anteriori parte omentū, a posteriori venę

Anatomices

grandes fouent. a superiori parte in sinistram vergit, ab inferiori in dextrā inclināt. ita orificiorum suorum ratio exposcere videtur. ob id atram bilem in superiorem sui partem decurrētē certo meatu a liene assumit. in imā vero a folliculo fellis flauam bilem poro delatā accipit. Ventrīculus in medio tumet ac pendet, qui mēbranis tenuibus, septo connectitur, lienī, iecori, cordi, cerebroq; venis, arterijs, neruis, vñ ex ictu capitis, sepe stomachi subuersio euenit. duobus tergoribus constat, quorum alterum intrinsecus neruosum est ac cras- sum, alterum extrinsecus carnosum ac tenue. illud stamineum habet filamentū, ines gręci vocant. alterum intus in longitudinem tendit, in appetendo deorsum trahit, alterum extra per trāsuersum fila ducit vi retentatrice, quę cathectica dicitur, plurimū necessaria. At exterior ventris tunica carnosā stamineam venam in latitudinem protēdit, qua materia ciborum subigitur, et a digestiōe superflua, dū sese astringit, secernere dicitur. huic potentię, apocritica nomen est. interior rursus tunica tactus sensum habet, vnde cibi appetentiā prouenit, exterior vero cibum potioneq; mutat, ac cōfundit, ea vis a gręcis alloetica vocatur, cui reliquę obsequuntur virtutes. ¶ Stomachus intus denticulatus est callo in modum rubi ad conficiendos cibos de- crescentibus crenis versus orificia, nouissima asperitas vt scobina fabri. ab ijs fibrę, quę ob similitudinē mesentericę dicuntur, oriuntur. quę inter venam & neruum naturā habent, a quibus (vt paulo ante dictum est) humor attrahitur, inde per maiores venas ad iecur transmittitur, sed dum concoquit stomachus, nec sui ignarus est, quoniam in fame ac siti protinus humorē attrahit, ac primus recreatur.

De adipe et pancreo.

CAP. XI.

Sed anteq̃ ad lienē transeamus, pauca de adipe dicenda sunt. Hic sub leni mēbrana abdominis situm habet, in obeso corpore ampliorē. Ab ilijs incipit, deorsum versus ad renes tēdens. Ab interiori parte membrana includitur, quę omento iungitur. Is non cogitur, nec siccitate vlla frangitur vt seuum, quoniā eius natura minus terrena est, vtrunq; sine sensu, nam neruo arteria ac vena caret, ideo & plerisq; detractos adipēs leuatūq; corpus immobili onere, traditum est, & inde vixisse. Pancreon quoq; inter carnes & adenes naturā habet. Lienī, stomacho & iecori annectitur. A carne nomen habet, ad quod communis cum omento vena pertinet, quę ex vena maiori oritur.

De liene.

CAP. XII.


In sinistra parte aduers⁹ iecur, Lien paulo inferior, suillo similis habetur, purgamenti sanguinis receptaculum, eum humorem atrabilem nostri, gręci melancholiam dicūt. Hic non vt iecur p̃cordijs, sed sinisteriori ventriculi parti et omento committitur. Gibbus ipsius dorso mēbranulis alligatur, sed vt facilius appareat, costę inferiores quę tenuiores cernuntur (sub ijs enim conditur) aperiendę sunt. Eius quidem materia mollis est, rara ac fistulosa, longitudinis crassitudinisq; modicę, sed lienosis ita plerūq; intumescit ob humoris confluuiū, vt zona veluti cingere hominem videatur. Cum sordibus (vt inquit Plato) iecur abundat, lienis raritas id purgat, et eas combibit. quoniam concavū est & exangue, vnde purgamētis impletum excrescit, cursoribus (vt tradit) peculiare impedimentū. propterea quādoq; nonnullis

Anatomices

laborantibus splen inuritur. Ad imi posse homini sine vite periculo verisimile non est. Huic membro p magnitudine loci intemperantia attributa est. Iecori, stomacho, omento, & intestinis committitur. Ad lienem sicut neque ad iecur nulla ab aorta pertinet vena. Excitari turbam contra Aristotelem in plerisque locis video, rixasque moueri, sicut et de vulua dicturi sumus, quoniam sine spiritali sanguine hec membra posse constare possibile non diu dicant, ea enim membra sanguine aluntur a vena minori que sine spiritu non est, sicut & vulua sine sanguine. Vena grandior directo ductu a porta concaui iecoris ad lienem ducitur, que si diligenter retegatur, apparet ex medio eiusdem venę cursu riuulus quidam est, qui sanguinem dilutiorem deorsum versus mesenterion ut alat ducitur. Rursus eadem vena grandiuscula iuxta lienem bifariam diuiditur, alter ramus pro alimento ad iunum stomachum fertur, alter ad splenis cauum producit, ubi intus in duos ramos spargitur, sursum deorsumque transcurrentes. horum inferior sanguine omentum rigat, superior vero ex cauo lienis rursus in duas diuidit vias, quarum altera ad sinistram superioremque stomachi partem, altera sursum tendit ad ventris orificium, atramque bilem infundit, qua os stomachi constringitur, unde exuritio exoritur. Reliquum in ipso splene absumitur, præter eam portionem quam vena grandis ad membra consimilia transmittit.

De iecore

CAP. XIII.

 Ecur nobilissimum membrum esse putauit Plato, in quo diuinationis gratiam collocauit. quo priuato, nec euidentis quicquam sit vaticinii signum. posteriores vero physici sanguinis originem huic membro attribuere, quod si validum est, aucto sanguine au-

geri membra videntur, inualido decrefcere non dubi-
um eft, fi extenuata in nobis membra funt, eo conua-
lefcente facile implentur. Iecur inter exta proportione
maximum eft, fub præcordijs a dextra parte fufpēdi-
tur, fanguine & fpiritu naturali refertum, intrinsecus
cauum, extrinsecus gibbofum, e regione lienis, ventri-
culo leniter prominens infidet, quem fouet, in viuento
magis pendet. In eo multiplex vis eft, nã attrahit, reti-
net, concoquit, digerit, & expellit, fuccū enim omnem
in faniē, in bilem, ac atrā bilem digerit. Eæ potētīę ex
temperato cordis calore nutritiūę virtuti deferuiūt cō-
genitę, ita vt & quę nutrit & auget virtus, eandem efle
nō dubitat Auerrois. In quinas iecur diuiditur fibras,
intus fenfu carēs, fiftufofum, fpongiofū, foraminulen-
tūq; eft, minimisq; venulis per totū membrū nodofo
coitu difpñs. vbi fuccus in fanguinē fecūda cōcoctiōe
commutatur vel in faniem, inde in diuerfas partes di-
geritur. calidum enim eft ac humidū, membrana tenu-
iffima contectum, fepto tranfuerfo adalligatur, fpinæ
item ac ftomacho iūgitur. Vena illa grandi pluſq; cæ-
tera mēbra cordi refpondet. huc ahorta non pertinet,
quoniam primo iecoris ingreffu euidentior efferet, et per
omnes distribuenda partes efferet, ficut in pulmonibus
apparet. a corde enim vitalis vis per venam maiorem
in iecur infundit vt dictum eft. eadem enim via reci-
pit, ac fubminiftrat humorem. Ex inferiore parte ca-
ui fel dependet. in eadem parte caua ex diuerfis locis
quidam venarum concursus eft, qui porta iecoris di-
citur, ductuum viarumq; veluti compitum efficitur,
quibus fuccus is quo alimur permeat, flatimq; intus
in quinos riuos diffunditur, & in ptenues venas, quæ
deinde per totam iecoris difperſę fubftantiā, in exilem

Anatomices

subtilitatem admodum radican-
tur, demumq; in iecur
ipsum oblitterantur, his tenuissimis fibris saniosus suc-
cus decoquitur, ac in sanguinem (vt multi volunt) ie-
coris ministerio calore vertitur, qui demum in corde pe-
nitus absoluitur.

De venis Iocineris

CAP. XIII.



Ena octonæ ad portas Iecoris deriuant, ex
quibus binæ paruæ sunt, quarum altera ad
pyloron & ad messenterium pertinet, altera
inferiori ventriculo iuxta pyloron coniungi-
tur. Reliquæ senæ sunt, ex quibus vna ad dexterio-
rem stomachi partem iter tendit. Secunda ad lienem gran-
dior pertingit. Tertia intestino recto iungitur, in sinis-
teriore enim partem decurrit. Quarta ad dextram
ventriculi partem, vbi in tenues fibras diuiditur. Quin-
ta duplici propagine, altera omento applicatur spar-
giturq; e regione illius rami qui a liene oriri cernitur.
altera propago craïssiori intestino adiungitur, qua suc-
ci reliquæ attrahuntur. Postrema ad ieunum intesti-
num ac tenue, & ad id quod cecum appellauim⁹, per-
tinet, ad quã euidentius pleræq; venæ ad succum exhaus-
riendū cōtēdūt. De flaue bilis folliculo CAP. XV.



El non habent omnia animalia, equo, mulo,
ceruo nō est, & ex eodē genere sunt quæ par-
tim habeant, et partim non habeant, vt mu-
res, oues, ac homines. Et qui fellis naturā (in-
quit Plato) sensus alicuius gratia esse opinantur, nō re-
cte sentiunt, volunt ideo fel adesse, vt partem animæ
fitam in iecore mordacitate sua excitet, laxando exhi-
laret. Folliculus flaue bilis ex inferiore iecoris parte ca-
ua dependet, choledochus a grecis dicitur. in eo humor
flauus est, pallidus interdum visus a Galeno vel cya-

nei quandoq; coloris vel isatis herbe vario corporis affectu, in cadauere colorem omnino mutat, in viuento flauus est, ex iecore oritur, vt puriorem prestat sanguinem. Huic binii meatus sunt, alter in medium iecoris deriuat, quo bilis attrahitur vel effunditur interdum. alter euidentior ad pyloron defertur, in quo meatu calculus olim repertus est, ex eodem rursus oriri traditur qui in imum stomachum tendit, quod alij negant. Sed hoc non perpetuum est, omnium maximus, ad intestina producit, quas lactes appellauimus. Quibus fel non est, valetudo firmior existimatur, ac vita diuturnior, bilis alioqui via preclusa morbus regius (qui ictericus dicit, ab alijs arquatus) puenit, nam toto corpore felle suffuso naturalis color aufertur, quod primum oculis deprehendimus, ita quod in ijs album esse debet, luteum fit, febres quoq; superueniunt. Intestina hactenus magna ex parte indicata sunt, idcirco omnia preter iocineris gibbum quod vene grandi annexum est, relicto ventre abijcienda sunt.

De renibus.

CAP. XVI.

Is peractis binę vene grandes secundum spinam a summo deorsum deferuntur, de quibus postremo libro agendum est, vena grandis in renum opposito geminos ramos emittit in. λ. litterę figuram, quorum alter ad renem dextrum, alter ad sinistrum tendit, in equali tamen longitudine, eodem modo et altera vena gradis facit, ahorta dicta, spinę anexa, quoniam dexter ex renibus minor, pinguis, altior leuo est, quod pari ratione in supcilijs contigit, rami venę maioris in sinus renū nō deriuant, sed capitibus potius adherescunt, & cauum nō subeunt, verum in corpus eorum absumuntur, sicut et

Anatomices

ahorta, ex quibus genitale semen magna ex parte generatur. Oblongi sunt, bubulis renibus similes, veluti e multis renibus compositi, a parte interiori resimi, ab exteriori versus intestina rotundiores. caro ijs dura ac firma est, sensu carēs, utriq; adeps e medio exit. Renes in longitudinem secandi sunt, & specillo immisso collaturę ratio cōsideranda est. in medio pellicula est prętenuis, qua humor duntaxat sine sanguine distillat per meatus siue venas albas, vretas dictas, quę cavę sunt, nervosq; iuxta spinam ipsam per venas se porrigunt ad ilia, angusto itinere mox in coxam utrąq; conduntur ac delitescūt, deinde denuo porrectę in clunes apparent, verum vt ipsarum postrema, vel in sexu virili ad vesicam, genitaleq; cōiiciuntur, sic in foemineo ad vuluā pertinet. Eę venę quę de medio renum exeunt nichil cōmune cum vena maiore sortiūtur. Renes membranulis integuntur quibus sentiunt, calculo laborant, quia multi renes laborare videntur, duplices constituti sunt, vt equale corporis libramentum Galeo auctore animalibus prestarēt. ex superabundanti calore, incontinentia, & vrinę stillicidia sequūtur. In meatibusq; arenę materia, ac calculi generantur.

¶ De venis seminarijs

CAP. XVII.

Seminarię venę geminę ad capita testiu a renibus deueniunt, pori dicti, sanguinolenti, totidemq; arterię de vena ahorta exangues p̄tenduntur. nam in coitu spiritus, semen antecedit, quo procul per salt⁹ propellitur. a capite autem ipsorum testium meatus excipit, spissior illo superiore atq; nervosior, qui p̄gressus p̄ testē flectit sese, inde et caput eiusdem repetit, vnde rursus in idē coeunt, & in p̄te priore subeūt genitale, p̄stataę dictę, cōmuni exci-

piuntur canalicula, et continua membrana obuelantur, cum ijs qui resident testibus, vt vnus esse meatus videantur, nisi mēbranam sensim diduxeris, humorē enim sanguineum continet meatus qui residet, sed minus q̄ illi superiores. at vero qui reuertuntur, & ceruicem subeunt, genitalem vrinam habent cādicantem: quin etiam de vesica meatus profertur, & se ad ceruicē applicat, quem veluti putamen canaliculatum ambīt, id quod penem vocamus.

¶ De semine.

CAP. XVIII.

Semen corporis supuacaneū alimentū est, qđ pricipaliū membrorū materia pura atq; absoluta est, generatiōi necessaria. Nā et maior gēiturę q̄titas ex cerebro (Galeno teste) diduci creditur, ob id salacissimo cuidā, dissecto post funus capite, cerebri exiguū repertū est. venę enim quę ultra aures ferunt, si adurūtur vel secant, sterilitatē iduci miro atq; secreto naturę limite, vt mox dicemus, qđ casus edocuit. idē ex alijs quoq; mēbris cōtingit, nā multi qui gallos castrāt, lūbos cādenti ferro, aut crura adurunt, vnde ex toto corpe secerni geniturā pleriq; autumant, varijs argumētis. Illud imprimis fidē facere videt qđ filijs notā, neuū vel cicatricē parētis similē regnari, nisi qđ et nepotes pgenitorū referūt et formā et notas ex quib⁹ nichil secessit seminis. Elidę q̄ cū ethiope cōcubuerat, nō filiā pepit ethiopē, sed nat⁹ ex filia, ethiops erat. Vidim⁹ et i stirpib⁹ id fieri, nā cydone mal⁹ medica plurima est, q̄ ad priapi similitudinē poma fert, ex eis semina qđā eādē formā referūt, alia cōfusā, ex qb⁹ semina sata eādē quoq; turpitudinē repñtāt auitā pōa enata. Semē hoī in pria etate validū est, senectute, valetudine, salacitate, ipurū est, itrinsec⁹ ex loco calido pfi.

Anatomicés

ciscitur quoniā crassum refrigeratūq; humescit, spiri-
tus & aque mixtione, ob id & albū spirituosumq; red-
ditur, quod neq; coit, quoniā ex spiritu est. Ex corde
quidē per arterias, ex iecore per venas, & ex venis ar-
terijsq; cerebro descendētibus ad mīmas circa lūbos,
deinde venas ac arterias mīmas ingreditur, et in con-
ceptaculis mature in sanguinis substātiā concoqui-
tur, inde ad maiores ac ampliōres venas deferē, vt ex
ambabus vnū vas singulis testibus cōstitueretur spiri-
tibus plenum, in quo illa generādī vis recipitur, quod
alijs testibus attribuunt, ex qua generātī simile alterum
producitur. Nōnulli veronaturali calore seminis pli-
fici, materiā inter eos meatus sicut et in vtero sensim
veluti sudorem colligī asseuerāt, vt vasa terrea inania
obturata in mare demissa aquā dulcē intra se accipiūt,
vel catarticis ad stomachū vel intestina, vel ex pulmo-
ne malos humores sine certo venarum meatu resudan-
te intus materiā miro naturę opere euocant.

De testibus

CAP. XIX.



Estes didymi appellatī ita ī homīne pēdent
vt impetus rei venereę magis sustinerent, mī-
nusq; proni fierēt. His plurima est voluptas,
vt Alexander Aphrodisieus refert, quoniā
ab ictu percussī magnopere dolent, ijs exectis tota fe-
re virilis forma ac habitus corrūpit, foemininiq; fiūt.
nam vires, audaciā, mores, vocem, barbamq; amit-
tunt. Hos seminarij meatus ambiūt, nec ingrediūtur,
vt quidā falso prędicant. verum (vt Aristoteli placet)
motum excremēti genitālis stabiliōrē faciūt, nichil gi-
gnente sine ingentibus causis natura, nam replicatio-
nē dūtaxat seruāt eo argumēto. Quod taurū aliquā-
do excisum vaccam protinus inijsse, nondū retractis

meatibus progenerasse traditum sit.

¶ De scorto

CAP. XX.

DYdimis proprium velamentū ac munimen-
tum est scortū, gręci oscheum dicūt. depen-
det ab inguinibus, rugosum, venulis disper-
sum, ima sui parte sutura cōmittitur, quę tamē aliqui-
bus non est. Id si tumet vitio indecorū vocatur, de quo
in libris quos de omnibus morbis qui mēbratim sen-
tiuntur exposuimus. herniā nominant. At intus tuni-
cę sunt, quę testes velant, per singulos nervos depēden-
tes, quos cremasteras gręci appellant, cū quorū vtroq;
binę venę ac arterię descendūt, quas paulo ante indi-
cauimus, quę tunica integūtur tenui, neruosa, alba, si-
ne sanguine, supra quā altera est valētior membrana,
quę interiori vehementer ima parte inhæret, edarion
gręci vocāt, multę deinde membranulę venas & arte-
rias eosq; nervos comprehendunt.

¶ De pene

CAP. XXI.

Penguini deinde coles ipse cute veluti annexus
dependet, ceteris mēbris magis neruosus, ar-
teriosus, venosusq; videtur, nervis durioribus
et neruosis connexionibus cum pectine committitur,
nerui alij ab imę spinę medulla descendūt, ceterum id
membrū minoris sensus est. Vidim⁹ olim chirurgum
quēdam impiū ex iudea gēte vnum ex ijs nervis ob
inflātionem extraxisse, singulis enī diebus a ra-
dice paulatim cōuellebat, quem tādē letaliter extir-
pauit. Membri extremū glans est, tenuissima cōtecta
cuti, quę vim sensificā a superioribus spinę nervis ha-
bet, venereę voluptatis sedes, vñ venę seminarię pecu-
liari titillatu concitātur, in medio quēdā spongiosa in-
anitas est, quam cū cupidinis spirit⁹ subit, tentiginem

Anatomices

facit, excitari quoque vel in morte ab ictu phalangij auctores tradunt. Alter item ductus est incertus (vt quibusdam placet) in pubertate quidam lētor inde transmittitur, ad geniturā veluti rudimentū seminis. Glās imo círculo ambiente finit, a vertice ad imum frenum ducitur superiore rimula, quā vretram vocāt, recrementi liquidī, ac seminis exitus. Quod integit, prēpucium dicitur, hoc iudea gens reliquumque fere pluribus iam aetatibus genus humanum prēter christianos ex lege circumcidit mundicie (vt dictum est) causa, quod postea ad sacra refertur. Penis cutis qua integit, non simplex est, sed nervosa nature, sensumque tactus plurimū possidet. Ob eam causam venereo cōtactu, nouus vel saltem medicis ignot⁹ prioribus, siderū pestifero aspectu morbus gallicus ad nos ex occidēte, dū hęc edere mus, irrep sit, tanta omnium membrorū fœditate cruciatibusque, nocte p̄sertim, vt lepram alioqui insanabilem siue elephantiasin horrore superet, non sine vitæ pernīcie. Hęc pestis reliquas prouicias iam infestauit, quę etiam præsantis facile repullulat, magna omnium medicorū ambage. Ex occidente venere emperici, qui magno questu vrbes circuierūt, id tantū profitētes,

De vesica et eius meatibus CAP. XXII.



Enę vretre dictę albę ad vesicā (vt supra memorauimus) ferūtur ea parte qua duplici membrana constat, quarū altera peruia est, et inter tunicas vrinans humor prēterfluit donec ad interioris pelliculę foramē pertineat, & in vesicam cadat. hi enim meatus non oppositi sunt, quoniā vesica repleta vrina ad renes retrofluere cogeretur interdum, sed ea quo magis impletur, eo magis membranę dictę se comprimunt. Et ita recrementum id liqui-

dum continent, ex quo vnū tantum meatum quo ex-
cernimus imperiti habere arbitrātur, simplicē esse vesi-
cam ex omni parte putātes. Ea neruosa est, aliter viris
atq; foeminis posita, nā in illis iuxta rectum intestinū
potius in sinistrā partem inclinata, in his supra ora ge-
nitalia constituta est, superq; elapsa ab ip̄a vulua susti-
netur. Duo item meatus ab ahorta validi & perpetui
ad vesicam procedunt, nullusq; a vena maiori huc ten-
dit, qui vero de cauo renum veniunt, cum vena maiore
continuata nō habent materiā, vt supra a nobis di-
ctum est. Vesicę vero ceruix carnosa est, musculis refer-
ta, quibus humor cōtinetur, atq; laxetur, cū opus est.
Incisa sola coalescit, reliqua pars coire nō potest, quod
ediuerso contigisse refert Aristoteles. In masculis vri-
næ vię longiores atq; cōpressiores, ad imū vsq; colem
descēdūt, in foemineo vero sexu breuiiores plenioresq;
cōmuniq; demū via ad vuluę ceruicem se ostendunt,
quapropter mulieres calculis minus afficiūtur, in vesi-
ca præter calculos setarum veluti quēdā capillamenta
nō sine diro cruciatu innascuntur ex mucosa equidem
materia. Quibus modis extrahi lapides cōueniat, ne
chirurg⁹ loci errore letaliter ægrotis vulnus inferat, cul-
tello locus aperiēdus, indicandusq; modus est. Aliqui-
bus quēdā in vesica cōcrescūt, q̄ nichilo a cōchilijs ip̄e
differūt, sediā ad mulierū peculiarīa mēbra trāseam⁹.

¶ De mulierū meatib⁹ seminarijs CAP. XXIII

DE foeminarum genitalibus membris, ac ve-
nis seminarijs hoc in loco dicere par est.
Venę igitur humoris, quem prolificum
plerique medici prædicant, eandem ferē
me in foemella, quam supra diximus in viris, origi-
nem habent, ac flexuosis orbibus in testiculos deri-

Anatomices

uant. inde ad vuluæ ostiū tendunt, vnde semen tanta voluptate prorumpit, quod vanū atq; inutile philosophorum princeps Aristoteles asseuerat, cui et arabs Auerrois subscribit. verumtamen fateor ex renibus spina, coxis, lūbis. Venę, ac arterię multę quę sparsim funduntur in fibras per vuluā tenuissimas tendūt, ex quibus genitālis humor, crassus, albus, ouī albori similis intus colligitur (vt bilis quotidie in stomacho) ad cōceptum necessariū, quod in ouis contingit, in quibus quod candidū est, ac luteum a foemina prodit semine maris tantū constituyente, ex ea materia membra quę spermatica vocamus, generantur, at ex mensibus rubentia qualis caro est nutrienti similis fiunt. Aristoteles de piscibus hęc refert, ouo autem rupto, foetus veluti nucleus cōstat, qui primū nullū accipit cibum, sed ouī humore iam hausto increscūt, post nutriuntur aquis dulcibus fluuiorū vsq; dum satis augeātur, idē author an id verū nō dicitur, alimentum omne esse extrinsecus, sed protinus vt in plantarū seminib⁹ inest aliquid tale primum quod lacteū vocatur, sic in animalīū materia excrementum cōstitutionis alimentū est, incrementum vero foetui per vmbilicū contingit, eodē quo plantas modo per radices, atq; etiā animalibus ipsis vbi absoluta iam sunt, ex eo qđ continetur alimento idem accidit. At quod foeminis in venere prorumpit nō per saltus exit sicut virile, quoniam inutile est et viciato simile, omnino differens ab eo quod intra vuluā sine libidine quādoq; restagnat. Ex vtriusq; itaq; maris et foemine foetus mēbra figurantur, ac spiritalis vita pducitur. verum ex virili semine principalia mēbra, ex foemineo cetera ignobiliora cōstituuntur, ex puriori veluti materia, sicut et spiritalis vigor. Maris enim semē in

medio genitális foeminei alboris colligitur, vt generandi potestaté in materiã vniuersam diffundat, ex Galenis sententia, atq; ita mēbra formantur menstrui sanguinis adhuc nō indiga, donec exhausta materia maiori corpus indigeat nutrimento, qđ ex vmbilico postea queritur, a cōceptu enī ad. vii. vsq; diem seminis plifici fluxiones simplices apparēt, quo tēpore & vmbilicus inchoare, & secūde vident. x. die cordis bulla tumet, spiritu intus ebulliēte, et calore extrinsecus exiccāte, secundarum materia firmat, quoniā & planta & cortex eodem generātur tēpore, post eos dies cetera mēbra describuntur, nec vno tēpore principalia generātur membra, quoniā diuersę sunt naturę. Cor enim primū pgenerat, exinde reliqua describunt mēbra. postremo replentur pictoris imitatione. circiter diem. xxx. masculinā figurantur mēbra ex Hippocrate, alij tamē inter quos Aristoteles, mari. xl. diē statutū pronūciauit, foeminę triū mensium vel post, quoniā figura in humido post abortū nō permanet, sed statim dissoluitur, massi in aquā frigidā diffūdit, cogitur cōsistitq; in mēbranula, qua rupta foetus ipse apparet magnitudine formicę maiusculę, & mēbra iam inde discreta, tū cetera omnia, tum genitalia cōstant, & oculi vt in ceteris animalib⁹ pgrandes. Eadē de causa ceruinū vterū olim resecauim⁹, in quo hinnuli foetus, minimi digiti lōgitudine ex omni pte figuratus, vel maxime ceruo grandiori respōdebat pter oculos qui grādiusculi erant, vulua humoris albi lenti plena, oui anserini amplitudine, mēbra q̄tenuissima ambiente, in medio humore sublimis pēdebat hinulus, ex cuius vmbilico capillamētāris tenuitas sanguinea ad cutē ambientē cōmitti videbatur, alimenti pximū inituū, albugo illa quā foemini d. i.

Anatômices

num semen fuisse cōtenderim, nō ab re a natura i vtero continet, sine sanguis menstrui nota, verum primas partes suas agit, quoad maior fiat foetus. Testes in foeminis ab vtraq; parte resimī sunt, leporinis similes, ex quibus (vt alij arbitrātur) meatus alij ad vuluē cauum exeunt generationi apti, quæ sententia resectione ipsa facile ostenditur.

De mulierum locis

CAP. XXIII.

Ostium vuluē in muliere, ac in ceteris animalibus, naturā atq; os genitale vocari vidim⁹. in medio tunicula vtrinq; apparens, nympha, & clitoris dicit. Ea itus natura ita custoditur, vt in maribus glans præpuciū tergore, vt hoc primo munimento aer arceatur. Interior pars ceruix vocatur, in cuius medio fere nervosa exilitas est, venulis dispersa tenuibus, virginitatis testimoniū affert, eugio vel hymē vocant, primo enī coitu scinditur. Naturalia interdū adeo cōpacta sunt a natura, vt chirurgi opa indigeat. Partē interiorem matricem, locosq; appellamus, qui desiderio coitus sæpe descendūt, in ijs quæ acetabula sunt dicūtur. Quibus p vmbilicū foetus auget vulua nullā vim imutandi seminis, sed cōseruatricē tm possidet. locorū ostium internū natura glādosū est, ad glādis virilis similitudinē mucronatū, foras in ceruicē prominens suo turbine. In ceruicē triplex ostium est, ob eā causam grauidę (quia dolēt) coitū refugiunt, mulieres vero adamant, vnde et quādoq; supfoetāt. Vuluē acetabula nō omnia pfecta animalia possident, sed cornigera & vna parte dentata, dū partū gerunt, ex vtraq; parte dētatis lepus, mus, vespertilio habēt acetabula, Sus vuluā leuem habet, et conceptus vuluē non acetabulis adh. ret, semen itaq; trahi a locis vteri, atq; ob eā

rem multa generari pro numero locorum, & acetabulorum. sepe enim eodē in loco vteri, gemini consistunt. Acetabulis vuluæ ex secundis robustior adhæret ea parte qua cōfusa quedā fibrarū multitudo est. Umbilici orificia acetabulorum orificijs respondēt, vnde alii dicimus, asperitas enim vtrinq; fibrarum orificiorūq; tenacitatem facit, vt in parietibus fieri solet, scalpunt enim prius vt cementum superinductum magis hereat asperitati. Umbilicus cū inuolucro, hoc est secundis, functus officio ab acetabulis abscedit, vel vtī pomi pediculus iam maturi a ramo sponte cadētis. Ex ijs acetabulis a partu mēstrua profluunt, similis in maribus materia est quæ in semen genitale per concoctionem vertitur. Mēstrua de quibus mox dicimus, cum plurimum lunæ motu singulis mensibus profluunt, quo profluuiū virginibus vox mutatur. vt in maribus primo coitu. māmē inde tumescit. Homini umbilicus dū nascitur maior est q̄ in ceteris animalibus, quo tēpore alimētū nō reddit, ideo venę, arterięq; circū quas tunica est cōprimūt sese, & ob eā rem puerperij exitus oportune fit, nā in homine deligari oportet, quia imperfectior editur ptus, bruta vero robustiora, q̄ statim p̄siliunt, nascunt. Locorū ostiū in cōceptu aperitur, et exinde clauditur, nec ampli⁹ recludit nisi mulier sup̄foetet, vel fluxionibus laboret, vel si menses fluāt, os id adeo occlusum est, vt aer subire nequeat. Loci ipsi positurā habēt inter spinę imę partē, quā os sacrū vocamus, supra vesicam, cōtra mediā positi aluū, inde paulū ad dexterio rem coxā cōuertunt, postea super rectū intestinū progressi ilijs, foeminibūq; latera sua annectunt. rectā cū vesica, continuatamq; ceruicem habent, quem canalem vocant, qui ceruici vesicæ suppositus, carnosus, d.ij.

Anatomices

chartilaginosusque admodum est, is in pugnate contrahitur,
 vulua in virgine exigua est, in muliere, nisi ubi grauida
 est, non multo maior quam manu comprehendi possit. Ea, cor
 di, arterijs, nervis, cerebro, spineque medullę committitur.
 pectorijs item, manibus, renibus, ventribus, coxis, pubi, que
 omnia in vuluę stragulationibus percipiunt, quibus ani
 ma subducitur, vertigines sentiunt, capillos in vertice vel
 occipitio conuelli arbitrantur. lumbos preterea, femora, ingui
 na, et stomachum dolent. gula item miro modo tumet, eui
 dentiori in viuente argumento connexionis, ea vincula
 in mortuis languescunt. Id alij ceteris vaporibus attri
 buunt, quos vulnerata statim vulua coarguit. In qua re
 oculos maxime dolent, quedam obmutescunt, aliquibus
 mentes soluuntur. Illis presertim adalligatur neruulis qui
 busdam retortis, qui grauidis prehenduntur. Nulla vena de
 maiore, recta via ad vuluam pertinet, de aorta vero
 multe frequentesque veniunt, eius materia nervosa est,
 rugosa, pelliculosa, pollicaris crassitudinis, que ad con
 ceptus magnitudinem extendi possit. Qui eo tempore
 acetabula vuluę inquirunt ad magnam vulgi desiderium,
 digna frustratione frustrantur, videri enim minime pos
 sunt, nec primo conceptus tempore, quum inuolucra
 (que secundas vocant) robustius vuluę adherent. Tum
 enim euidentius membrana valentior per vmbilici ra
 dices acetabulis, quę cotyledones graeci vocant, com
 mittitur, quales in polyporum cirris videmus, qui su
 ctu cum aliquid capiunt, continent. Hęc accrescente foe
 tu conspicua, prope partum minuuntur, ac demum
 abolentur, hęc conuexo suo coniuncta sunt cum
 vtero, cauo autem ad foetum conuersa ex Aristote
 le. In ipso inuolucro ex secundis quedam carnosae
 extantia fibris referta minimis acetabulis affixa, quę

sanguinem et spiritum veluti radicū fibrę exugunt, digeruntq; per venas, & ad vmbilicū vsq; defertur sanguis, spiritusq; per quem alimētum haurit foetus. Gemini matrici sinus sūt, ab vtraq; laterum parte leuiter discreti (in dextra masculinum, in sinistra foemininum concipi volunt) geminis in mare testibus respondentes, in vacca veluti cornua plurimū discreta sunt.

¶ De mensibus

CAP. XXV.



E mensibus mulierū pauca dicenda restāt, ac eorum origine. ij. non nisi semen incoctum ab Aristotele appellantur, ex partibus quæ supra infraq; renes sunt, & a lumbis, minimis venis prodeunt ad vuluæ acetabula, quibus foetus in vtero alitur (vt sepe dictum est) vel a puerperio iuxta naturalium ora. ex venis quoq; duabus secundum os pubis iuxta vrinę exitum erūpunt. Ex ea parte & foeminarum non prolificū semen in coitu (vt dictum est) effunditur, tanto in plerisq; impetu vt masculorum more lōgius exiliat, diuersę equidem naturæ ab eo quod in vuluę cauo prolificū rellagnat, vt supra latius cōmemorauimus.

¶ De ano

CAP. XXVI.



Lui exitus anus dicitur, vbi musculi sunt, quibus astringitur cum opus est, aut laxatur. inibi venarū ora sunt tanq̃ ex capitulis quibusdam surgētia, quę sepe tetrū sanguinem fundūt, sicut e naribus, hæmorrhoidas græci vocant. eo profluuiō purgationis vice vtūtur, nec valde imbecilliores ob id fiunt. ideo importune quidam curati, cum sanguinis exitum non haberēt, inclinata in præcordia ac viscera, dira illa materia, subitis ac grauissimis morbis correpti sunt, in eadem parte quæ corona est et sedes dicta.

d. iij.

Anatomices

cōdilomata inascunt̃ tubercula quedā, q̃ nūc dura, nūc mollia, quę ex inflāmate oriri solent. Verū si vetera et iam induruerē, medicamentis causticis interdū aduruntur. Mariscę item & rhagades anum infestant cute circuncisa. Hos morbos lasciuia luxurię procacitas, & æstuans libido facit, nō sine naturę & maiestatis diuinę iniuria, & vtriusq; lege calcata vitiorū inuētrix libido, quę neglecta natura, diuerticula queritat, hoc est genus humanū perdere. Vtinā eorū parentes eam dūtaxat venerē nouissent. Anus sicut & vulua procidit, quā sedis procidentia vocamus vel sedē conuersā, quā stypticis retroagimus, vlcera itē & fungi, similiaq; inascuntur, quę aduri solent. Hactenus de interaneis quę sub p̃cordijs posita sunt, narrauim⁹. Nūc ad ea quę spiritalia vocantur, transeamus.

In librum tertium anatomices.

¶ Alexandri Benedicti physici de mēbris spiritalib⁹ quę supra p̃cordia habentur. Prefatio. CAP. I.



Vpra diaphragma, cor pulmōesq; collocauit natura, vbi (vt inquit Plato) audacia, metus, fuga, cōsultores amentes sedem quādoq; posuere, cū implacabili sepe iracundia. Amor itē intrepidus inuasor, blanda spe socia, castra fixere. Quę si puerſa fuerint, voluptatem malorum seminariū, & dolorem subinde parent consueuerunt. At si fortitudo ediuersa omnium contemptrix mentis bonę filia, cupidinis et voluptatis iussa contempserit, vbi animus forte pallore terrētium obiectu pertimuerit, sanguis et spiritus venarum numerosam veluti supatorū legionē ad im-

perata subito accurrentē citat, tum celeriter metu dis-
cusso sua potētia animi fortitudo vtitur. Pari modo si
irē vis exardescens ex improviso permiscet flagrantēs
astus, pulmonū cum cauis fistulis spiritus respiratiōe
cordis crebra refrigeratiō cōtinuo temperat ratio, vnde
de iracundia alioqui implacabilis facile resedit, cui in
hostes voluptates, & cēteras animi pturbationes po-
testas data est sapiētibus, qui animi fortitudine & cor-
poris patiētia libero Marte eminus librata tela alacres
excipiunt, & cominus incussos in cordis penetralia
graviōres ictus irē aut odiī propulsant inanes. In his
tota philosophia versatur ac totū bene viuēdi dogma
moratur sedibus. Huic leta fœlicitas originē ducit, hu-
ic mortis terricula abigunt, atq; ad diuina mens subli-
mis penetrat arcana. Ad has partes hac nocte in hoc
ipso theatro præsentes esse volo senatores meos sapien-
tes ex patricia gente Veneta, Bernardū bembum, An-
tonium Boldū æquites. Antoniū item caluū triumui-
rum, Petrum priolum senatorem, qui mecū diuinam
cordis officinā contemplantur, & arcana naturæ per-
quirant, iam perspectis & compositis reipu. rebus, &
domum fessi, sed hilares abeant.

¶ De membris spiritalibus.

CAP. II.

Spiritalia membra inter caput & ventrē sedē
obtinēt, nam & cor (cuius gratia omnia con-
stant) in medio eorum collocat, natura enim
rem nobiliorem locis nobilioribus cōstituere
solet, verū potius superius q̃ inferi⁹, ac in parte priore
q̃ posteriore. Potiusq; ad leuam q̃ ad dexterā nō sine
rōne collocatū est viscerū principale mēbrū, qđ in om-
nibus aialib⁹ conspicit. Nā cor calorīs officina est, vite
d. iiii.

Anatomices

mentis origo, sanguinis spiritusque principium. Omnium enim partium primum, sanguinolentum conspicitur, ut in ouis triduo incubatis puncti magnitudine apparet. Formato corpore primum quasi alterum intus aial palpitate sentitur. thoracis pars superior pectus dicitur, inter laceratos homini constitutum, latum, cordis & mammarum ratione, costarumque crate cordi munimentum. Sed ab eo primum membro, quo ignobiliores a nobilioribus partibus diducuntur, dicere incipiamus, hoc est a septo transverso. Deinde membra quae ore ipso continentur (quia huic parti & ventri accommodata sunt) ordine dicentur.

¶ De septo transverso. CAP. III.

Septum transversum sub pulmone collocatum est, cictum alij appellatur, veteres (quoniam cordi preterduntur) precordia dixere. diaphragma alij, Plato vero phrenas, ceu prudentiae participes mentesque coniunctas, unde quidam mentis subtilitatem accipi putauere, ideo ei nulla caro est, sed nervosa quaedam exilitas, in medio praesertim, quae valida est. costis inferioribus & spinæ, ubi. xij. vertebra sita est, annectitur. sedē cordis a ventre & ab intestinis dirimit, ut vitæ origo alui vicinitate excrementisque inoffensa seruetur, neve ciborum vapore animus supprimatur. hac de causa precordiorum interuentu, quasi pariete, distinxit nobiliorem ab ignobiliore parte. Hæc si pleniora esset carne, maior vaporis copia & haberet et attraheret. huic titillationis origo, nam solus homo titillatum sentit inter animalia, quod cutis tenuitate euenit, unde solus animalium ridet. Est enim (teste Aristotele) titillatio, risus precordiorum ratione, quæ nervis (ut inquit) quibusdam alas subit. Nam calore leuiter precordia calefaciente mouet inuoluntarie risum. ob id gladiatorum spectaculis mortem cum risu traiecta præ-

cordia attuliffe vifum eft. ea mēbranulis q̄busdā deorfum verſus lienē a iecore diftermināt, neq̄ id ſolū, ſed ſurſum verſus mediū quoq̄ pulmonē diuidūt ac ſuſtinent, nā & in ſpirādo iuuāt. et in exonerādo ventre vim habēt, quā apocriticē vocāt. Leſis p̄cordijs alu⁹ ſubſtat, vel ex inflammatione mēs protinus, ac ſi cerebrū afficeret, omnino cōmota cernit. vnde phreneticis nomen

¶ De mammis

CAP. III.



Ediū igitur pectus a punico malo (vt diſſectiōne ordine perſequamur) ad iugulum vſq̄ aperiēdū eſt, cultroq̄ cutis deorſum verſus ad latera diripiēda eſt māmārū ratione, nā et mulierum partes ſuis locis p̄tractandę ſunt. eę ab vtraq̄ pectoris parte extuberātes conſtitutę ſunt, media his papilla, adiuncta infantū cibo, māmīs laxior cōtextus eſt, in quibus & adenes, carūculę glandoſę fungoſę ſunt, ceterū ac foraminulētę naturę, quod in cadauere aſſeruato euidentius cōſpicitur. Maribus caro ſpiſſior eſt, in quibus lactis ſimile cōpertum eſt dū hęc conſcriberemus. M. maripetrus ſacri ordinis equeſtris tradidit ſyrum quēdā cui filius infans, mortua cōiuge, ſuperat, vbera ſępius admouiſſe, vt famen filij vagietis fruſtraret, cōtinuatoq̄ ſuctu lacte manaiſſe papillam, quo exinde nutritus eſt magno totius vrbis miraculo. Idem Ariſtoteles de lacte in maribus, verū tamē (inquit) p̄ ſuctū frequentiorē, vel multū p̄diſſe aliquibus traditū eſt. Vidimus mulierē etiā cū virgo eſſet, cui quoniā infocūda erat menſes ſubſliterāt, lacte ſemp̄ diffluiffe, idē author pilos in māmīs mulierum inueniri ſi fortę in poculo pilum hauſerit, idq̄ malū pilare tradit appellari, nec dolorē ſedari donec pilus preſſus exeat, vel ante lacte exugatur. Alij id negant, quoniā multa ſponte ſua

Anatomices

gigni in corpore videantur, quæ plerumque, malis medicamentis fieri arbitratur insana vulgi credulitas, inueteratis enim (vt inquit Galenus) abscessibus ob varias humorum qualitates, materiã in calculum, harenam, ligna, carbones, amurcã, fecem, i setas porcinas, in aliasq; istiusmodi formas cõuerti constat. Aliud malum peculiare mãm̃is colostratio vocatur, quam inhihet per mensem ante partũ aloe ex rosacea sepe illita. Venę illę ab vtero sursum ascendentes (vt Galenus scribit) per confractũ discurrunt, vt tardiori motu sanguinis aptius concoquatur, qui demũ adenum virtute albescit.

De musculis pectoris

CAP. V.



Vsculũ circa mãm̃as plures sunt, qui visu deprehendi nõ possunt. Quibusdã pectus inspiratione attollitur, nõnullis deprimitur, reuocaturq; circa præcordia. Et in superiori pectoris parte collo cõtigui, magis necessarij sũt, læsis enim vix attollitur pectus. Alij id negãt, quoniã impedimẽtum non arguit mēbri potentiã, impedire enim possunt, sed soli cõstituerẽ motũ nequeunt, quoniã vel pulmonis aut diaphragmatis id munus sit, ex Auerroe. Alij musculi a dorso incipiunt, alij itē minutissimi sũt passim dispersi, qui inter costas collocantur singulas, quiq; pectus modo attollũt, modo deprimũt, flammis textũ in latitudinẽ longitudinẽq; cõprimũt. Circa has partes acutissim⁹ oritur morb⁹ pleuretic⁹ a latere dictus. Pectoris ps prior, q̃ cũ costis multa cartilagine cõmittitur, sub iugulis statim constituit, costę vero, quę inter se añectũtur septenę sunt, longiores, vtrinq; lunato sinu. reliquę enim quinę sunt breuiores quam vt facere idẽ queãt, nothę dicte, & rhoę. Summ⁹ vero

uterq; iugulus durus, valēs, & recuruus est, recuruisq; capitibus la cunā efficit, supra quā, ea pars est quæ iugulus dicit. iidē iuguli suis capitibus iuxta humeros terminātur, paululūq; motu brachiorū mouētur, & cum lato osse scapularū infra caput, eius neruis, ligamētis siue nexibus cōnectūtur. Costę sub alis, xij, sunt quę ad ima pręcordia & ilia perueniūt. hę primis partibus rotunde & leuiter quasi capitulatę vertebrarū trāsuer sis pcessib⁹, ibiq; paululū isinuatis, inherēt. Inde patefcūt in exteriorē partē, recuruatę paulatim in cartilaginē degenerāt. Ea parte rursus in exteriora leuiter flexę cū pectore cōmittunt costarū ima maiore iam parte. Nis chil nisi cartilago est, q̄ mali punici termin⁹ est. Thoracis itaq; partes priores, hoc est pectus, latera, malū punicū, dicta sunt, quibus spiritalia mēbra cōtinētur. Ea pars nō vno osse cōstat, vt suo flexu homo ad necessaria opera incuruetur, ac respirari facilius possit. His peractis, resectores pectus mediū vsq; ad iugulū secant, ad aperta q; costarū crate, pulmones apparent, sed membrana prius pleuretica referenda est, quę a lateribus potius q̄ a pectore nomen habet.

¶ De pleuretica membrana

CAP. VI.

S Vb costis pāniculus firmior est, peritoneo similis, pleuretica dicta, singulę tamen costę membranulis suis integuntur. Huic membrana ānexa est, quę medios diducit pulmones, & pectori spineq; annectitur, vt altera pulmonis parte læsa, altera incolumis seruetur. Hoc cauum vomica morbus pure implet, quæ raro a medicis curatur. Sed ad pulmones transeundum est, qui cordis stragulum efficiunt aereque frigido, cordis feruorem temperant. ¶ De pulmonibus

CAP. VII.

Anatomices



Uimones in duas fibras diducuntur, arteria in geminas partes se diuidēte, intermedia mēbrana quadā, quā disseptū appellauere, alij p̄cordia. Pulmonibus spirandi officina data est, cōtinue attrahens, ac reddēs animam, alioqui homo statim rumpitur, quoniā ex volūtaria ac naturali virtute compositus est anhelitus, musculorū cordis & pulmonis officio. Spiritum pulmo, vt Iecur succum, cōmutat pro spirit⁹ vitalis alimēto, reliquum flatu fumoso vel noxio, febriū præsertim vaporibus emittitur. Sinu suo cor cōtinet pulmo, perpetuaq; reflagratiōe fouet, spōgiosus, rarus, fistulis inanibus cauus p̄ter venas arteriasq; spiritus capax est, plurimū sanguinis cōtinet. Quidam exanguē esse putāt in cadauere decepti, qm̄ sanguis statim effluxerit, nam et plurimū dimouetur, et fistula inflatus viuētis posituram eggre refert. A collo statim dependet, dissepto medio diuidēte, hunc p̄ternuis pāniculus vestit. catīs animalibus domesticis valde foraminulētus. ab vltimis ceruicis vertebra incipit, in furnibuli figura, vel bubulę (vt aiūt) vngulę, ad tertiam decimā spinæ vertebra versus septū porrectior desinit, ita vt pectoris vniuersi cauum cōpleat.

De Trachia arteria

CAP. VIII.



Inæ ab oris faucib⁹ canaliculę coeunt, quarū altera breuior exteriorq; est. trachiam arteriam vel phariga græci, latini, guttur vel spiritalem fistulā appellāt. Altera vero longior, interiorq; est. Isophagum græci et stomachū, Latini, gullam et cibalem fistulā vocant, de qua mox dicturi sumus. Illa a faucib⁹ ad pulmones spiritū tātum, alioqui si quid ex improuiso incidit protin⁹ ab ea excutitur. Hęc ad ventriculū cibum, potumq; mittit, q̄q; Platonē alioqui

philosophorū primum ad pulmonē potum defluere, inde in vesicam arbitrātem, merito ab Erasistrato medico reprehēsum cōstat. Platonis verba subiiciā. Pulmonum tegmen cordi adhibuerūt, molle primū atq; exangue, deinde cauis intrinsecus fistulis spōgię instar distinctum, vt spiritu potuq; haulto cordis ardorem, huiusmodi respiratione refrigerio tepefaciat. Alibi itē ipsum potus discursus, quo pulmōes sub renes in vesicam defluens. Hęc Plato, quē sine anatomicis inquisitionibus lapsū esse nō dubitāt, per alteram enim, hoc est gulā, tā cibū q̃ pot⁹ in ventrē, q̃ catocœlia dicitur, vbi cibus potusq; subigitur, delabuntur. Per asperam arteriā spiritū dūtaxat deorsum sursumq; ab ore aut naribus recipitur, ipsa arteria dura est denticulata asperitate, gulę inherens, ceteris partibus per se ad pulmonem pertinet. cōstat ex carne & chartilagineis dimidiatis orbibus in .c. literę figurā cōpositis ea parte tantum qua gulę cōmittitur, reliqua parte arteriæ circuli pfecti sunt. Id de industria molita est natura, ne esculenta crassiora quum delabūtur impediri possint. Hęc pars tenuibus venulis cernitur, ideo sanguinis in eo exiguum est, sursum versus ad fauces iungitur, foraminibus narium supponitur, Bronchon appellāt, quę in oris partem patescunt, vnde fit vt cum potus in pulmonis tramitē deerrauerit, per nares effluat. chartilaginosa arteria est, vocis causa, vt tradit Aristoteles. nā quod sonat, leue ac solidum esse oportet. Antegulam posita est, quia cor in priore parte collocatū est.

¶ De venis & arterijs in pulmone CAP. IX.



Singulari arteria ad plures in vtranq; pulmonis partem diuidūtur, mox in minores intus semitas inde ad minimas fibras spar

Anatomices

guntur, membrū vniuersum cōplentes, quibus inflatis pulmones attollūtur. Dextra pars in tres minores fibras diuidit̃, sinistra in duas tantū distinguitur, venæ maiori a dextra parte quę maior est pulmo connectitur, ex qua riuulos pene infinitos in omnes mēbrī partes dispargit. Ahortæ sinistra quę minor est, coniungit̃ & eius ramos parī modo dispersos recipit. ita qđ sanguinis spīritus & aeris riuuli minime cōtinuātur nec intercurrent, quamq̃ postrema dīminutionū præsua exiguitate vīsum effugiāt, & oblitterētur, quæ si nimium distento pulmone elidūtur, sanguis ex ore prorumpit, pāniculū eius quo integitur miro naturę opere pus, saniesve, aut cruor, aut si quid aliud in pectus influīt, penetrat, fibras, fistulasq̃ minimas subit, inde ad maiores vsq̃ ad trachiam ex qua purulentę, cruentęq̃ excreationes emittūtur, quod in laterū doloribus euenit. Ex pulmone phthisis oboritur, & peripneumonia, asthmaq̃. sed maiestatem naturę vel cōditoris Dei liceat in hac etiānū parte contemplari, qui in humano corpore miracula singulis diebus nobis ostēdit, nam in pleuretico morbo cruentū pus per vrīnę meatum dare quādoq̃ solet. Quod Helio basso Cymbriaci nostri filio cōtiguit in maxima morbi desperatione, vel per aluū aliquando vt ipsi vidimus, hoc magis mirum est, qđ qđ acies scapelli fracta dū venā imprudens veniseca cuiādam incaute incideret, meatus diuersos penetrauerit, postq̃ aurē consisterit, vbi continuis fere punctiōibus percipiebatur, qua molestia leuari sæpe a nobis quesiuīt. Supra fidem est quod ipsi cū in creta essemus vidimus. Rusticus in quodā seditioso tumultu sagitta circa dorsum impacta vulneratus fuit, euulsa sagitta ferrum intus in thorace relictum est, vulnus

frustra perquisito ferro medic⁹ preſanauit, quod poſt biennium per iferna extulit, id miraculi gratia barbatæ figuræ duum digitorū latitudinis oſtentabat. Secū- dum enim diaphragma pri⁹ mucrone penetrauit vbi pars carnoſior eſt, deinde ſecū dum inteſtina delapſum iuxta aluum ſenſim podicem ſecuit, viamq; ſibi ad exitum fecit ſemiexeſum, de qua re magna medicorū con- certatio fuit, ſed de corde cuius cauſa pulmo creat⁹ eſt, dicendum puto.

¶ De cordis principatu.

CAP. X.



Cor ſanguinis fons eſt & principiu, calide hu- mideq; naturæ vt Auerroi placet, vel tempe- ratę ſi Ariſtoteli creditur. Homini infra le- uam papillam turbinato mucrone in priora eminenſ, ſumma vero dextrorſum ſpectat, quod in cadauere plurimum dimouetur. Vi dimus quendā pugiois ictu interemptum diſſecto pectore ruruſq; per vulnuſ pu- gione adacto mucrone neq; cordis neq; pulmonis vul- nerī reſpōdiſſe, tanta eſt in cadaueribus cum viuēti- bus poſiturę differentia. In corde vitalis calor ſ nutri- menti q; principiu habetur, irascentięq; ſedes. Pāni- culi inuolucro firmo veluti vagina operitur. id corporu- lentū, pingue, ac neruoſum eſt, aque plenū, vt cor ppe- tuo madeat, ne i mouendo tergus id impedimēto ſit, ſed vt libere, ac faciliuſ palpitet. Pulmo ad cuſtodiā id ambit vt ſtragulū. tanta eſt viſceris principalis reuerē- tia. Quod inter omnia membra ſolum vitijs non ma- ceratur, nec vitæ ſupplicia trahit grauiora. Cordi (vt inquit Ariſtoteles) nulla bilis appropinquare poteſt, quoniam illud affectū nullū patitur violentū, nam in hoſtia male affectum nūquam viſum eſt, mortem illico

Anatomices

trahit læsum. Et cū cæteræ corruptę partes sint, vitalitas, cuius scdes est in corde, etiā durat, inuolucris aqua exhausta aliquo vitio, cor plus solito palpitat. Cardiacus morbus appellatur, qui ad tabem hominē perducit, quod Galenus in simia sua dissecta perspexit. Cor ipsum natura carnosum ac musculosum, in sūmo pingue, sine osse præterq̃ nōnullis animalibus inuenitur, vt in ceruorum cordibus. A corde omnes venę maiores tanq̃ ex stipite oriri cernūtur, quia in eo nullę venę sunt. reliqua mēbra sanguinē nō habent nisi in venis, tanq̃ in conceptaculis. Et sanguis ex corde ad venas, inde ad mēbra deriuat. in fibris autem iecoris aquosa potius sanies apparet, nec sanguinis naturam habet nisi pri⁹ in corde acceperit. Arterięq̃ ad iecur nō perueniunt, quoniam cordis peculiare sunt.

Quibus magna sunt corda CAP. XI.



Conceptacula cordis (de quibus mox dicturi sumus) quādam quasi articulationē, rimis capitis futurisq̃ similē habere cernūtur, quanq̃ nō ita sit, quod ex pluribus partibus cor compactum sit, sed articulationē notis quibusdā tantum ostendit. Existimantq̃ ea animalia quibus magis ea articulata sint, sensu præstare, quib⁹ minus, hebetiora. Mollia, sensu valent, sicut & caro. ediuerso dura ac spissa. Grandiora vero, pauida significant animalia. contra, quib⁹ minora aut mediocria sunt. In illis enim cordis portione exiguū caloris inest, quod in magno conceptaculo exoleseat, atq̃ sanguis frigidior fiat. Idem in vētriculis cordis, atq̃ venis cōtingit, nam in paruo atq̃ magno domicilio tantūdem ignis nō eque calefacit, sed minus in magno. ita in his calor nō piter agit.

¶ Quare dextra manus sinistra accom-
modatior sit CAP. XII.



Ordinis fibrę quę in ampliore pte sunt ad dex-
tram vergunt, ppter ea vehementiorē calidi-
tatem eo infundunt. quare hominū magna
pars, dextra vtūtur, si vero ad sinistrā, cōmo-
diori sinistra vtūtur, si in medio pectore prorsus equo
libramēto pēdet, utrāq; manū accōmodatam reddit.
hos equimanos, ambidestres Aristoteles vocat, latini
vero scētas nominant, quod Vlpianus ostendit.

¶ De Cordis ventriculīs CAP. XIII.



Cor sinum duplicē habere tradit Celsus, quē
plures ex nostris medicis secuti sunt, dextrū
ac sinistrū. Aristoteles vero tantę auctorita-
tis est apud multa sēcula, vt quę etiam nō viderint, ea-
dem sine experimento affirmant. Et si duos tātum si-
nus se vidisse diiudicent, tres tamen inesse fateantur.
Hęc res in tota medicīna magni negocij est, quoniam
ij Aristotelis sententiā in ventriculorū numero, mea-
tuum, locorūq; ratione longe oberrāt. Inter quos Ga-
lenus alioqui vir doctissimus in Aristotelem apud tot
sēcula laudatissimū nimis quidem iniuste inuehitur.
Nam is author ita de cauis cordis in homine inquit.
Cor habet sinum triplicem, maximū in dextro latere,
minimū in sinistro, medium magnitudine & loco in-
ter utrūq;, omnes ad pulmonē peruij. singulis enim su-
is cauis sanguinē continēt sine venis, & ea septis didu-
cuntur. Ex cauis dexter plurimū sanguinis calidi cōti-
net, ob id pars corporis dextra calidior est, sinister pa-
rū sanguinis plurimūq; spiritus frigidioris, nā aerem
subire cor certū est, qui ab trachia arteria attrahitur,
Medius vero, mediocrē tum copia tum calore, sed te-

Anatomicēs

nuissimum atq; tēperatū (vt iquit) reddīt spīritū. ab eo ahortā originē ducere nō dubiū est. nā cordis hunc sinum principiū esse argumēto cōstat, quoniā id maxime quiescere debet, quod principiū est. tale autem erit si sanguis purus, ac mediocris, tū copia tum calore sit. Nam & positione in viuentē medius cernit̃, & sinister venter tumentior est, nō auris flaccida, vt in cadauere conspicitur. elāguescunt enī omnia, et loco dimouent̃. Minutissimis aīalib⁹ vētres arctiores sunt, ita vt vnus qui āplior est vix conspici possit, reliqui sensum effugiunt. mediocriū aīalium secūdus est conspicuus. in maximis vero p̃spici omnes possunt. Sed sinū spūs frigidioris cū pulmone annexū, aeris receptaculū quod aurem sinistrā nominat Pollux, iter specus nō annūerāt, sicut Celsus et alij posteriores, inter quos & Galenus noster constantissime in Aristotelem seuerius quam par sit reclamat. At Aristoteles naturę nō ignarus duos esse sinus in mucrone tantum conspexit, sed cordis naturam altius contemplatus est, nec aurium cordis vllam mentionem facere voluit. Qui eas in corde posuere, cadaueris tantum posituram considerauere. at ille cautior solertiorq; naturę functionem in viuentibus animaduertit. quod in brutis & maioribus animalibus viuentibus facile considerari potest. Is vero philosophus triplicem esse inquit sinum, dextrū, in cōfesso, sanguinis fontem, et omniū maximum. sinistrū minimū, aerem a pulmone haustrum cōtinentē, quem aurem sinistrā (vt dictū est) imperiti nomināt. mediū vero tum loco tū magnitudine, ac tēperamento spiritalis sanguinis receptaculū, vnde vena ahorta originē habere certū est. Omnes ad pulmōes peruios meatus habent. qm̃ medius p̃ sinistrum ingreditur pulmōnē

per arteriam venalem, qui in maioribus animalibus conspicui sunt. Sed quum binę aures in mortuis videantur, cur quatuor igitur sinus esse non credendum sit? Quibus facile occurri potest. Nam quod iuxta sinum dextrum est non sinus esse potest, quoniā venę maioris statim veluti stipitis e corde exeūtis pars est, & eandē materiam venę maioris continet, nec semper, quoniā ad copiam sanguinis exuperātem dumtaxat constituta est, alioqui vel in viuentibus residet, nec septum vllum, quod a specu maiori diducat habet, quo diuersam sanguinis materiam arguat, quę omnia in sinistro folliculo siue specu esse conspiciuntur. Dextra auris venę maioris potius laxamentū est, non sine ratiōe a natura compositum. Sed qui aures vocauere sinum, ordinem, numerum, ac rationem ignorauere, vnde Galenus maximus alioqui medicorū, et Auicenna pariter arabs ad controuersiā impudēter redacti sunt. Aristotelis verba subiiciam qui de auribus nullā mentionem facit. Oritur inquit ex amplissimo supremoque sinu vena maior, deinde, vt pote (inquit) cum ipse vētriculus cordis venę particula sit i qua sanguis restagnat, et de eadem, vena (inquit) maior sua radice cor trāsigat quum se promit. Hęc sunt quę de specuum numero, natura, ac positione, pro loci conditione breuiter dici possunt. Venę deinde, ac arteriæ circa cor feruntur a dextro & medio cauo, quę ad vtrunq; specū meatibus pertinent. Hinc spiritum, inde sanguinem, mutuīs vicibus reddunt, vnde nec sanguinē sine spiritu, nec spiritum sine sanguine constare possibile sit.

¶ Quę in dextro specu contineantur & de venis eius.

CAP. XIII.

e. ij.

Anatomices

IN dextra cordis parte vbi sanguinis domici-
 lium est, laxamētū id auri simile de industria
 situm est, vt supuacaneū (quod supra cōme-
 moratum est) interdū sanguinem recipiat, alioqui flac-
 cidum, ac dep̄ssum iaceat, propterea finitimus nō fru-
 stra habetur, cū sanguinis redūdantiā, cū opus est, ita
 recipiat. in sinu dextro (a mucrone enim resecādū est)
 binę venę intus apparent, quarum altera (q̄q̄ maxima
 est) ad iecur pertinet, vena magna dicta. ea cor ipse
 ctum sanguinē recipit, hoc enim grandī ductu potius
 recipere q̄ tribuere creditur. ob id in eius orificio ternę
 valuulę de industria a natura positę sūt, quasi claustra
 quēdā mobilia, quę per vices dep̄ssio corde in emitten-
 do sanguine transitū nō penitus p̄cludūt, introrsum enī
 recludunt, distento vero corde sanguis sursum versus
 attrahit̄. sin⁹ hic magn⁹ neruulos carnosiores intercur-
 santes cōtinet, sicut & medius. laterū sinus firmę cōpa-
 ges ne nimio motu conuellant̄. eadē vena ingēs iuxta
 cor āplior est, vt arbor iuxta radicē, et cū cordis mate-
 ria intus cōfundit̄. iuxta portā riuulus quidā ab ea ve-
 na ad cordis fibras circūfer̄, ex quo alij exinde tenui-
 ores in cordis substātiā sparguntur. Alterū orificiū ad
 pulmonē venę arterialis riuo, quo plurimo sanguine
 pulmones abundāt. ea enim duplici mēbrana constat
 (vnde nomē) ne continenti pulmonis motu facile scin-
 datur, vnde si quando rūpitur, sanguinis excreatiōes
 proueniūt. ante ostium huius venę triualuiū est clusile
 quod foras aperitur, introrsumq̄ per vices penit⁹ clau-
 ditur, eaq̄ rōne constitutū, vt in reciprocando cor san-
 guinem valuulis apertis, ad pulmones vicissim diffun-
 dat, iisdem clausis dū attollitur, nichil inde recipiat

¶ De medio cordis domicilio

CAP. XV.

IN medio cordis domicilio vitalem spiritum habitare dicunt, vnde recta ratione id firmitus valentiusque est, nam & arterie omnes eam ob causam duplices sunt circa fibras. Ex hoc cauo duo venarum ora aspiciuntur, quorum alterum quod magnum est a horte iungitur, alterum tenuius ad pulmones mittitur per sinum sinistrum. quod maius est membris omnibus vitalem spiritum usque ad digitorum cacumina spargit contracto corde. In huius orificio ternae valvule pariter constitutae sunt, & firmiores quidem, sicut & nervuli intus, & membranae, quae omnia penitus praeccludunt, ut in retribuendo spiritu facultas sit, nulla vero in recipiendo valvarum oppositu, quae extrorsum praeccluduntur. Iuxta radicem vena, ac arteria exigua est, quae sanguinem & spiritum vltro citroque a dextro ad medium sinum deferunt. quod dissectionibus apparet, ut paulo ante dictum est.

De specu sinistro

CAP. XVI.

HOc sinistro specu, quae aure sinistra imperiti vocant, graeci otta, rugosus caueus, minus quam ceteri carnosae materiae, ad hunc arteria aerem mittit, pulmonem annexus, hinc arteria venalis dicta ad pulmonem tendit, quoniam venae tunicae habet tenuiorem. Hoc tramite cordis feruor dum spiramus, refrigeratur, ex qua parte superflui fumeique flatus qui a corde feruntur transmittuntur, inter hunc sinum & medium inter utriusque confinia binae valvulae ingentes omnium robustissimae, nervulis frequentibus & duris applicatae cordis parietibus totum orificium praeccludunt, introrsum enim mouentur. Hoc bivaluio cauum medium a sinistro superiori diuiditur, venasque geminas ad geminos spargit pulmones, quae ad minimas fibras

Anatomices

descendūt, in quas aer veluti preparatus ad cordis casuum ducitur sinistrum, quod aere albescēs intus cernitur pro spiritalis sanguinis mixtiōe. Ob id valvulę in trorsum spectant, vt potius recipiāt q̄ retribuunt, nā in corpore frigiditas ipsa ad naturalem calorē temperandū necessario habet. Pulmonibus ac corde sublati ad septimā vertebrā glandulę similis est carūcula, thy mes appellata, humoris mali & superuacanei capax.

¶ De gula

CAP. XVII.



T nunc gulę ratio reddenda est, quę post Trachiam arteriā posteriōrē locum tenet. Cōstat ex neruo & carne, vt extendi possit cum cibus ingerit̄, & cedat ne ledatur asperitate cibi descendētis. A faucibus dependet cōtinuum spinę tū arterię nexu, & per septum transuersum in ventriculū finit, carnis speciē referens. ab angustia et longitudine nuncupata est, tubę perquam similis, vel ad latitudinem, longitudinemq; vt tradit Plinius, lagenę modo fusa. in faucibus maxime dilatatur. pars quę vētrem attingit plurimū sensilis est neruorum natura, quibus vomitiones excitātur. Quę broncho cōpacta est, carnosior cernitur, ministrā ciborum vocāt, alij dispensatricem. Ob hanc Philoxenus eryxius colum sibi gruis a dijs precabatur. Sunt & alij Phyloxe ni qui gulam preter modum in vita excolūt summūq; bonum huic parti attribuunt, Apicij nepotis asseclę, qui dotes amplissimas, & patrimonia ingētia hoc gurgite profudere. Hinc censorię leges etiamnū apud Venetos solēnibus cōenis, siluestriū aialium carnib⁹ preter phenicopterum interdīcentes. Ea duplici membrana constat, varioq; vilorum ordine, altera stamine per latitudinem procedente cibum expellit, qui cum attra

hítur, cedit nec ledit, altera vero interior deorsum trahít vilorum oblongo stamine cibum. ea vis cathelctice dicitur, faucium peculiaris, qua in epulâdo crassam congestâq; materiam per faucium angusta farcimus. ea si in acutis morbis deficit, mortem minatur. In angina quandoq; ita afficitur, vt neq; cibus neq; potus trahi possit, cibumq; quandoq; dūtaxat demittunt, aut potum. In deuorando enim guttur cuius pars gurgulio est sursum versus gulâ trahit. Gutturum quibusdam Italię locis adeo foede intumescunt aquarū vitio, vt p monstris habeantur, aduenę nāq; breuī id vitium contrahunt. Bronchocœlen gręci vocāt. Dissectores in collo cutem diuellāt, vt musculi qui lōgiores sunt appareant. Ijs venę grandiusculę hærent, quarum vis cōsideranda est, deinde cōfractō mento maxillę eluxãde sūt vt quę in ore & faucibus cōtinentur, clarius cernātur.

¶ De epiglottide & arteria CAP. VIII.



Vturi epiglottis sub ipsis faucib⁹ quoddam operculum lingue postremę annexum accommodauit, ne quid cibi potusve in alienum delabatur iter, quoniam spirandi meatus intercluduntur, sicut Anacreonti poetę accidit, qui vuę pas se acino necatus est. Sicut & Fabius prætor in lacte pialo hausto strangulatus, etsi etate nostra Venetijs dum hæc conderemus anno a sal. vniuersali Mccccxxxiiij Lucretiæ perquam familiari nostræ simile contigerit. Ea cum nucem pōticam dente frangeret, oborto risu, nux in spiritus meatū protinus respirando deuoluta est, moribūda statim cōcidit, in eo ancipiti strāgulatu ad interiores pulmōis ptes impacta est, tū min⁹ affligi cœpit, vnde nichilomin⁹ spūs grauior, sonātiōq; ob-

Anatomices

scisso meatu audiebatur, tū vitæ spē habere cœperūt, quoniā confractis quibusdā venulis, vomica in pectore exorta est, quę tandē perſanata, obſeſſis meatibus reciprocantis animę raucus ſonus etiāmnū percipitur. Miro igitur opere id operculū conſtitutū eſt, quod linguam minorē Galenus vocat, eam ob cauſam duabus appoſita eſt fiſtulis, vt per vices aperiat, atq; integat. Chartilaginea eſt, imę linguę adeo annexa, vt diſcerni vllō pacto nequeat. Bronchus in gutturis ſup̄ma parte ſitus eſt, pelliculare membrū, muſculoſum, neruoſum, chartilagiноſumq; vt argutius ſit, in quod p̄cuſus ſpiritus, ſonus, aut vox ipſa p̄fectius elidatur.

¶ De tonſillis & vua.

CAP. XIX.



Alato extremo, atq; intimo extantes vtrinq; carnes ſunt (quas noſtri tōſillas & mala, gręci antiadas & pariſthmia dicunt, in ſue glandulas vocamus) eiufdē fere cū cæteris adenis naturæ: cum intumeſcūt eodē nomīne appellat̄ morbus. Quibus vomica viſ ſaliuę p̄petua eſt, qua cibus cōmodius conficitur, & arteria madet. Gulę annexę ſunt tenuibus quibusdā mēbranulis, quibus ſubeſt os, quod vocatur hyoides ad ſimilitudinē. y. litterę, cui caput Brōchi adalligat̄. Inter has vua palato vltimo, quę ſoli animalium homini dependet, columella ab alijs dicitur, quę ſi inflāmatur, aut tumet, vuę nomīne appellatur. materię fungoſę eſt, diſtillationibus capitis oppoſita, voci neceſſaria, quę ſi p̄cēditur, voci ſplendorem auferet, ob id aduri ſolet, nam p̄cēſa difficulter ſanatur, vnde oris graueolētia innāſcitur, ac demum tabes ſubit, quoniā (vt tradit Alexander aphrodiſieus) ea p̄s ſpiritus primum temperat, ne ſtatim ad pulmones crudus deſcendat.

¶ De Palato

CAP. XX.

p Alatum tū cibo tum voci necessarium est, celum dictū, in quo saporū intellectus est, sicut & in lingua. Recteq; cū cibus dentibus conficitur sub eo cauo circūuoluitur, crenis frequentibus concoctionē quandā preparātibus. Piscibus adeo carnosum est, vt lingua a plerisq; existimetur. Sensum saporum prestat neruus a cerebro descendens.

¶ De lingua

CAP. XXI

Lingua mentis ac voluntatis nūtia, ob id Platonem, quā neruū verius dixerimus, a lingua ad cordis sedem tendere asseuerat, ea vocis articulatę moderatrix est, cū epiglottis simplicis soni instrumentum sit. Lingua de saporibus diiudicat ob neruos sensificos ex sexta syzygia a cerebro descendente. etenim mouēdi vis a cerebello posteriori prouenit. Est enim gustus quasi tactus quidā. Fissura eā distinguī nō satis perspicuum est, sed ex offensiōe intelligit, propterea partem alterutram apoplexię morbo periclitari, & in vuluę quoq; malis nigrescentē, altera parte illeſa cōtinuis diebus vidimus. Dissecta in longū, plures intus arterię venęq; visuntur. Ea mediocris quę nec nimīū lata nec nimīū angusta, optima atq; explanatissima habetur, quę constricta vocatur balbos, blesos, antipos efficit. Natura rara est, fungosa, atq; soluta, ossi quod hyoides dixim⁹ vocari adheret, cui quasi adminiculo sustētatur, motus enim super re imobilī fieri semper solet. sub ea frenū est, cui silētium & loquacitas attributa est, vnde effrenis in conuitiū transit.

¶ De dentibus

CAP. XXII.

Anatomices



Varij in ore dētes sunt, aduersi primū, qui lati acutiq; sunt vt cibos secent, intimi duplices qui conficiant, maxillares dicti. qui vero discrimināt, canini appellantur, partim acuti partim lati, nam mediū vtriusq; extremi particeps est. nouissimi genuini vocant, qui circiter. xx. annū nascuntur. multis & octogesimo, quod etate nostra contigit, geniti & in palato quibusdā cernuntur. Antonii Boldi equitis filius dentes anteriores cū maxillę rheumatismo in pueritia forte amisit quę breui restituit natura. Maribus plures q̃ foeminis sunt, ex ijs quaterni primores dicuntur, a gręcis temnici, & gelasini vocantur, qui deinde quatuor caninis ex omni pte cinguntur, vltra quos vtrinq; tam superiores q̃ inferiores quaterni maxillares positi sunt, præter hos vltimi sunt quos sero gigni diximus, ob id sophronisteras & crāteras vocant. priores sicut et qui canini nominantur singulas radices fundunt, maxillares aliqui binis, ternis, quaternisve nituntur radicibus, fereq; longior radice breuiorem edit dentē. Rectis dentibus recta radix, curuis flexa est. Omnes dentes ossium naturā emulantur, qui tamē acuta p̃tuita excuant. soli sensum habent, nam frigore leduntur, & acrimonia stupefiunt. Primores ad vocis regimen cōstituti. Hos dētes cū excidissent, Mesrula alexādrinus noster. q. p̃ceptor aureo filo ad pronūciationem obligabat. Quibus pauciores & rariores dētes (teste Aristotele) magna ex parte breuioris sunt vitæ.

De labris & gingiuis.

CAP. XXIII.



Abra oris pars extrema est, ad potū, cibū, litteras exprimendas, pro tutelaq; dentiū necessaria, ea enim et voces explanant, nā pro-

ducuntur, contrahuntur, & dilatantur vario musculorum intextu. ob id ad motum omnem promouetur forinsecus euidenti cute, intrinsecus cuticula rutila integuntur, quæ roseo colore intra os circumdat. Ea morientibus præterquam in epaticis ex purpureo colore statim in pallorē discolorantur, rubore euanescente. ea cum gula copulantur neruis quibusdam, de quibus mox dicturi sumus. Quapropter vomituris labia tremunt, inferiora præsertim. his oscitamus, & si nimium, in vitium transit, quod oscedo dicitur. ubi vero dentes infixi sunt, multifida, rutila gingiua vocatur. Hactenus de oris partibus diximus, quæ spiritalibus & naturalibus membris accommodata sunt. Hinc ad cerebrum corporis principale membrum transeamus, quod dissectionis ratione inter postrema habitum est.

¶ In librum quartum anatomices.

¶ Alexandri Benedicti physici de membro animali quod capite continetur.

¶ De capite

CAP. I.



Aput osse vndique parum firmo, carne, neruoque contextum (ut inquit Plato) imbecillius cernitur in homine, quoniam ceteris brutis ad sentiendum acutius prudentiusque constitutum est, sed extreme capitis parti neruos adiunxit ad ceruicis robur, deinde per omnia membra et articulos reliquos, contextuit neruos vel chordas aut quas connexiones vocant. Itaque nunc do osse relinquendum non erat propter caloris frigorisque excessum, neque rursus carnis pondere pregrauatum, ne obtu-

Anatomices

sum sensu efficeretur, sed cute desiccata circa os firmum et leue reddidit. Alioquí quibus pingue, neruosumq̃, accarnosum caput est, validioris ac diuturnioris (vt inquit) vitę sunt. Ceterũ natura de humano genere cõsul tante vtrum diuturnius & deterius, an breuioris quidẽ vitę sed melioris efficeret. visum fuit vitam breuem meliorẽq̃, diuturna & deteriori esse omnino anteponẽdã. Hanc vndiq̃ cutem calor naturalis pupugit & vias aperuit, vnde viscosum humorẽ extra productum & in longũ paulatim extẽsum punctiõibus equalem reddens in tenuitatẽ capillamẽti explicauit, ac sub cute reuolutus humor radices egit. His igitur causis capilli in cute nati sunt, qui propter coagulationem a frigido statim factam duriores cute atq̃ densiores sunt. Tegmen vero ipsum ad cerebri tutelã compositum est, caluariaq̃ ipsa veluti sphaera ossea quasi torno facta cerebrum circunsepsit, & eius virtutes cælesti sphaeræ diuinas orbiũ animas tegenti simillimas. Hic vicaria medulla teres per ceruicis cardines rotulas vertebraşq̃ ad imam spinã descendens, seminis (vt inquit idem author) humani adiutrix, adeo necessaria, vt lapideo & articulari ambitu circũuallata cõsisteret, ad motũ inclinamẽtũq̃ idonea. Ad hãc mētis arcem contẽpladã Hermolaus Barbar⁹ noster q̃ primas tene tur inter latinos, ac Antonius Cornelius prim⁹ apud nos philosophus accessere, qm̃ mētẽ ipsam animosius semp excolũt cęlicolis similes, ac sine hui⁹ vitę sordib⁹ animo candidiores.

De intellectu hominis diuino CAP. II.



Ollum caput sustinet, in quo cerebrum viscerum excellentissimũ cõtinetur cęlo proximũ. Hinc euidentius intellectus culmen altissimũ

habet, & humana ratio, quā effector mūdi, molitorq;
deus per filiū maxime sibi proximam fecit. Hīnc ima-
gines, cogitationesq; proficiſcūtur, quæ etiamnū diuī-
ni consilij participes fieri solent, qđ sanctis hominibus
(et si raro) cōceditur. vnde prę diuīnatiōe certa, morta-
les futura quādoq; pręsagiūt. Et in somno visiōes fu-
tutorum pręnūcię, euidentissimę apparēt, quibus im-
mortalem animā esse non dubitamus, quę nichil cum
corporali actiōe mīstum habere dijudicatur. Eę visi-
ones insomniorū naturam non habent, quę vino ac ci-
bo distentis superueniunt, occursantibus quibusdā fal-
sis imaginibus. Cerebrū, quod sine sensu est, sensificæ
tamē potētīę instrumentū traditur. In eo somnus con-
sistit, qui mortis imaginē refert, plectis sine sensu mē-
bris. Qui somnulentī sunt & qui noctes non circumscri-
bunt torpori vacantes, vitę dulcedine min⁹ abūdant.
Somni causa est, quoniā frigidū & humectum est, &
vapores in eo congesti statim defluentes, meatus sensi-
bilium virtutum obstruentes, sine sensu mēbra iacent,
et exinde si modum non excedit, vires assumunt. om-
nium frigidissimū est pro cordis temperamento. solet
enim natura semper moliri cōtra cuiusuis exuperatiā
auxilium per coniūctionē rei aduersę, vt excessum al-
terum altero cōpescat. In vniuerso enim corpore frigi-
ditas ad temperandū naturalē calorem a natura data
est, quod tactu percipitur & ratiōe intelligitur. sangui-
nis enim nichil habet. sed vt ea quoq; pars modico po-
tiatur calore, venę ad mēbranā mēbri inuolucrū deue-
niūt, ex vtraq; vena maiori & ahorta. Et ne calor mi-
nus offendat, non paucę amplę, sed frequentes ac te-
nues venę per anfractus ambiūt, ne sanguis copiosus
et crassus, sed tenuis sincerusq; subeat eodē. Cerebrū

Anatomices

terree & aquee naturæ esse constat, quod cum coquatur indurescat sicrescatq; vt humor calore cōsumpto, terrena portio relinquatur. ob id medulla non est, sed sui generis membrum. Si humet vel arefcit supra modum, afficitur, vel soluitur mēs, vel cōmouetur. si aquilone frigidius redditum est, post austri flatus, distillationes fluunt. Vapor enim sublimis cerebrum petit, qui ob membri frigiditatem refrigeratus in humorē conuertitur, quod cælo himbribus euenire solet, vaporibus in superiore aeris parte collectis, si magnum cum paruo cōferre licet. cum enim ex terra vel aqua vapor ex calore ad supremum aerem fertur, qui frigidus est, consiluit, denuo in aquam propter refrigerationē conuertitur, ac demum in terram defluit.

¶ Quæ cerebro contineantur CAP. III.

CX cerebro neruorum sēsus quasi interpretes nuncijsq; rerum sensibiliū perspiciuntur, magna q; ideo ex parte in capite tanq̃ in arce collocantur. Ideo caput quo sensus initium capitatur, video appellari, quod homini proportionē maximum est. Cōstat præter capillorū tegmen, cute, membrana, caluaria, duplici item panniculo, cerebro, ventriculis, reticulo quodā venarum ac arteriarū intercurrentium mirabili, & ceteris venarum anfractibus, neruis, & alijs dissimilaribus partibus, oculis veluti, auribus hisq; similibus, vt suis enarrabimus locis.

¶ De capillo CAP. IIII,

Capillus homini plurimus est, regionū differentia durior aut mollior. aduersus vim frigoris datus est. Ex humore excrementicio, ac fumo meo vapore ex vniuerso corpore fertur ad cutem. pili materia efficitur. pro cutis qualitate modo duri, mo-

do molles sunt, modo albi, modo nigri p cutis colore, vt in vitiligine. canescunt opti potius quā vento difflassi. in tēporibus incipiūt. pubes nouissime canescit. Capillus, supcilia, palpebreq, cōgenitę sunt. Post geniti sunt pubis primū, mox alarum, postremo barba. Defluunt capilli, sed nūq in occipiti. Supcilia defluūt, cui vitio nomen nō inuenere. Mulieres nō tentantur caluitio, neq pueri, neq spadones. Pili post pubertatem enati, excisis soli decidunt, pręterquā pubis. Dictum cutusdam graci rustici occurrit. Is quendam philosophię sectatorem ex improviso non sine risu interrogauit, quibus barba constaret? ille attonitus nichil respondit. At rusticus cauillatione quadam, ego (inquit) qui ruri maneo apte & cōmode dicam, quoniam testibus continetur, atq ita mentum græca maiestate barba cōhonestari. Omnes pręter palpebras excrescunt velociusq canescunt. Quibusdam barba rarior est, sed mixta nūquā nudus est. Tabefactis pili crescunt, capilli defluunt. Defunctis quādoq augescunt, quod & vnguibus euenit. Lassiss venere congeniti pili maturi defluunt, post geniti velocius prodeūt. Quibus varices sunt, min⁹ caluescūt. Cęci natiuitate nō caluescūt quoniam (inquit Alexander aphrodisieus) caliditas in locū transfertur proximum.

De cute capitis

CAP. V.

Vtis oīs sensu caret psertim quę caput itegit, quoniam ibi nulla interposita carne ossi adhereat. crassior item natura est, ideo maiore radice nitunt capilli. Sub hac cute lentior quidam magis mucosus est, qalibi. quibusdā cutis ea mobilis est, a frōte ad occipitium, & ediuerso, neruis quibusdam summū caluarię penetrātibus ad cutem.



De exteriori mēbrana caluarię

CAP. VI.

Sub cute mēbrana est, quę caluariam extrinsecus velat, cui altera ex interioribus per suturas capitis annectitur, ne illa adherendo cerebrum opprimat. Pro tegmine igitur a natura constituta est, ut alio etiam velamento caluaria seruetur illesa. magnam enim cum interiore mēbrana germanitatem gerit.

De caluaria.

CAP. VII.



Vtis itaque per lineas transversas ab occipitio per verticem usque ad frontem imā diuellitur cum mēbrana, tū caluaria apparet, testa ab antiquis dicta, quę ex interiori parte cōcava est, extrinsecus globosa, quę Sphæroides a grecis cognominatur, partes vero hemisphæria, utrinque lenis atque plana in temporibus, duplex in fronte, ideo firmissima, ossa ab exterioribus partibus dura, ab interioribus molliora sunt, inter quę venę discurrent, foraminulentam partem sine medulla constituentes, quibus ossa aliter credibile est. Suture in ea sunt quarum numerus incertus est, sicut nec locus quidem Hippocrate auctore. Patavius vidimus in anatomices spectaculo caluariam solidam sine compagibus. ea capita canina dicuntur ob similitudinem, quę firmissima & a dolore tutissima esse traduntur, iuncturasque pauciores capitis validitatem prestare tradit Celsus, ossa fracta solidantur a quibusdam, ab alijs eximuntur inuicemque eorum corporea duraque cicatrix succedit, infantibus sinciput serius admodum induratur.

De suturis caluarię

CAP. VIII



Suture ternę in summū verticem ascendunt, coeuntque in figurę triangulę speciem, constat senis ossibus caput, nonnullis octonis, quorū bina sunt maxillę superioris & inferioris. hæc

mobilis est, superior media oculorum foramina & nasum diuidit, cerebrumque suo interno processu sustinet dentium ordinem. superior, futura una claudit. malarum quoque ossa quae a genis teguntur, in maxilla superiori utrinque continentur, futurisque ad aurium ossa bina minima finiuntur. quae leuiter diuisa sunt, una futura continentur, a priori tamen parte frontis ossi subeunti potius leuiter insidere quam per compagem coniungi videantur. Post aures crassissima sunt, & maximos ictus sustinent. processus deorsum versus emittunt. in temporibus vero tenuissima sunt, ob id & periculosa. Frontis os supra aures finitur, mediosque oculos diuidit futura tenuis, ossi maxillae superioris conterminum, ab auribus sursum versus ad verticem serratis compagibus (Stephanitides enim dictae sunt) feruntur mira ossis duricia ut ignis veluti e silice elidí possit. In supercilijs ac supra nasum ubi parum supereminet, duplex est, quibusdam simplex. Os praeterea occipitij quod sextum hactenus annumeratur futuris ad. λ . litterae figuram, claudit, unde labdoides dicitur, posterius cerebellum operiens, futura sursum versus ad verticem transmissa. Haec pars infirma quoque habet. reliqua bina ossa quae octauum numerum complent supra aures sunt, & capitis latera dicuntur, fronte ac occipitio minus inflexa. compagibus ad verticem quoque coniunguntur ad occipitium et frontem. Caluaria ipsa quatuor dumtaxat ossibus constat, fronte et occipitio, quod epicranis a Polluce vocatur, duobusque supra aures lateribus. Horum futurae euidentissime sunt, reliquae fallaces dicuntur. cerebri fundamentum siue basin, eorum quae descripsimus partem esse demonstrauimus. Sic futurarum & ossium locus et numerus se habet. Hinc quare medicorum usus sinciput soleat vel adurere vel abradere, cum opus est, indicandum. Manum imam summo naso ubi intercilium est

f. i.

Anatomices

fursum versus admouent & ad bregma extendūt, hoc est sinciput, summū tamē digiti mediij notant, acia ab vtraq; pte diducta, quod interiacet obseruāt. suā nāq; mensurā sibi quisq; facit. & ita cōpitū triū suturarum hoc modo inueniri putāt, cōiecturā interdum fallaci, vnde sese deceptum aliquando Hippocrates palam professus est.

De membranis interioribus. CAP. IX.

His partim p̄spectis, partim sola enarratiōe cognitis, indicandū nunc est quo modo ex ictu capitis aut lapsu, caluarię frustū eximēdum sit, chirurgis p̄sentibus, quia & ipsi huic nostro theatro interesse debēt, vt cruor, aut pus, si subest, inde educatur. Alioquī apostemata, febris, neruorūq; distentiones (spasmi enim dicūtur) ac deliriū deniq; superueniunt, aut enim os abradunt nō exiguo labore, aut orbiculari serra. His modis demonstratis caluariā tota a superciliis ad aures in occipitium vsq;, serra dissecant, qua emota, cerebri q̄titas pene, mēbrorum p̄portione incredibilis, viris p̄sertim, spectāda est, duabus tuni- culis velantibus, quarū alterutram rumpi mortiferum est. Superior validior est, suturis caluarię adnexa, custos cerebri appellata. Altera ipsū cerebrū vestit, q̄ tenuissima, atq; infirmior, ilamidē Pollux vocat. Hęc venas p̄tenuēs anfractu quodā coeuntes, vndiq; supra conspersas cerebro cōtinet, quæ membri materiā non tranligunt, sed supra feruntur, ob id sanguine caret, cerebri nāq; frigiditas peculiari suo munere spiritū a corde venientem temperat pro sensifica virtute cōstituen- da. Omenta ipsa pro tegmine data, carne vacāt vt vapores nec habeāt nec cōtrahāt, et caluarię crassior annectūt vt nichil pōderis afferat. Eę antierius cerebrū in

duas partes diducunt, dextrā & sinistrā, vnde hetero-
crania nomen habet, & antèrius idem a posteriori ce-
rebello distèrminant, sic enī vocatur, minus est ac du-
rius. Inter has cerebri partes quidā imperitus chirur-
gus quum lapsum ex alto curaret, specillum ad imam
vsq; partem imposuit, vt ignari solent vana perquiren-
tes, cerebrum perforatum putauit, cognito a physico
errore, specillum inter geminatas vtrasq; membranas
imposuisse cognouit.

De cauis cerebri

CAP. X.

SVnt & in cerebro terni specus, prioris gemi-
ni sunt, tenuissima intus circundante mēbra-
na, postremi vero cauum per se sine mēbra-
na consistit, sed sua dūtaxat duricia conserua-
tur. illi gemini cōstituti sunt sicut et pleraq; membra,
renes, pulmones, aures, oculi, vt si quid alteri parti oc-
currat, reliqua illesa suo fungatur munere. In cerebro
enim vitalis spīrit⁹, qui a corde sursum versus arteriis
diffunditur, tēperatur, atq; sensificā inde virtutē (quā
animalem vocant) recipit, quę ex ijs cauernis spīritus
ipsos, qui & spīramēta vocātur, sensibus, neruis, mus-
culisq; motus ac varias potētias per membra diffusas
ministrāt, quę si vertigine spōtanea aut p vim circū-
agendo corpus equo vel nauicula vel morbo, vt in ver-
tiginosis, turbata sunt, humores & spīritus simul exa-
gitēt, vnde functionibus suis destitutis, auditus, visus
motusq; membrorū cum vniuerso corpore in ruinam
plabatur. Cerebri materia paulatim secanda est, quo-
ad internæ appareant cauernę, quę viuētib; ampli-
ores sunt, i dextra scilicet & sinistra parte, vtraq; enim
eiusdem rōnis est. Ambigūt tamen philosophātes an
geminas imagines siue species (Cicero spectra vocat)

f. ij.

Anatomices

referat vterq; sinus, cū loco differant neq; in aliquo ter-
tio conueniant, vt oculis cōtingit. qui etli gemini sint,
vnicam tamē representant formā. In his enim sensuū
nobilissimorū vires habentur, ex his cogitationis, ex-
timationisq;, atq; intellectus potentia adipiscit̃. In his
qui cōmunis sensus dicitur, subiectorū sensibilibus cō-
cipit rerum species, imagines varię ac diuersę hic for-
mantur, itaq; huc visus, auditus, olfactus, & ceteri sen-
sus tendūt per tramites neruorum aut pāniculorum,
et imagines ipsę suapte natura vel inuoluntario occur-
runt, nec humani semper sunt arbitrij. Imaginatricem
hanc vim siue phantasiā vocamus, quā quidam ex
posterioribus diuersas virtutes falso esse arbitrati sūt.
Hanc partem Nicolaus leonicenus ac Laurētius lau-
rentianus nō redarguent, sensus nāq; cōmunis de ex-
terioribus iudicium affert. De locis autem harum vir-
tutum nemo pręter posteriores philosophos mētionē
facere ausus est. Quoniā huiusmodi cauernę partesq;
cerebri si affectę sunt, ratio mensq; ipsa confundi vide-
tur, vana nāq; vident, audiunt, cogitant et imaginan-
tur, perperāq; diiudicant. Hinc vertiginosi, lymphati-
ci, phrenetici, delirantes, vel attoniti fiunt, alij comitia
liter cōcidunt, alij repente obmutescunt.

De cerebelli sinu.

CAP. XI.



In posteriori cerebro euidentiori sensus instru-
mento, cauerna est amplior, ī qua vis illa me-
morię sita est ac viget. Hic alij reminiscen-
tię locum faciunt, illa continuata est imagi-
num conseruatio. hęc quandoq; intercipitur, ijs duab;
virtutibus imagines siue phāasmata ancillātur. Alij
tramiti medio eam (vt dicemus) vim reminiscentię at-
tribuūt. Cerebelli sinus in sūmo latus est mucrone ad

spinam vergēte, figurę obelisci inuersi. hac parte leſa lethargic⁹ morb⁹ affligit. Vnde nōnulli literas obliti sūt et parentum nomina, alter ex bile porracea, malisq; inde vaporibus præsentiū librorum nomina non tenebat, subito malo, qua protin⁹ reddita, memoria pariter restituta est. Ex eo spinę medulla oritur, tanq̃ neruorum plurimorū manifesta origo, diuersę ab ipso cerebro nature, nam pinguis est, in coquendoq; mollior redditur. illud basis dicit̃ cerebri, a græcis paracephalis vocatur vel epicranis colore magis flauo.

¶ De tramite medio inter utrūq; sinū CAP. XII.



Inter ventres anteriores posteriorēq; via est utrisq; annexa, qua imagines (vt dicunt) utriusq; vltro citroq; deferūtur. Hic quas assertiones & consilia vocamus fieri tradūtur, hic in-

telleſta recognoscūtur, renūciat enim imagines omnes memorię, atq; inde reportat reminiscentię vires. vis eius voluntaria est, fitq; pro hominis arbitrio. Hac virtute opinamur, reminiscimur, & assentimur, discernimusq; ipsa comitāte ratione, ea virtute cōponimus reſoluimusq;, quę in animo sunt oratiōes. Ob id, ea via cordi veluti omnīū principio supra constituta est. lumbrico enim terrestri est perq̃ similis. nā & colore rubida est, vt vermīs arcuatim contrahitur prolongaturq; cum opus est. Sed quis hominū quæſo hæc indagauit? quis solertis ingenij hæc consecutus est? verum sit an falsum vita decreuerit.

¶ De ceteris cerebri partibus CAP. XIII.



Dariusq; ea abiicias, non minori cura tria vidēda sunt, quę a medicis indagatiōe pertractata sunt. Inter priores ventres & medium tramitem quędā extantes partes sunt, fulcimen-

Anatomices

ta dicta, ex eadē cerebri materia cōstituta. Inter itē ventriculos, veluti terrestres lumbrici interiacent, neruulis vtrinque adalligati. qui cū in longum porriguntur, meat⁹ a primo vētriculo ad tramitē mediū trāseūtes claudūt. si vero cōtrahuntur, iidem ductus aperiri credunt. & ita spūm quo imagies vehuntur citro vltroque discurret. Sub his vero quedā cōchularis concavitas apparet, in cui⁹ medio forāmētum est, quod deorsum versus ad viam palatī extremi excretoriā descendit, vnde pituitę fluctiones a medio cerebro profluunt, & sternutamenta prorūpunt. Eadem lacuna, vndique rotundos processus habet, quibus venę ac arterię sustinent, quę ab arteriarum reticulo mirabili ad antedictos ventriculos deferuntur. Secundū eundem reticulum glādulę quedam prominent superflui capaces.

¶ De septem neruorum syzygijs secundum veteres medicos. CAP. XIII.



Erebrum demū omne sensim cum membranis duabus subiectis emouēdum est, ne nervi qui inde oriuntur loco suo auferant. Septē enim neruorū syzygię a cerebro oriūtur. Neruorū syzygiā vocamus, cū binī nervi pariter emergunt, qui sensificum spiramentū ad certa membrorum loca trāsmittunt, vt sensum vicinis, & longe positis mēbris spiritali semita infundant. Prima enim coniugatio oculos petit, quas & venas quidam vocant, ex quo colorū agnitio, & luminis & tenebrarum discriminē habet. Secūda in aures se diffundit contra Aristotelis sententiam, per quam innascitur sonorum noticiā. Tertia naribus inseritur, vim olfactoricam ministrās. Quarta palatum tenet. Quinta ad linguā & ad faciē. Sexta stomachum petit, cui maxie sensus est necessarius vt appetat & su-

pflua respuat. Septima vero neruorū syzygia infūdīt sensum spīnali medullē, quę cōpacta est, et ad imā spīnam descendit. sed de his cōiugationibus veriora subiungemus. Priores medici syzygiarum originē magis q̄ finē obseruauere, at posteriores cōcīsim rē cōsiderauerē. Primā ad oculos ab ima parte prioris ventriculī cerebri pertingere. opticos enim vocāt, qui tamē prius propter tenuiorem cerebri membranā transuersi copulant̄, vbi species a binis oculis recepta, vna et simplex rēp̄sentatur. at distentis p̄ter consuetudinē oculis, et dīmotis superioribus neruis, vt trāsuerſi coeant, res vna duplex apparet. Ab his aliud par est, qui graciles sūt, durioris materię. mouēdī vim afferunt. At Aristoteles aliū numerū assignat cui⁹ sentētia nūc reddēda est.

¶ De neruis oculorū scđm Aristotelem CAP. XV.



Aristoteles ita de neruis oculorū refert.

Ternos iquit neruos ab oculis ad cerebrū pertinentes natura constituit, ita vt maximī et mediocres ad cerebellū tendant, minimī ipsum cerebrū adeant. hi p̄p̄iores naribus oriūtur, maximī equidistant nec vsq̄ coire possunt. mediocres coeunt, quod p̄cipue in genere pisciū apparet. & cerebro sunt ij propiores q̄ magnī. minimī perquam laxo inter se distant interuallo. & nunq̄ ob eam rem possunt coire. Hac Aristoteles. Oculorum membrana cum ijs qui ad stomachum feruntur nexum habēt, quoniā nulli sine stomachi redūdatione eruit̄ oculus.

¶ Secunda neruorū coniugatio CAP. XVI



¶ Secunda coniugatio ad aures terminat, qđ Aristoteles constanter negat. Ex ea sensorium auditus constituitur, de quo suo dicemus loco. Si qua in his cōiugatio apparebit,

f. iij.

Anatomices

a toto diiudicabitur theatro, quoniā ea nusq̃ apparet.

¶ Tertia neruorum syzygia. CAP. XVII.



Hec ad tubercula papillaria nariū pertinet. id molle est sensoriū ex cerebri proxima materia quę tenui omento integitur. odores enim sentiuntur, quoniam sensorium temperatum est. inde sternutamenta concitantur. Quibusdam ea vis adempta est sicut Fallerię contarenę nostrę ex patricia gente. Quibus nares porrectę sunt, hi olfactu valent, quomodo qui manum fronti admouent lōgius cernunt. Quibus grauiter olentia grata sunt, id ex tuberculorum discrasia contingit.

¶ Quarta syzygia CAP. XVIII.



Quarta palatum transigit, ibiq̃ oblitteratur et cessat. alij sextę cōiugationis neruos huc putant pertinere, quę & linguę, sensum gustandi tribuunt

¶ Quinta syzygia CAP. XIX.



Quinta ad linguam partim pertinet, facieiq̃ buccas mouet, partim septimę cōiugatiōi annectitur. vnde qui vltimam linguam tangūt, vomitiones concitant, nam ex eadem coniugatione nerui ad stomachum tendunt, qui & oculorū membranis copulantur,

¶ Sexta neruorum syzygia CAP. XX.



Sexta (vt denarrauim⁹) syzygia, simplex medulla est a cerebro posteriori descendens, de qua sequenti dicemus libro, vnde supra. xxx. neruorum coniugationes oriuntur. hanc septimam maluerim in ordine et postremam appellare, quoniam postremo loco exit.

¶ Septima syzygia CAP. XXI.

Iouissima neruorū coniugatio quā sextā alij volūt, a posteriore pte cerebri ad stomachū, p̄cordia, epiglottidem, ad vtranq; gutturis partem diffundit. Ex hac nerui constituunt qui conuersiui vocantur & vocales, qui rursus sursum feruntur ad epiglottidē. ab aliquibus toni vocant, ad vocē necessarij, cordis (hoc est volūtatis) p̄nūtij. Reliquum ex hac coniugatione cū gula, maiori ex parte anectitur, dispergiturq; ad imū vētriculū, ibiq; cessat. ceterum cū cordis iuolucro copulatur, neruusq; qui in sinisteriore parte sitū habet, omnibus fere mēbris, quę supra septū locant, cōmittitur. Ex eodē enim caluarie foramento (vt res cognitu facilius sit) tres separati discurrunt nerui, quorū primus ad musculos ceruicis fert et ad lingū postremū, alter vero qui maior est ad scapularum musculos, & ad propinquiora, ibiq; cessat. Postrem⁹ ad spiritalia (vt diximus) viscera certo tramite iuxta venas, quas sphragitides vocam⁹, ibiq; cōmittitur. E regione sūmī gutturis idē ramus quandā nerui Tobolem spargit, quę mouēdi vim gutturi eiusq; ptib⁹ tribuit. reliqua pars eiusdē ad p̄cordia, retroq; fertur, vnde cōuersiuos neruos vocam⁹, quib⁹ cōcisus homo statim obmutescit, & inflāmatis vox afficit. Hi nerui nō protin⁹ a cerebro ad vocis officiū a natura cōstituti sunt, p̄pterea quia cōueniens iter nō esset, vt qđ deorsum cōducere oportet, in superiore pte sit. Melius igit est, vt prius ad p̄cordia deferātur, rursusq; sursum p̄cedant. Quare maiore (Galeno teste) duriciē obtinent, robustioresq; fiunt quo magis a cerebro sui initio distāt, qua de causa quo breuiiores, eo molliores sunt nerui. Igitur duriores a cordis calore facti, voci cōmodiores reddūtur, alioqui cōtinenti sermone facile oppri-

Anatomices

merentur. cerebro cordiq; non imerito copulantur, vt ab illo in quo sensifica vis est, atq; cogitatio, & ab hoc in quo mens ipsa, atq; animus inhabitet, voluntatiq;, et animi cōceptibus sine internūtio parere possint.

¶ De syzygijs alia obseruatio CAP. XXII.

SYzygias alij alio modo obseruauere, vt cur sim referam⁹, binas ad oculos deferri, vnam ad narium tubercula, ad palatum aliam, quę vtrinq; iuxta dentes finitur, quę aliquib⁹ animalibus duplex, quibus maxillę longiores sunt, aliam ad buccas & labia quę ad oculos subterlabitur, exitq; sub medijs oculis, vna ad linguā. Aurib⁹ nichil respōdet a cerebri materia sed a mēbrana tantum. Alia est quę per spinā interfluit. Alia item quę maxillę inferiori motum prestat. Alia iuxta ceruicis originē ad colli robur. Preter hos neruos quidā ad supmā caluariā feruntur, quib⁹ cutis capitis, sed paucis, mouet, alijs ad aures vt mobiles fiant, quibusdā ad ambo supercilia, aliquibus ad alterū dūtaxat, sed hi perpetui non sunt. sic enim coniugationes q̄tum ad ortum earum coniugatim pcedūt. attamē ad mēbra multifariā deferūtur ad stomachū, linguā, p̄cordia, epiglottidē, retrocedētes

¶ De reticulo admirabili CAP. XXIII.

Cerebro subest vtraq; mēbrana, q̄ circūambit. deinde os caluarię subiacet, qđ fūgosū est, vt leuius sit. in medio cui⁹ excretoriū foramentum est. hac venę arterięq; ad cerebrū p̄tinent, q̄ iuxta aures ferūtur, atq; in p̄tenuēs ramos spargunt et mēbranā cerebri custodē subeūt, cācellatim in cōtextū reticuli modū fibris coeūtib⁹ perq̄ exilibus. In eo vitalis (vt dictū est) spūs effusus, a cerebri virtute in sensificū spūm cōmutari haud dubio credit a medicis nris. Alii

in cerebri cauis hunc fieri putant, ex venis, & arteriis quas sphagitides siue iugulares ac parotidas vocam⁹. feruntur, & ad membranam tenuiore sparguntur. qm cerebru oino exps sanguinis est, in qd nulla vena cessat.

¶ De capitis osse validissimo CAP. XXIII



Supereterea validissimu quod cerebri fulcime-
tum est, ad sensoriū olfactus pertinet. vbi su-
perciliorum sinus sunt siue foramina, quę du-
plici osse constāt. Ij ad nares deorsum versus
feruntur, superq; eos os frōtis finitur, ab ossibus supe-
rioris maxillę sustinetur. Imum os, neruorum cōiuga-
tiones penetrāt, & duplici valle infra tempora cauat,
iugo medio eminente, quod occipitis est processus, su-
pra foramen spinę medullę, vtrinq; os durissimu lapi-
deumq; iugale vocatum, hoc argumēto sicut a grācis
Zingoides, quod ab inferioribus ossibus sustinet. idem
in ossa nasi diuiditur bina & oculorum vbi supercilia
sunt. E regione superciliorum vbi nasus incipit, intus
e frontis osse, mucro osseus pminet, qui tubercula pa-
pillaria diuidit, & a mucrois latere, tenuissimu fora-
minulentumq; os adiacet, quo pituitæ humor ad na-
res distillat. At hoc in loco exemplum naturæ admi-
randę non præteribo. Quidam græcus Suirus nomi-
ne michi notissimus, in Chalcidis expugnatōe in tem-
pore sagitta vulnerat⁹, ductus inter captiuos a turcis,
presanato quoquo modo vulnere, annis. xx. vitā duxit
seruile. tandem liber Cidonē venit, postq; quintū an-
nū, dum aqua per estatē frigida os collueret, cōcitatis
supra modū sternutamētis, magno pruritu inter maxi-
mos conat⁹ prosilire narib⁹ sagittę frustū, digiti mediij
longitudie, ferrea acie, nec aliā vulneris notā reliquit.
dū id medicis venetis iter mira naturæ refero, aliqbus

Anatomices

non credentibus, alijs inter contentiones (vt fit) viā indagantibus, ecce ex improuiso Suirus græcus noster, qui forte tum Venetias venerat, rebus dubijs accitus, imo fide carentibus, sagitta demonstrata, quā miraculi gratia ferebat, testimoniū verissimū dedit, qui cum antea per annos. x. in urbem non venisset, pro discutieda veritate casu oblatus, non credentibus fidē attulit.

¶ De oculis

CAP. XXV.



Maximam oculorū vtilitatem humano generi donatam, deorū munere existimauit Cicerō ac Galenus, quorum causa caput cōstitutum sit. Hos palpebrę primum integūt, quæ vtrinque genis innascuntur, quæ & palpebræ dicuntur. Hæ mollissime sunt ne cōtactu aciē ledāt, ceu tegmētū, quod vallo pilorū quodā munitū est ad occurſatia. vtręq; aperiuñt, & in motu mira celeritate clauduñt. In somno aut remulencia sponte cōniuent, inuoluntarioq; claudūtur. Confricatis oculis sternutamēta cohibentur, vel alterutra gena si quid in oculum inciderit decidere. Sub oculis genę positę sūt leuiter pminētes, hypopię a Polluce dictę, q̄ sarmatis supramodum ad deformitatē naso minimo pdeunt, quo in ceteris quas si muro interiecto, oculi non inutiliter latent. nā excelsis vndiq; partibus sepiuntur. Aperienda demū sutura est, quę a tēporib⁹ discurrīt. Hoc maximū capitis foramētū est siue ingens sinus. cōchos a gręcis dicit, quo null⁹ maior est. deide nariū. oīum minimū auriū est.

¶ De causis colorum in oculis

CAP. XXVI.



In homine oculi plus minusve humoris habēt. Qui multū continēt, nigri sūt. quoniā humoris copia trāspici satis nō potest. Reliqui, varij sunt coloris pro humoris quantitate, vt in mari

quod facillime cognosci potest. nam ubi satis transpicitur, casium apparet. ubi minus, ceruleum. ubi præ gurgitis altitudine non præfinitur, ibi atrum nigrumque cernitur. qui autem inter eos sunt, eo iam differunt quod magis minusve ita constituti sunt ut eadem causa casij acute interdum cernere nequeant, nigri noctu. Illi enim præ sui humoris exiguitate mouentur magis a luce & rebus visibilibus, quia ita humidum perlucidumque sunt, quod motus eius partis visio est, qua lucida, non qua humida est. Nigri vero ab humoris copia minus mouentur. Lux enim nocturna exilis est, & simul quiuis humor per noctem moueri difficilius potest. Conuenit autem eum moueri, qua perlucidus est, neque magis moueri quam congruum sit. leuior enim motus expellit a vehementiore, quam obrem qui aut suum conspectum a colore validiore transtulerint, aut de sole in opacum se contulerint, non cernunt. Motio enim quæ iam vehemens inest, impedit eam quæ extrinsecus accidit. Visus denique siue validus siue inualidus nequit res splendidas cernere, quoniam eius humor ultra modum afficitur & mouetur. Aegritudines oculorum utrorumque indicium faciunt. Glaucoma enim nigris oculis potius accidit, lusciositas cæcis. Illud humoris copia, hæc siccitate innascitur. Visus ille denique optimus est, qui moderatum humorem continet.

¶ Qui oculi acute cernant CAP. XXVII.



Culorum medio pupilla est qua cernimus, cuius angustie non sinunt vagari incertam aciem, & veluti canali dirigunt, ob idque incidentia facile declinant. Et pupilla quo angustior fuerit, eo magis acute cernit, sicut qui ex foueis puteisque stellas interdum conspiciunt, quoniam motus in vastum non dissipatur, sed erecto tramite ei aculatur, sicut ocu-

li quos conditos nominamus. At hebetiores sunt qui
nimium prominent, emisitij nuncupati.



¶ Que vitia oculorum sint CAP. XXVIII.
Culi (vt ad vitia trāseamus) ex omnibus ani-
malibus soli homini diuerso colore videntur,
ceteris in suo cuiusque genere, propterque in equis, similes. si-
cut & vni deprauant, vnde Strabonū & petorū cognomi-
na, hec enim vitia nutricū indiligētia sepe contrahun-
tur. Mediocres oculi, optimi ab omnibus habent. Cras-
sis tenuibusque membranis constat oculus, callosę enim fir-
maque materie propter frigora, caloresque constituuntur.
In his humida saliuā perpetua est, quoniam lubrici, ac
mobiles propter occurrentia esse debent, & lachryma-
rum inde copia iugiter emanat, vel vi vel sponte, frigo-
re vel impetu. Circa pupillam nigrū variat, ob id iris
a quibusdam vocatur, que atrii coloris cernitur, vel ni-
gri, glauci, cerulei, cęlijque, nonnullis ruffi, fului, caprini,
qui optimos mores indicant, & clarius cernere existi-
mantur. Et modicus quoque situs optimorum morum
inditium est, sicut quibus mediocriter conuiuent, qui
vero rigidi sunt, impudentiam notant, qui nimium con-
uiuent, inconstantiam significant. At ex morbis, vt in
attonitis, rigent. In oculis animus ipse inhabitare cre-
ditur, ob id osculatur ita animū ipsum attingere existi-
mantes. Oculorum alij nisi e longinquo contuentur, alij
nisi prope admota cernunt, alij interdum hebetio-
res noctu preter ceteros cernunt, hi lusciosi siue Nicta-
lope dicuntur. Hoc vitio infestatur Hermolaus noster,
qui cum aliquid legendum haberemus interdiu eam
diei partē michi tradebat, ipse auscultabat, vespera ve-
ro in qua nichil penitus cernebā, accepto libro ille exacti-
us legebat, dicebatque ita, mi Alexander mala quandoque

Libert quartus.

in bonum cedere. Quidā noctu expergefacti paulisp
aliquid contuentur cati more, mox paulatim tenebris
se abducentibus nichil cernunt. Multis a fomno proti
nus aperti oculi ſcintillare videntur.

¶ De membranis oculorum.

CAP. XXIX.

SEptem membranis oculos veſtiri recentiores
exiſtimant, quum quatuor ſiue tres dumtaxat doceat antiquitas. illi eni haud dubie de
cipiuntur, exteriores atq; interiores ſemituni
cas, ſeu ſemiorbes diuerſæ naturę exiſtimantes, oculum
enim prius in priorem & poſteriorē partem ſecant, in
illa quaternas mēbranas explicant, in hæternas tan
tum quę prioribus copulantur.

¶ De cornea oculi.

CAP. XXX.

Rima oculi mēbrana cornea vocat, quaſi cor
nu trāſlucido ſimilis. puia eſt, plucida, dura,
neruoſa, craſſa, quę nec i pfundū agit, vt quid
dam arbitrant. ppter ea ceteris interiorib⁹ tu
nicis tantum applicat. limpida eſt ac nullius ferme co
loris vt rerū viſibiliū ſpecies ſiue imagines recipiat.

¶ De funda oculi.

CAP. XXXI.

B hac ſequitur q̄ & ipſa calloſa eſt, extrinsec⁹
cādida fundę figurę, vñ nomē, ſanguineis ve
nis iterdū ſuffuſa vel felle, regij morbi primū
indiciū, angulis carnoſis committitur, al
bugo dicitur, & candidum oculi, ab aliquibus rhagoi
des, rhogoides, æmathoides, charoides, appella
tur. nam & ſub ea humor eſt aquæ perq̄ ſimilis. Hu
ic prima ex interioribus connectitur, medium in in
tima parte oculū velans ſimilis cum ſuperiore naturę,
ſcleroticam quidam nominant. Exteriorū tertia, quæ
corneæ ſubiacet, phacoides, ſiue lenticularis dicitur.

Anatomices

Hanc in medio fenestruit pupilla, ad quā imagines pertinent. In ea colorū numerosa diuersitas atq; differentia notatur, orbe ita vario per corneā transpecto.

¶ Secūda & tertia oculorū tunica CAP. XXXII.

In tunicę alia ex opposito, iteriori cōmittit, quam secundam vocāt, ab alijs vero eodem quo superior nomine thogoides appellatur.

Alia item membranula q̄tenuissima, quæ quarta inter priores annumeratur, quę arachnoïdes, siue amphiblestroïdes vocāt, quę cū posteriore naturę eiusdem habetur cui coniungitur, eam reticularem tantum vocari putant.

¶ Alter nūerus mēbranarū oculi CAP. XXXIII.

Alij tamen ex peritissimis authoribus has tunicas collectim pertractauere, summā tunicā ceratoiden siue corneā vocantes, quę vniuersum oculum circūuelat, sub qua in priore pte

qua pupilla posita est, humor ille aquę similis est. Huic tunicę mediā subiungitur, modico foramine, vt fenestra quædam concaua circa tenuis mediūsculo numerosī coloris a cornea transpecto, vltioribus partibus occulta & ipsa quoq; plenior, quā rhagoïdem quidam vocant, oculum parī modo ambit interius, sub his infra tēuissima tunica aranei telę similis, quā Herophylus medicus arachnoïden appellauit. Nōnulli vero ex recētoribus volunt corneā tunicā oppositę e regione membranę cōmitti, quā scleroticam nominauimus.

¶ De hūorib⁹ q̄ iter tunicas sūt. CAP. XXXIIII

Inter has tunicas humores sunt, inter corneā et secundam albus est, quē transeūt imagines ad christalloïden. Hoc humore cornea intenta attollitur, eoq; consumpto quod in morien

tibus contingit, cōprimitur, pupillaq; exiccato cōtra-
hitur, sicut eius nimietate dilataē. inde oculorū nube-
culę, obscuritates, suffusiones, glaucomataq; oriūtur,
q̄ pupillę ptē occupant. Angulos oculorū vexant epi-
nyctides, pterygia, epilopę. Acie & o oculi quā mydria
sim vocāt, offēdit totos oculos epiphore, aut p̄cidētia.

¶ De hyaloide humore. CAP. XXXV.

Membrana oculi arachnoïdes tenuissima hu-
morē cōtinet, qui a vitri similitudine hyaloï-
des a gręcis vocat, qui neq; liquidus est, neq;
aridus, sed quasi humor concretus est, ab oui candido
nichil differens, ex cui⁹ colore oculus, aut niger est, aut
glaucus, vel ruffus, aut cęsius, cū summa tunica alba sit

¶ De cristalloide CAP. XXXVI.

Sub his gutta humoris est concreta, oui albo
similis, a qua vidēdi facultas proficiscit, chry-
stalloïdes nominatur. Ob eam diuinū oculū
vocat Galenus, gutta ipsa in partē priorem
magis vergit, quę in parte postrema rotunda est, in pri-
ore leuiter plana, cuius vidēdi potentia in cerebro pri-
mum sita est, vel in corde principalī origine, quoniam
multi hominum patentibus oculis dormiunt, corybā-
tiam gręci vocant, sic et in morbo comitiali aperti ni-
chil cernunt animo caligante, animo igitur cernimus,
animoq; videmus. Plato devisu. At si quis (inquit) co-
lorum discussionem opere ip̄o aggredietur, quid inter
humanā diuināq; naturam intersit, ignorare videbit.
Nēpe Deus multa in vnum colligere, rursusq; vnū in
multa pducere sufficiēs est, scit enim simul ac potest.
Eodē enī ferme momēto visibilis virt⁹ & in corde et in
cerebro cōsistere videt, sicut de ratione, mēte, ac intel-
lectu, cęterisq; animi viribus. quoniam in corde princi-

Anatomices

pali origine consistere videntur. In oculis magna ex parte animi indicia habentur, leticię, amoris, odijq; blandi vel torui, sicut sequitię truces vel ardentes.

¶ Quō suffusiones manu curētur CAP. XXXVII.

Quia suffusionū mentio habita est, hypochymosim gręci nomināt, ab oculis solis medici ocularij dicti sunt, sed quomodo suffusiones acurādę sint in cadaueris oculo ostēdendū est. Suffusiones enim varię sunt, quę si exiguę, immobiles, colore aquę marinę, vel ferri nitētis & a latere sensum aliquē fulgoris relinquunt, spes superest. si magnę, si nigre, et pars oculi amissa naturali figura in aliam vertit, si quę ceruleę sunt aut auro similes, si labant & hac atq; illac mouentur, vix vnq; succurrit. fere tamen peiores, quo ex grauiore morbo, maioribusq; capitis dolorib⁹, vel ictu vehementiore ortę sunt, neq; idonea curatio si senilis ętas est, quę sine nouo vitio, tamē aciem hebetē habet. At ne puerilis quidē, sed inter hęc mediā ętas. Oculus quoq; curationi, neq; exiguus, neq; concauus satis oportunus est, atq; ipsius suffusionis quędā maturitas est. Expectādum igit est donec iam nō fluere, sed duricies quędā cōcreuisse videat, nostrę ętatis medici ad maturationē festinādā cibos exhibēt malę qualitatis, vt malis inde vaporib⁹ festinet maturitas morbi. Ante vero curationē modico cibo vtī, bibere aquā triduo debet, pridie ab oibus abstinere. Post hęc i aduerso sedili collocand⁹ est, loco lucido, lumine aduerso sic vt cōtra medic⁹ paulo altius sedeat, a posteriori aut parte, caput ei⁹ qui curabit minister cōtineat, et imobile id p̄stet. nā leui motu eripi acies imperpetuū potest. Quinetiā ipse oculus q. curabit immobilior faciēd⁹ est, super alterum Gossipio vel lana imposita et deligata.

Curari sinister ocul⁹ dextra manu, dexter sinistra debet, ambidexter siue scēua vtraq; manu prōptus. tum acus firmior esse debet, et qua parte manu tenetur crassior ne manū effugiat, eaq; demittenda. Sed recta est qui summas tunicas medio loco inter nigrū oculi & angulū tēpori ppiorē e regione medię suffusionis, sic neq; vena ledatur. Neq; tamen timide demittenda est in viuentibus, quia inani loco excipitur. ad quē cū ventum est, ne mediocriter quidē peritus falli potest, quia prementi nichil renitiť. Vbi eo ventū est, inclināda est acus ad ipsam suffusionē, leuiterq; ibi verti, & paulatim eam deducere infra regionē pupillę debet. Instrumēti enim acies per corneam veluti per vitrū transpiciť. vbi deinde eam mouet vehementius, deorsum imprimere debet, donec inferiori parti insidat. Si hāsīt, curatio finita est, sed ad reliquas capitis ptes transeamus.

¶ De auribus.

CAP. XXXVIII:



Vres semp patent, quoniā sensus is etiā dormiētib⁹ necessarius est, vt a sōno excitemur. extra enī pminent dictę cypseles patulę, nostri sinuosas aurículas, quę cochlię dicuntur, ne adiectę voces labantur. propterea duos flexuososq; introitus habent, qui scaphi appellantur. ijs percussus sonus amplificatur, summa auriū pars alula dicitur, infima lobus. In hoīe ita collocatę sunt vt superiore alula aerem recipiāt. cartilaginosa sunt, quoniā pminent, alioqui flaccidę sonū impedirēt. homo pro magnitudine minimū fere omniū aīaliū procul sentire potest, cū tamē differētiarū sensu maxime omniū valeat. cui⁹ rei causa est, qđ sensorium sincerum, minime terrenū, corpulentūq; obtinet. Sonus (vt Platonī placet) per aures cerebrūq; et sanguinē vsq; ad aīam penetrat, in sedem

Anatomices

iecoris. Aristoteles vero inquit ab auribus meatus ad occipitis partem penetrat, sicut oculorum ad venas circa cerebrum sparsas tendunt. Alibi, olfaciendi (inquit) audiendiq; meatus contingunt aerem externum, pleni spiritus nativi, ortiq; a corde tendunt ac desinunt ad venulas cerebro coniunctas. Rursus alibi. Meatus (inquit) sensoriorum omnium tendunt ad cor, indicium differentiarum tum soni tum odoris in sinceritate sensorij sumeque membranae positum est. In his sordes sunt concoctu amariore. Qui bile hac parte purgari contendunt, meatuum ratione facile convincunt. his aditus bestiolis irruptibus difficilior fit, quibus tanquam visco continetur. In imo anfractu membrana posita est, quam meninga vocant. Hac aeris ictus desinit, qui ad cerebrum vicinitate deferretur, quoniam ea membrana a cerebro est, cuius conexione lingue annectitur. Quapropter verba ediscuntur, quae prius audiunt, deinde ore pronuntiatur. qualis enim motus per sensorium subierit, talis quasi ab una eademque effigie motus per vocem agit, ut quod audieris idem referas. Hos meatus ad cor pertinere asseuerat Aristoteles quem Auerrois sequitur. quod oscitantes, aut caput scalpentes, aut labore vehementer spirantes, minus audiunt, quod in ceteris sensibus non contingit, quoniam extremum sensorij auditus ad partem spiritalem terminetur, & quatiatur, moueaturque una cum instrumento spiritali, quotiens illud spiritum mouet. magno item argumento, aures purgantibus tullis exciteant, sicut narium sternutamenta. Membrana si humore aut spiritu afficitur, surditatem affert, grauitatem, murmura, sibilos, tinnitus, aut alios incertos sonos mentit. Sub auribus strumae innascuntur, inopportuneque radicantur, soboleque iter remedia sepe rebellant, post quas parotidum tument.

¶ De naso.

CAP. XXXIX

Eminentior faciei pars est nasus, cartilagineus. ab osse incipit quod est inter supercilia, ethmū nominauim⁹. qui in globulū desinit. mouetur in homine labrorū superiorum motu. in canibus sua neruorum syzygia mouentur & cōtrahuntur. Hac parte aerem trahimus, reddimusq;. hinc sternutamenta ciuntur, quoniā ad cerebrum certam viam habet. Recte enim in superiori parte constituitur, quoniā odor omnis ad superiora fertur. cibiq; ac potus primum indicium facit, ob id oris vicinitatem consecutus est. In homine vis odorandi imbecillior est ceteris animalibus, ob id vehementer attrahit, sicut cum aquam rosaceam odoramus. hinc mucosum humorem trahimus, & cerebrū perpurgatur nec commodius. Pilos in utroq; sexu nō inutiles habet ad puluerem & alia depellēda. Quod nares discriminat, interseptum vocauimus. Harum foramina interiora a quibusdam thalamæ, vnde pītuita distillat. lacus siue torcular. inde ad imas nares foramina simplicia sunt, quæ rursus in bina itinera diuidūtur, ad fauces peruia spiritus recipiuntur, de quibus suo loco diximus. summę ossium angustię, isthmoides vocantur. In quibus ozena vlcus foedi humoris distillantis innascitur. Polypus & carcinomata infestant. Nariū vena si inciditur, adeo sanguinem indefinēter quādoq; fundit, vt sistendi modus non sit. Aetate nostra narium deformitatem cohonestari docuere ingenia, carunculā e brachio suo cōcisam ad narium formā conseri addiq; truncato naso sæpe visum est. Summā enim cutē brachij nouacula excidūt, facto vulnere, abrasis si opus est nariibus vel nouiter abscissis capiti brachium deligant, vt vulnus vulneri cohereat, cōglutinatis vulnerib⁹, e brachio.

Anatomices

chio tantū cultello demunt, quantū instaurari conueniat. Nasī enim venulę, cognatę carūculę alimentum prębent, cutisq; demū superinducitur, pilis quandoq; pro brachij natura innascētibus, eoq; modo nares nouas miro studio cōponunt, foraminaq; faciunt audaci ingenio naturę imperantes. Id additamentū hyemīs vehementiam vix sustinet, & curationis initio nasum ne pręhendant, moneo, ne sequatur.

De maxilla inferiore

CAP. XL



Maxillę inferioris pars prior mentū dicit, posterior mandibula, illud supplices veteres attingebant, mandibularum extrema quasi bicornia sunt, alterum p̄cessum probolę gręci vocant, intra latior est, verticeq; ipso tenuat, longiusq; procedēs, iugale subit, & super id temporū musculis adalligatur, alter breuior & rotundior. In eo sinu qui iuxta foramina auris est, cardinis mō cohæret, ibiq; huc & illuc inclinans maxillę facultatē ad motū p̄stat. Maxillę buccis integuntur, quę hilaritatē risumq; indicāt, quę musculis suis permobiles sūt. Hoc in loco vultu-
nerum magistros admonendos esse ostendit resecandi ars, vt cum labra, buccę, frons, supercilia, aliquo casu resecanda sint, in illis a naribus deorsum, in his a vertice ad oculos sectiones ducantur. Maxilla sepe p̄pellitur in priorem partem, modo alterutra parte, modo vtraq; si altera, in contrariam partem mentū inclinatum dentesq; paribus non respondent, sed sub ijs qui secant, canini sunt. At si vtraq; totū mentum in exteriore partē promouet, inferioresq; dentes lōgius quā superiores excedūt, intētiq; sup̄ musculi apparent. Et quomō in sedē suam cōpellať, a Celso & posterioribus quęrendū est. Hinc ad venas & arterias trāseundū.

In librum quintum Anatomices.

Alexandri Benedicti physici, De venis musculis ossibusque, nervis qui per omnes corporis partes feruntur. CAP. I.



Vm enim omnia corporis membra nutrimento continuo indigeant, per uniuersum corpus veluti in rigadis pratis aquę ductus varios deducunt, ita spiritus & sanguinis deriuatione ad irriganda membra constituit Deus occultis sub cute meatibus. Per nervos pariter, & si non ab vno stipite prodeant, ad omnes corporis partes sensum semitam deducuntur, arboris radicem, & fibrarum more. Ex spina quoque brachiorum & femorum ossa costęque oriuntur, dura, stabilia, grauia, veluti stabile fundamentum totius corporis. Ob id rigida, aridaque constituta sunt, sine sensu, quoniam ad dolores prompta perpetuo essent, quorum extrema sibi cohereret, alterum cauum, alterum rotundum, aut vtrumque cauum medio talo, omnia nervis deligantur, veluti ex pluribus lignis, clavis coniuncta atque fixa sit nauis. Quãobrem Caballe Iacobe, Angele auuncule, Antoni fauentine, Hieronymę Cordi, Domiti Gauerde. Et ex patricia gente Luca Donate ex Andrea, & Marine Sanute ex Leonardo progeniti, in omni re naturali aliquid mirandum conspici potest, & quia magna ex parte theatri nostri turba continuis diebus ac noctibus defatigata sedilia complura vacua ac gradus reliquerit, ociosius venarum, arteriarum, musculorum, nervorum, ossiumque naturam percunctabimur, nec ut in cæteris propriis spectaculis nos opprimeret importuna iuuentus,

Anatomices

Cum paucis quę contueri alij nō cōcupiscunt, inquisi-
tius considerabimus.

¶ De sanguine & spiritu.

CAP. II.

Sanguis homini inter animalia maxime abū-
dat, in quo animā sedem habere existimauit
vana antiquitas, q̄ eo effuso statim hominē
mori necesse sit. Hic in corde tanq̄ in fonte,
et in venis tanq̄ riuulis qui ab eo oriunt̄, cōtinetur, ex
sanie per concoctionem generatur. Spiritus quoq̄ a cor-
de originem habet, & a horta eius conceptaculū. Atta-
men sanguinē sine spiritu nec spiritū sine sanguine in-
ueniri posse haud constat. Cor spiritu palpitāt prāter
q̄ in defectu. Et homini vni omniū animalium spe ex-
pectationeq̄ rei futurę mouetur. Spiritus purissimum
sanguinē continet, quem mediū cordis domiciliū per
venam ambientem recipit, prius tamen in cordis ma-
teria digestum. Sanguinis venę nunq̄ mouent̄, at a hor-
tā eodem modo quo palpitāt cor, pulsāt. quarum re-
percussu, ex ebullitione spiritus in extrema corporis
fieri contendunt, quales maris motus circa littora cer-
nūtur, vel quales sursum mittit hamula ebullitiōes dū
feruet. Alij hos motus arterijs attribuūt, hoc est con-
tractionem, atq̄ distinctionem. Illam systolem, hanc
diastolem vocantes. Indicio est ebullitionis siue estua-
tionis a horta vulnerata aut p̄secta, quoniā spiritus
distincto impulsu per saltus emittitur. Eodē modo in
coitu semen quoq̄ virile profilit, ebullitionis añdictę
certum argumentū. At posteriores medicī spiritus cō-
trahī atq̄ attollī arbitrātur, duoq̄ inter cōtrarios mo-
tus interualla addidere, quod conceptaculorum moti-
bus dūtaxat intelligi necesse sit. Sanguis integer rubēs
est, dulcis, tenuis, purus, si corpus valens est, ac ætate

media. culpatus, ater est, vel aquosus, vel nimium biliosus siue nimium crassus, maliue saporis. Prepinguibus minus quam macris sanguis iest. Sudoris vice sanguis emititur tenuis, quod ex ictu hemorrhoidis serpentis fieri in libris venenatorum diximus. Et in Christo deo nostro inedia, moerore, laboreque exhausto, sudoreque, sanguis undique pfluxit. Qui dormientibus extrema corporis deserit, intima repetit, quod alios quoque contingit, vel metu correptis. ijs venifeca adacto scalpello venam frustra vulnerat. In meseraicis sanies generatur ex coctione, colorque dilutum contrahit ex succo stomachi et intestinorum. si putrefit sanguis, in pus & malos humores permutatur, concalescens in poroides transmutatur. Ex bono sanguine adeps generatur, ex corrupto vitiligines, scabies, lepra, verucque. In iecore ac pulmonibus lapidis duricia concrescit. Iuuenibus sanguis tenuis est ac purus, senectutis vero crassior ac nigrior, glutinisque modo lentus est, etate media mediocris cernitur.

¶ De vena maiori & ahorta.

CAP. III.

E Motis intestinis omnibus, ac spiritalibus membris, binę venę grandes secundum spinam apparent, altera maior, altera minor quę posterior est & ahorta appellatur. vtranque a corde oriri certum est vbi quinta spinę vertebra sita est, ab eo enim tanquam a radice crassioribus stipitibus proueniunt, in iecore vero & pulmone (vt dictum est) exiliores venę per mediam veluti materiam transigunt, illarum enim propagines sunt. Ex corde sanguinem & spiritum venę recipiunt, in viuis vix cerni potest, vt quemadmodum se habeant consideremus. in cadaueribus summa venarum principia vix conspiciuntur. Ahorta namque ob id dicta est, eo quod nervosa eius pars conspici euidentius

Anatomices

in mortuis possit, situ autem eo constitutę sunt venę, vt altera supra, altera infra sit, maior dextram potius sedem, minor sinistra possideat, quę de sinu medio cordis exit, arctiori fistula a latere ipsius. illa ex amplissimo supremoque sinu oritur, sedemque dextram tenet, mox per medium sinum formam recipit venę, vt potest cum ipse ventriculus cordis venę maioris particula sit, quę sua radice cor transigit cum sese promit. hęc membrana & cute constat. Aorta vero maxime nervosa cernitur, sic natura, sanguinis & spiritus riuos per totum corpus digessit, quod euidentius cernitur in macris ac extenuatis, in quibus plures venę apparent, ac maiores, vt in arborum folijs arescentibus, in quibus venę tantummodo relinquuntur, cuius rei causa est quod sanguis, & quod sanguini proportionem habet, potentia sit corpus & caro, aut quod iis proportionem respondeat. Venę item corporis ampliores durant, minime autem carnes actu efficiuntur, quę potentia nichilominus venę sit, quę obrem & si caro sit. Medici tamen nostri alios humores inter carnem & sanguinem attribuunt, sanguis itaque in omni carnis parte habetur, qui inducto vulnere vndique effluat, igit sine vena esse non potest, vena autem nulla manifesta est. Ex his venulis sudor elicitur in roris modum, vel flaua bilis fœdi odoris, aut lentiginis modo consparse macule in febribus aut verrucę ex atra bili. In sanguinis præterea materia quoddam genus fibrarum est, quod stamen siue filamen appellare maluerim, ines a grecis vocatur. Id nec in omnibus animalibus, sed his tantum quibus firmiore coitu concrescit. Id enim si detrahitur, vt ceruus & damis, tum sanguis non coit, nisi fluido coitu,

quale lac sine coagulo spissatur, sed in sanguine conspiciue cernitur si in calidam aquam ex vena colligitur.

¶ De ramis venę maioris & ahortę CAP. IIII.



Vena maior sursum ascēdēs in duos riuos scinditur, vt venisecij ratio omnis absoluat, quorum alter pulmones subit bipartito ramo, quoniam pulmo duplex est, de quib⁹ suo loco dictum fuit, cum de pulmōe egimus. Alter per spinam descendit, & ad collum sursum versus porrigitur, vbi duplici propagine grādiore fertur, ad dextram & sinistram, quę vtrinq; priusq; alas subeant, venas singulas deorsum versus ab vtraq; spinę parte ad singulas costas, quas. vii. esse indicauim⁹, totidēq; ad vertebrae emittunt, quę & pectus nutriunt, in minoribus animalibus (vt animaduertimus) vna tantum vena est, quę secundum spinam a dextra parte deorsum versus tendit, et vtrinq; tamē costarum ordinem nutrit. Scinditur etiam bipartito vena maior iuxta vertebrae qua supra renes posita est, sed rursus parte superiore, quę ex corde protēdit scissa numerosiore venarū ppagine, duo petit loca. quippe quę alias in latera & humeros mittat, quę mox per alas ad manus feruntur. Ex eisdem ramis supra iugulum vbi scinduntur, ex vtraq; parte gutturis sursum ducuntur iugulares dictę siue sphagitides, quę foris apprehensę corruere hominem faciunt sensibus ereptis. Itaq; porrectę amplexęq; arteriam ad interuallum aurium feruntur, qua maxillę faucibus coeunt. Denuo inde scindūtur in venas quatuor, quarum vna remans per collum & humerum descendit, & cum priore propagine ad flexum brachij

Anatomices

copulatur, Cephalica dicta, secunda ad palmā et digitos cessat, tertia de vtraque sede aurium ad cerebrū pertinet, atque in multos prætenues ramos spargit, & membranam cerebri custodem subit, quod posteriori rete mirabile appellarunt. Reliqui rami, partim ambiunt caput partim ad sedes sensuū, palatū, linguam, dentesque gracili venarum serie terminantur. Pars autē venę maioris cordi subiecta, quę elatior (vt dictū est) fert, per septum transiens iecori annectitur, inde ab ipsa iecur trāsigente, rami duo procurrūt, alter ad septū & præcordia cessat, alter supera petit, ductusque per alam ad lacertum brachij dextrī se porrigit, quę ceteris venis se applicat, iuxta flexum interiorem. Quamobrē sanguine hinc misso, dolores iecoris ac affectus fere omnes, sicut oppillationes apostemata & similia leuari possūt, regalis vena dicitur. Pars altera venę eiusdem brevis quidē, sed crassa, petit lienē, ibique aboletur. Quinetiā ab eadem maiore propago parī modo ad lacertū sinistrum brachii mittitur, sed quę ad brachium dextrum procedit, eadē quę pertingit ad iecur est. Alię item a vena maiore duę propagantur, quarū altera ad omētum, altera ad pancreum, de qua, venarū frequentia promessenterium tēdunt, quę omnes in vnā desinunt venam grandē per totum intestinū & ventriculū ad gulam usque porrectā, quę & ipsa ramos de iis, quos perreptat, partibus spargit complures. Vtraque igitur maior et aorta renum tenus (vt dictum est) vna atque perpetua tendit. Hic capitibus renū potius adherescunt, fundunturque bipartito velutī in literā V inuersam. vergitque magis in partem posteriorem corporis vena maior quam Aorta. Reliquę propagines, vbi interiora mēbra descripsimus, dictę magna ex parte sunt, quas

per ordinem rursus percurrisse non fuerit alienum.

¶ De vena medij frontis & tēporum CAP. V.



Vena frontis quæ & mediâ dicitur, in plerisq̃ turgida cernitur. In amentibus, attonitis, veteri capitis dolore vulneratur, vel si dolor est in occipitio. ex alto enim materiam trahit.

In apoplexia sphagitides aperte mire proficiunt, quæ in temporibus sunt sinuosæ, in oculorū malis cōmode feriuntur. Et parotidas suffusionis initio alij eas adurunt, sicut & temporū. Dissectores post hæc brachij cutem vniuersam dirimāt, vt venarum indicetur reliqua natura. ¶ De cōmuni vena brachij CAP. VI.



Cephalica vena iecori, vt supra dictum est, cephalica capiti prodest. his annexa cōmunis dicitur, priores ad manum extimā ferūtur & digitos. Sub iecoraria, arteria protēditur, ob id periculose inciditur, prodigioseq̃ venā scandit, quæ pulsu percipitur. Cephalica inter pollicem & indicem finit. Inter minimos lienaria (vt volūt) & iecorariæ vicaria sita est.

¶ De venis quæ renibus copulātur CAP. VII.



Renibus, lienis, ac renib⁹ vena maior copulatur, in quib⁹ veluti anchoris stabilitur. ita et ahorta in suis mēbris. in renibus generatiōi materia preparatur, vnde in affectis pro genitura sanguis profluit, de qua dictum est.

¶ De ceteris venis

CAP. VIII.



In ceruice vena est quæ hemicranicis secatur. colli venæ & quæ post aures sunt, aperiūtur. In naribus sublingua, in angina & vicia, sub labro, sub iugulo, sub dextris præcordijs. ex sinistris quoq̃ in iecoris et lienis malis. Ex poplite ischiadicis,

Anatomices

ex talo in vuluꝝ vitijs. Supra calcē in extima parte isci-
adica eadem vena est, vel inter minimū & sequētem,
quę omnia detracta cute a peritis indicāda sunt. Semel
hoc loco dixerim venarū situm, sicut & de futuris ossi-
um cōmemorauimus, non semper perpetuū esse, imo
plurimi sunt quibus variant venarum riuī. sed de ahorta
iam percurrendum est.

De ahorta

CAP. IX.



Vena ahorta eodē fere modo in ramos spar-
gitur, qui riuulos venæ maioris consequuntur,
venaꝝ fere semper super prætenditur. cuflos
enim alterius videtur, præterq̃ in lacertis & fe-
moribus vbi arteria venam, mutatis vicibus, altera de
parte dextra in sinistram, altera de sinistra in dextram
scandit. Pericula enim semper, atq̃ incidentia auertit
natura, obiectat enim semper ignobiliorem partem.
Ahortæ riuī vbiq̃ minores sunt, sed robustiores tuni-
cas habent q̃ venę. Et spinę annectitur binis per inter-
ualia venulis tot numero fere quod vertebris prætenu-
ibus, Ac neruis item alligat̃ cordis, ex quo insignis ve-
na producitur. Ad mēterium ramos mittit, sicut et
vena maior, verum longe minores. per angustos enim
in fibras proximos. quippe quos extenuatos in fibras
cauas tamē cessare aduerterim⁹. Ad iecur nulla ahorta
pertinet vena, at renum tenus, sicut & maior findi-
tur bipartito in literam. λ, & in materiam eorum ab-
sumitur. venæ a renibus quæ non sunt a vena maiori,
sed ab ipsis exeuntes in vtranq̃ coxam cōduntur, ac
delitescunt ac denuo porrectę ad partes (vt dictū est)
genitales tēdunt. Ad vterum de ahorta multę, frequē-
tesq̃ veniunt, sicut & ramī qui ad reliqua intestina per-
tingunt. Et qui circa gutturis partes arterię parī modo

ascendētes ad caput potidas vocant, quę sursum versus procedētes ultra aures ferunt, quę præfectę sterilitatē afferunt, ad cerebrū & eius mēbranā custodē tēdunt, reticulū illū constituentes ramis maioris venę comitantibus.

¶ De arterijs crurum.

CAP. X.

EX aorta iuxta iuguina ramī duo ad crura descendūt, per femora crura in plantas vsq; & digitos finiunt, eadem ratio est & in brachiorum arterijs.

¶ De venis & arterijs quę mutuo inter se respondent.

CAP. XI

Maro experimento constat inter authores venarum certas propagines inter se respōdere. Galenus in somnijs monit⁹ est, vt iecori grauius laborātī, vena quę inter pollicem & indicem sita est, soluere, paruit visis, et liberat⁹ est eger. Id quoq; non spernendum est, q̃ Diogenes medicus tradidit, et ipsi quoq; experti sumus in maximo stomachi dolore, ex iecoraria vena vel lienaria sanguinē mitti plurimum prodesse. Pollibium physicum increpat Aristoteles, quod venam a frōte per ceruicem colum ad spinæ latera ad clunes, per femora et tibias, ad malleolos exteriores, ad digitos minimos ptinere tradiderit. quę si vulneratur, capitis doloribus subuenire. Aristoteles enim nō experimentū sed viam redarguit, quam Pollibius ita temere credidit. Et si venę omnes ad vnā cōueniant, eadē de causa in ceruicis dolore poplites fricari suadet antiquitas. In nariū pfluuio testes frigida foueri præsidium esse, vel extrema perstringi. cucurbitula sub māmīs imposita mensiū pfluuia silti, inguinū tumorē pollex in pede proximo digito p̃ligat⁹ sedare tradit. In manu dextra duo medij lino leui-

Anatomices

ter colligati distillationes atque lippitudines arcent. Hemorrhoidibus atra bilis expurgatur in certo ex liene tramite. Alię quoque similes latentes propagines habentur, sed de his satis dictum sit. Idem in nervis observandum est, quoniam narium pruritus ventris animalia gulam infestari indicium sit coniugatorum nervorum (ut dictum est) colligatione. Excitari quoque tussim animadvertimus cum aures interius repurgantur.

¶ De membris ad quę sanguinis venę tantum derivant, ad quę aorta duntaxat, vel utraq; pertineat. CAP. XII.



D cerebrum utraq; vena tendit, sicut ad renes, stomachum, omentum, mesenterium, pancreum, linguam, oculos, pulmones, septumque transversum. In iocinere venę sanguis tantum apparent, ex aorta nulla, quoniam ipsius ministerio sanguis concoquitur & ad cordis sinum transmittitur. Verum subinde eundem recipit, qui spiritu non caret vitali, & in fibris concoctus recipitur. cui enim fibrę gibbi respondent in tanta venarum exilitate, ea virtus Alloeotice dicitur. In corde vero non in fibris, sed in cordis substantia concoquitur ad spiritus generationem. At in pulmone fibrę sanguinis & spiritus, aeris fistulosis meatibus mirę nature opere non respondent, in tanta fistularum spectanda subtilitate, ad vulvam nulla ex vena (ut dictum est) pertinet, quoniam exiguo sanguine indigeat. Ex aorta vero plurimę conveniunt,

¶ De fibrarum ratione.

CAP. XIII.



Q via de fibris mentio habenda est, ideo de his aliquid hoc in loco referendum arbitror. fibrę enim inter nervum & venam naturam habent, ex quibus nonnullę humorē, saniem dictam continent. Nam nervi non sunt, quoniam sanguinem attra-

hūt, nec venę, quoniam durę sunt, nec cauę reperiunt, saniem in se continent, sicut venę sanguinē. Arteriarū tamen fibrę nō saniem, sed exilem spiritū continēt, & in spectādā tenuitatē in membri substantiā desinunt. A neruis ad venas ac inde ad neruos pertinent. Nullę in renibus reperiūtur, in corde pauciores, plurimę in pulmone & iecore. Fibrę in animalibus partim cute, partim mēbrorum materia integūtur, in plātarū vero radicibus exerte sunt, in vtero vero vmbilici fibrę plurimum cōspicue, quę attractrice vi sanguinem per secundarū venas ad foetus alimentū infundūt. In fibris omnibus cōmune vitium est crasso humore obstrui, quod oppillationem vocam⁹, atq; ita elāguescere, breuiq; hominem consumi. Arescunt enim paulatim mēbra, sicut frondes conuulsis arborū radicibus. Stomachus enim & intestina pro terra est, cibus vero, ac pot⁹ alimoniā pstant. Qui materiā rerū comestārū integrā subire putant, plantarū etiānū argumento cōuincunt, quoniā fibrarū exilitas capillamētaris eorū inscitiā redarguit. Quidā q; inter magnos medicos habit⁹ est, fūgi frustū per vesicā emissum se vidisse predicabat, sed acus illius exemplū per vrinā redditę plurimos dissektionis ignaros cōmouet, qui eā per venas messenteriacas a stomacho ad iecur, ac per venā maiorem ad renum angustias, inde ad vesicā penetrasse falso arbitrātur, ora fibrarū in viuentibus patētiora esse ad acū & frustū fungi suscipiēdū putātes. Acus enī acie sua paulatim multoq; tēpore intestina penetrauit. viā enī sibi facit quod a natura propellitur, & ad vesicā qua parte carnosā est, inde per vrinā reddita, sicut & sagitta quę acie aluū biennio secuit, qđ miris cōprobatur exēplis.

¶ De neruorum origine

CAP. XIII.


h.i.

Anatomices



Ervorū ratio in dissectionib⁹ minus patet. Verum qui eius originē, propagines, ac nex⁹ contemplari distinctius volunt, corpora integra variis ligaturis obligata flumine macerāda cōstituunt, euulsis interaneis, detractaq; cute, caro enim protinus marcescit, & quicquid molle inuenitur, nervi vero ac nex⁹ ossibus contumaciter hærent, qui demum sole exiccati varios contextus ostendunt, sed contractationis foeditas medicos ab his deterret. In corde nervos oriri (quia primū omnium membrorum quod generatur est) sine cerebri auxilio, inter quos nervosa ahorta est. Ceterum natura nervorum a cerebro eiusq; vicaria medulla originem magna ex parte habere cernitur euidentius, qui quo magis a cerebro et medulla longius protendunt, eo duriores sūt. sicut quos vocales diximus, quidam musculis accommodati sunt, quidam membrorū flexib⁹, qui nomine vacant, ab aliquibus nex⁹ vocantur, rotundi chordę dicuntur, nervus latus humerarius a gręcis platys dicitur qui ad vires facit. Ceruix & scapulę maxie cōtinent iis q; tentōdes vocātur, caput enī sustinet vtrinq; recti valentesq; nervi, siquidem horum ad omnes fere flexus alter semper intentus est, nec ultra prolabi superiora patitur, nervus alius latus est, qui poples dicitur, calci annexus, membrū ad saliendū idoneum reddens, sub furis ad incedendum, & ad cursus necessarius. De nervis capitis diximus, pedes & manus nervorum copia abundant, in quibus nervorū circa articulos intextus videre, quam litteris exprimere magis iuvat, quod resectores ostendere necesse est. Restant quę ex spinę medulla oriuntur.

¶ De nervis q; ex spinę medulla oriuntur CAP. XV.



Pine medulla a cerebro descendit, quę ptenui etiam membrana velať, si inciditur, mortifera est, sicut & quę cerebri custos dicit. Ex medulla plurima neruorũ genera oriuntur. Nā

vtrinque per vertebrarum foramina a ceruice vsq; ad os sacrum vna & triginta neruorum syzygię prodeunt. a qualibet enim vertebra bini nerui proueniũt, hinc manibus pedibusq; alijsq; corporis partibus per quas necesse decoreq; viuĩtur, virtus p̄statur, quoniā sensificā motricēq; potentiam subministrant. Ex ima spina nerui vtrinque oriunt qui sub coxis in vnũ coeuntes singulos ad poplites neruos emittunt qui teretes dicunt, ad successionē quoq; generis vtriusq; sexus, mēbris genitalibus vt suũ opus impleant virtutē largiri pduntur. Ideoq; nulla fere corporis pars sine cerebri spiramēto vel medullę spinalis beneficio constat, vnde a medicis longum cerebrum meruit appellari, ei superne veluti filum in longitudinem protenditur, diuisam medullę materiam leuiter indicans. dempta membranula vna fere materia diiudicatur, quod morbi paralysis argumento percipitur. Nam ex apoplexiā alterutra parte affecta dimidiata corporis pars dūtaxat periclitat altera illeša, quā hemiplexiā vocāt, resolutis corporis neruis qui mouendi & sentiendi internuncij sunt. His enim omnibus mēbris tactus diffundit animalī necessarius. Neruorũ itaq; certa cōtinuatio non est, vt in venis et arterijs. Omnia ossa musculi mēbranis neruosis integūtur & in musculis quoq; neruositas intus intercurrit. Ossa neruis colligant & circa art⁹ plurimis obducuntur & cōpagum nexibus adalligantur. ij aliubi interuentu, aliubi ambitu vel transitu ligāt. hic teretes illic lati, aliubi crassiores, aliubi membranę naturę

Anatômices

vt in vnoquoq; proſit figuratio, alij carne commixti ſunt ſenſui aptiſſimi, alij teretes & ſimplices qui articulos tegunt. Omnes perpetuo humore madent vt mēbra lubrica celeritati idonea exiſtant.

De ceruicis neruis

CAP. XVI.



Iruos ex ſpina per foramina tranſigei e ſignificauimus. at in ceruice ex vertebrarū cōpage exeunt, ne crebris foraminibus, quoniam tenuiores ſūt, inualida fieret. Plures neruos ceruix continet, platys maximus eſt, muſculiſq; duobus ingentibus herent venę ſphagitides. Ceruix grauiſus et periculofis morbis obnoxia eſt vel acutiſſimis. nam neruorum rigore, modo caput ſcapulis, modo mentū pectori annectitur, modo rectā immobilēq; ceruicem intendunt muſculi, priorē gręci opiſthotonō, ſequentem emproſthotonon, vltimum tetanū appellant. ij diſtillationibus proueniunt. Ea vicia ad ſpinam quoq; descendūt, vt ipſa ad arcus ſcytici modū retrorſum flectatur acutiſſimo morbo, quo ſepe intra quartū diem tolluntur. Inter exempla Sanctius Pollanus cydonienſis ex patricia gente ad. XL. vſq; diē huiusmodi tormentis tortus eſt, digeſta tandem materia & per vrinā humore lacteo reddito leuatus eſt, cui caſtoreum præcipuo fuit remedio.

De lumbis

CAP. XVII.



Quoniam dorſi partes ſunt lumbi e regione ventris conſtituti, carne hos vacare tradit Ariſtoteles vt flekti poſſint. omnium enim flexus ex carnes ſunt. Ii venere fatigantur, & dolorib; ſepe torquent. Ex ictu quoq; vel lapſu delumbatos non ſine magno periculo vidimus. Ab iis nates ſunt, ad corpus requiem pro ſtragulo datę, iccirco

co ab ægritudine consumpti sedere nequeunt, ijs cucurbitule impositę regalis venę vicē vtiliter præstāt. Hinc ad corporis musculos transeamus, quorum ratio magna ex parte a nobis pro membrorum qualitate demonstrata est.

De musculis

CAP. XVIII.



E musculis libro primo pauca retulimus, quorum numerum irritō veluti labore antiquitas prætermisit, sed eos dūtaxat animaduertit, qui in membris præcipui sint, quiq; perculsi letales videantur. Nam ij muscoli præcisi facilius sanantur, reliqui minoris famę, non ita mortiferi sunt. Omnes ex carne, neruo, membrana, chordaq; constant. ijs membra si contrahuntur, conducuntur, si resoluuntur, eadem pariter reuocantur. In fronte, capite, palpebris, labijs, buccis, confusi, motu magis q̃ dissectione percipiuntur. in maxilla superiore binos. in labris totidem, ac naribus. in mādibula inferiore duodenī. circa collū circiter. iij. et .xx. in epiglottide, guttore, ac gula. xxxij. a collo ad scapulas. xij. collocāt musculi, in lingua. ix. inueniuntur.

De musculis thoracis

CAP. XIX.



N pectore musculos. viij. attollētes, atq; constringentes. vij. inter costas singulas quatuor esse ostēdunt, eo quod carnis musculorū filamenta quę mēbrum contextūt. iij. mixta cernūtur, circa humerū utrūq; supra. viij. & .xx. cōnumerātur musculi, quorū quidā ī gemina capita findūt, et a simplici incipiūt.

De brachiorū musculis CAP. XX.



N brachiis qui maiores sunt. iij. & .xx. numentur, in lacertis ac cubitis, in palma & manu auersa digitisq; pro cuiusq; motus ratio h. iij.

Anatomices

ne. viij. & .xx. esse creduntur, quorū plurimī adeo confusi sunt, vt diuelli nullo pacto possint.

¶ De dorsi musculis

CAP. XXI



Vi vero dorsum flectunt ac reuocant. viij. & lxxx. inueniuntur. Hi vētri de quibus primo libro diximus. viij. sunt, testium quaterni, in mulierū testibus singuli sunt, vesicæ ceruici vnus tantum, virili mēbro quaterni sunt, in ano totidem inuenti, quorum vnus astringit, voluntarioq; continet, ex reliquis vnus cum membro virili cōmittitur, cuius titillatu infando naturę vitio pathici in libidinē erumpunt. Eadem ratio est, qui solutis iisdem musculis in venere excrementa inuoluntario profluunt.

¶ De crurum musculis

CAP. XXII.



Ncrure omnium fere maximī inueniuntur, vi. & .xx. bini præcipui sunt, quorum alter cōtrahit, alter protēditur. A vertebra enim fœmoris pedis pollicis ad ingressus neruo annectitur, qui protendunt nobiliores existimantur, ij cursu, itinere, vel stando maxime fatigantur. Circa eandem coxam vnus est, qui triceps cernitur in sūma parte, dupliciq; cauda terminatur, qua annectitur. alij lumbis, alij ilibus annexi sunt. In vtroq; fœmore. xl. numerantur. In poplite item ac circa tibiā. xxviij. colliguntur. Circa flexum pedis per pedem. ij. & .xx. collocātur, quorū vn⁹ duas ex se emittit chordas. Circa digitos bini sunt qui binas singuli emittunt chordas. sub planta vero quini, ex quibus nōnulli inter se adeo permixti sunt, vt diuelli nequeant, aut vno laeso reliqui afficiant. In summa igitur summarum musculi omnes (vt dictum est) circiter quingenti vigeni senī colliguntur.

De ossibus & primum de ceruicis
vertebris

CAP. XXIII.

DE ossib⁹ nōnulla libro primo dixim⁹ in vni-
uersum, ac capitis ossa pectorisq³ & laterū
speciali⁹ suo denarrata sunt loco. At nūc res-
liquorū ptractanda est natura, q̄ nō solū ab
authoribus habenda est, sed diligentius (vt Galenus
tradit) ex cadaueribus cognoscēda. Quidā emotis mu-
sculis ac carne dimidiatū cadauer ingēti cacabo disco-
quunt, plena coctura est cū carnes facile laxantur, q̄ su-
persunt, agitant laureo ramo, tū diligenter eximunt,
ac deinde ossa sensim dispoliāt. Quidā medicus inter
has resectiones humanā carnem coctā nobis presenti-
bus cōmanducauit, ac exinde mansam expuit, vt cete-
ris de sapore indicaret. interrogantibus qualis saporis
esset, bubulæ respondit. denudata tandem ossa facile
cernuntur. Alij in sepulchris cadauera intuetur, nō si-
ne nausea, quoniam immunda sunt. in flumine vero
vel calce dissoluta præferuntur. Huiusmodi ossa vul-
nerum medici frequenter spectare debent, & clinici
quoq³ non negligent. Euenit olim peractis resectio-
nibus in patauino gymnasio vt quidam discipulus
ea ossa ad vsus reseruasset. venetias nocte veniens me-
dio itinere lintrem cœnaturus relinquens, diuersori-
um cum cæteris sociis petit. Ecce petulantissima pu-
blicanorum familia, qui occultas merces inquirūt, cap-
sulam inuētam in lintre, requirētes dominū, & nemi-
ne respondente protinus auferunt, & præfectis præ-
sentibus sequenti mane reclusam patefaciunt, repertis
ossibus pulpīs viduatis, cādicātib⁹, inter odoratas her-
bas, venerabūdi nudo capite sanctorū ceu reliq³as pti-
nus adorāt, ide ad summū magistratū scriniū pferūt.

Anatomices

In eo turbę concursu Franciscus Sanut⁹ cōsiliarius vir summe virtutis dissectionū reliquias patefecit, & sc̃tatori medicinę de erepto scrinio conquerenti restitui iussit magno omnium risu frustrata publicanorū auaritia. Sed ad ceruicis vertebrae redeamus, ea septē orbiculatis ossibus cōstat, quę media medulla a cerebro descendēte perforata sunt, vbi medulla q̃ in spina amplior est. Eę caput sustinent. primam ex vertebrae strophe, & epistrophe vocant, Hippocrates odōta. secundam axem, quoniā tanq̃ axis sit immobilis. vltimā atlantem, quoniā baiuli modo onus sustinet. at Plinius mutato ordine primam atlantiū facit spine articuli vinctam, vltima vero epistropheum, qua sinistrorsum, ac dextrorsum caput inclinā, inter quā & axem sequentem modo caput scapulis, modo mentū pectori flectimus. Si caput igitur qđ duob⁹ processibus in duos sinus summe vertebrae impositum est, in priorē partem excidit, ita vt nervus sub occipitio extendat, mentūq; pectori agglutinetur, tū is neq; bibere, neq; loqui potest, interdūq; semen genitale inuoluntario emittitur, quibus celerrime mors superuenit.

De spina.

CAP. XXIII



Eruici spina ossiū origo (vt Aristoteli placet) annectitur. tereti quoq; structura per media foramina, eadem medulla descendente, hierasyrinx a gręcis, a nostris sacra fistula vocat, nodis constat, qui spondylia vocantur, costis singulis hoc est legitimis, & nothis respōdentia, his postremis thoracis terminos quidam imponunt hoc est ad ilia. Primus ex. xij. nodis asphalia dicit, post quē maschalister ab axillis dict⁹, reliqui a lateribus pleuritæ, duodecimus a præcinctu diazoster, a quo zoster ignis sacri

genus medium hominem ambiens teste Plinio dicitur.

Post hos quinque sunt ex opposito renū ad coxas porrecti, teretes, firmiores, breuesque ab utroque latere, processus duos exigunt. spinę extantia ob canū similitudinem cynolopha dicuntur, lumbos muscoli replent pso-

hę siue vlpes a Cleantho dicti. Omnes vertebrę exceptis tribus summis a superiore parte in ipsis processibus parum decidentis sinus habent, ab inferiore alios deorsum versus processus exigunt spectantes, inferiores insinuantur, ac per sinus quos utrinque habent, superiores accipiunt, multis nervis multaque cartilagine con-

tinent, ut vno flexu modico homo ad necessaria opera inclinetur. ab his imę spinę ossa os sacrum constituunt.

ita Paulus egineta vocat in aubus oropygium, cuius vertebrę senę sunt, ceteris minores ac magis compactę,

spondylion appellat, in quod vertebrę superiores desinunt, quę in partu miro naturę opere dimouentur.

Galenus spinę quatuor partes constituit, primam cervicem, metaphrenū, lumbum, & quod os sacrum nominant, a quibusdam vero latum. Collum ex septenis vertebris, metaphrenū ex duodenis, lūbus ex quinis, os sacrum ex reliquis constituitur. in summa igitur vertebrę tricenę sunt, ex quibus singulis per utrinque constituta foramina totidem syzygię, & vna addita oriuntur, quę corpus succingunt, motus & sensus prestant.

¶ De medulla vulnerata & spina luxata

CAP. XXV.



Si percussa medulla est, nervi resolvuntur aut distendunt, sensusque alicuius membri intermoritur, aut alterum crus aliqua iniuria debilitatur, vel sine voluntate semen vel excrementa profluunt. idē euenit quibus spina luxat, quod fieri nō

Anatomices

potest nisi medulla collisa vel nervis diruptis. Si supra septum vertebræ exciderunt, manus resolvuntur, vomitus sequitur, difficulter spiritus movetur. at si sub septo id acciderit, crura resolvuntur, urina supprimitur, vel si ne voluntate distillat. Comemorat Galenus se egrum liberasse, cui ceteri medici medicamenta digitis imposuerant, qui ex ictu spine resoluti fuerant, ipse vero idem medicamentum vertebræ addidit.

De scoptulis optis, & humero CAP. XXVI.



Ceruice rursus duo lata ossa utrinque ad scapulas tendunt, nostri scoptula aperta, omoplatas græci nominant. ea in summis verticibus sinuata, ab his triangula paulatimque latelescunt ad spinam tendunt, & quo latiora quoque partes sunt hoc hebetiora, atque ipsa quoque imo cartilaginosa posteriore parte veluti innatant, quoniam nisi in summo nulli ossi inherescunt, ibi vero validis musculis nervisque constricta sunt, at a summa costa paulo interiorius, quam ubi ea media est, os excrescit, ibi quidem tenue, procedens vero quo propius lato scapularum ossi fit, eo plenius, latiusque & paulatim in exteriora curvetur, quod propius altera verticis parte modice intumescens sustinet iugulum, quod lunatum & recurvum esse diximus, altero capite in eo quod posui, altero in exiguo sinu pectoralis ossium structuræ insidit, & cum lato osse scapularum infra caput, eius nervis & cartilagini connectitur. Hinc humerus incipit, extremis utrinque capitibus tumidus, mollis, sine medulla, cartilaginossus, medi⁹ teres, durus, medullosus, leniter gibbus, & in priorem, & exteriorem partem. prior autem pars est quæ a pectore, posterior quæ a scapulis, interior quæ ad latus tendit, exterior quæ ab eo recedit, quod ad omnes articulos pertinere

in vlteriorib⁹ patebit. superius autē hūerī caput rotū-
di⁹ q̄ cētera ossa de q̄b⁹ adhuc dixim⁹. verticulis sca-
pularū ossib⁹ inserit, ac maiore parte ex trāsitu neruis
quos cōiunctiones vocamus, deligatur. at inferius du-
os processus habet, inter quos qui mediū est, magis
etiam extremis partibus sinuatur. Quę res sedem bra-
chio (de osse enim dicim⁹) p̄stat. Humerus a sede sua,
hoc est, ab omocotyle, modo ī ptē priorē, mō in alam
excidit, si in hāc partē delapsus est prāter reliqua signa
longius altero id brachiū est, si in priorē partē summū
quidē brachiū extēditur, minus tanq̄ naturaliter, dif-
ficiliusq̄ in priorē partē q̄ in posteriorē cubit⁹ porrigi-
tur. Curatiōes ad huiusmodi mēbra luxata, non sunt
ad prēsens negocium pertinentes.

De brachio

CAP. XXVII.

Brachium humerum excipit, ī vtrūq̄ flexus
ipse Ancon dicitur. Id constat ex ossibus du-
obus. Radius quem cercida grēci vocant, su-
perior breuiorq̄, & primo tenuior rotundo
et leuiter cauo capite exiguum humerī tuberculū reci-
pit, atq̄ ibi neruis & cartilagine continetur. Cubitus
inferior longiorq̄, & primo plenior in summo capite
duobus quasi verticibus extantibus in sinu humerī,
quem inter duos processus eius esse proposui, se inse-
rit, primo vero duobus radijs brachij ossa iuncta pau-
latim dirimuntur, rursusq̄ ad manum coeunt, modo
crassitudinis mutato, si quidem vbi radius plenior, cu-
bitus admodum tenuis est. Dein radius in caput char-
tilaginosū cōsurgēs, in verticē eius sinuatur. Cubitus
rotūdus in extremo, parte altera paululū p̄cedit. Ani-
maduertit Celsus quē de ossiū ratiōe seq̄mur pluria os-
sa in cartilaginē desinere, sicut de costis dixim⁹, nullū

Anatomices

vero articulū non ita finiri. Si vero cubitus excidit, maioris negocii est q̄ humerus. In hoc ossa coeunt, humerus, radius & cubitus. sed cubitus qui inexus humero est, ab hoc excidit, radius qui adiunctus est, interdū trahitur, interdū subsistit. in omnes vero quatuor partes excidere cubitus potest, si in priorē prolapsus est, extensum brachiū est, neq; curuatur, si in posteriorē, brachium curuū est neq; extenditur, breuiusq; altero est, interdum febrē, vomitumq; bilis mouet, si in exteriorē, interiorēve brachium porrectū est, sed paulum in eā partē a qua oportet recessit recuruatū, quicquid incidit, reponēdi ratio vna est, quę perdifficilis tū a posterioribus tū a priscis medicis omnino habetur.

¶ De manu & eius prolapsu CAP. XXVIII.

IN manu vero palmę pars ex multis minutisq; ossibus constat, quorū numerus apud priscos incertus est, posteriores vero. xxvi. ossa colligunt, xij. in manu, in digitorum articulis. xiiij. sed obligata omnia et triagula structura quadā inter se cōnectuntur, cum inuicē superior alterius angulus, alterius planicies sit. Eoq; sit ex his vnus ossis paulū in interiora concaui species, verum ex manu duo exigui processus in sinu radij cōiiciuntur, tū ex altera parte recta quinq; ossa ad digitos tendētia, palmā explent, a quibus digiti ipsi oriūtur, qui ex ossibus ternis, præter pollicem constāt, omniumq; eadem ratio est. interiorius os in verticem sinuatur, recipitq; exterioris exiguum tuberculū, neruiq; ea continent, a quibus orti vngues indurescunt, ideoq; non ossi sed carni magis suis radicibus inhærent. At superiores partes sic ordinatę sunt. Manus quoq; in omnes partes quatuor prolabitur, in posteriorem, cuius rei nota est, quod porrigi di-

giti non possunt, si in priorem partem excidit, non inclinantur, sed in alterutrū latus manus in contrariū, aut ad pollicem, aut ad minimū digitum conuertitur.

In palma quoq; ossa excidunt in priorem aut posteriorem dūtaxat partē, in reliquas partes non possunt, hoc signo, quod cōmune est, deprehenditur, tumor ab ea parte in quā os est compulsus, sinusq; ab ea a qua recessit, digitis totidem casus eueniunt. eadē signa inueniuntur quę in manibus diximus.

De ossibus inferioribus

CAP. XXIX.



Rura brachijs respondēt, coxis omototyle, humeris fœmora, ancon genu siue olecranū, Crura siue tibię brachiis, radius radio, flexibus poplites, maleolus & calx peculiararia pedi sunt, digiti digitis respōdent, et plantę volę, vngues vnguibus similes sunt.

De coxa & pectine

CAP. XXX.



Ma spina in coxarū desidit osse, quod transuersum longeq; valētissimū, vuluā, vesicam, rectumq; intestinū tuetur, idq; ab exteriori parte gibbū, ad spinā resupinatū, a lateribus id est in ipsis coxis sinus rotundos habet a quibus oritur os quod pectinem vocant, solīdum, idq; super intestina sub pube transuersum vētrem format, rectius in viris, recuruatū magis in exteriora in fœminis, ne partum prohibeat, quod os sacrū falso appellāt, id enīxu mediū sponte diuidit, laxariq; diuinius quosdā credidisse vīdeo, alioqui vel magnis ictibus non frāgi. Sed naturę vis ea aliter conspīcitur. sub partu enim ima spina quam os sacrū appellauimus, ac pecten, quo tēpore foetus amplior est, sponte hiant, & ad foeturā consentiunt. Ea tū a partu paulatim in naturā suam rede-

Anatomices

unt, altero ex ijs vel pluribus renitētibus difficīles partus fieri, & si cētera tuto respondeant. Qui os pectinis diuisum senferit, in partu nō constat. Aristoteles cum mulieres (inquit) parturiūt, dolores, multas quidem in partes incumbūt, & plurimis ad alterutrū fœmur, alię lumbos dolent, alię imum ventrem.

De fœmine & eius prolapsu CAP. XXXI.

Fœmen inter ossa maxima rotūdiora habet capita q̄ humerus, infra vero duos processus a priore & a posteriore parte habet, in medio durum ac medullosum, & ab exteriorē parte gibbū, ab interiorē leuiter cauū est, rursus in inferiorē parte in genu intumescit, superiora in sinus coxæ, sicut humerus in ea ossa quæ scapularum sunt, coniicitur, tum introrsus leuiter intendit, quo æqualius superiora membra sustineat. Sinus coxæ a græcis Cotylæ a nostris acetabula dicuntur, quæ hos sinus complent, circa quæ versuræ fiunt, coxendices vocantur, a græcis ischiæ, a quibus ischiadici dicti sunt qui coxendice laborant. Nam & neruus quo coxēdix acetabulo committitur, ischion quoq; dicitur. Ossium itaq; similitudo similes quoq; casus facit, nam humerus fœmori similis, hoc in omnes quatuor partes excidit, sæpiissime in interiorē partem promouetur, tum crus est longius altero & vastius, extraq; pes vltimus spectāt si exteriorē breuius intusq; inclinatur calx ingressu terram non contingit, sed planta ima meliusq; id crus superiora membra q̄ in priore casu fert, minusq; baculo eget. At si in priorē crus extensum est, implicariq; nō potest, alteri cruri ad calcem par est, sed ima planta min⁹ in priorem partem inclinatur. Dolorq; in hoc casu præcipuus est, & maxime vrina supprimitur, vbi cū

dolore inflāmatio q̄euit cōmode ingrediūtur, sed si in
posteriorē plapsū est, extēdi crus nō potest, breuiusq̄
est. vbi cōstitit, calx quoq̄ terrā nō cōtingit, magnūq̄
fœmori piculū est ne vel difficulter reponat̄, vel repo-
sitū rursus excidat, qđ in dies videri potest reponētū
errore. Hęc enī chirurgīces medicinę pars a nōstra iā
medicia discessit, & ad mercenarios, fabros, rusticosq̄
se se transtulit, ob id fœmur luxatū sēp excidere arbi-
tratur, nec finē medēdi iueniri, magnā Hippocratis no-
stri iniuria, qui ex toto luxata fœmora restituisse pro-
ditur, alioqui ab his ad extendendū, reponendumq̄
fœmur varia machinamēta frustra inuēta fuisse cōstat

¶ De cruribus & patella. CAP. XXXII.

Fœmorum inferiora capita medio insinuant̄
quo facilius excipi a cruribus possint. horum
compagem os paruum, molle, chartilagino-
sum, rotudum tegit, patellam vocāt. hęc superinatat,
nec vlli ossi inheret, sed carne & neruis deligata, pau-
loq̄ magis ad fœmoris os tendens inter omnes crurū
flexus iuncturam tuetur. ipsum autem crus ex ossibus
duobus, vt leuius firmiusq̄ sit, brachio simile constat:
adeo vt habitus quoq̄ & decor alterius in viuētibus
ex altero cognoscatur. nā & quibus exigui sunt, hi ma-
nus quoq̄ paruas habent. verū alterū os ab exteriorē
parte supra positū est, quod radius quoq̄ appellatur.
Id breui⁹ supraq̄ tenuius ad ipsos maleolos intume-
scit. suram hęc quidā vocant. Alterū e priore parte po-
situm, cui tibię nomē est, lōgius & in superiore pte ple-
nius solū cū fœmoris inferiore parte cōmittitur, sicut
cum humero cubitus, atq̄ ea quoq̄ ossa infra supraq̄
cōiuncta, media, vt in brachio dehiscāt. In genu cōmis-
sura dextra, leuaq̄ a priore pte gemina quādā bucca-

Anatomices

rum inanitas, quę perfossa ceu vinculis solutis spiritus fugit. Genu quoq; in exteriorē, in anteriore, et in posteriore partē excidit, raro vel nunq; in priorem partem prolabitur, quia patella opposita est.

¶ De maleolo siue talo, et ei⁹ plapsu CAP. XXXIII



Rus infra ubi maleoli sunt siue tali, osse transuerso excipitur, quod super os calcis situm est et quadam parte sinuatur, quadam excessus habet, & procedentia ex maleolo recipit, & in sinum nus inseritur. Idq; sine medulla durū, magisq; in posteriore partem proiectum, teretem ibi figurā representat. Talus quem astragalum vocāt, qui in homine (Aristotelis sentētia) nō est, in omnes partes prolabitur, ubi in interiorem partē prorumpit, pedis tum planta in exteriorē partem conuertitur, ubi huic cōtrarius talus, contrarium inde signū ostenditur, si in priorem partem erumpit, a posteriore tum latus nervus durusq; fit, si in posteriore, calx pene conditur. plaga maior fit, reposito talo periculum est parum confirmatis nervis, ne rursus excidat.

¶ De calce & digitis. CAP. XXXIII.



Ub eo osse calx situs est, crassior, quadrangulari figura. Planus terram calcat, callosa materia subest nō nervosa, sed sine sensu, infantibus tamen nō cōfirmato callo dolet. Mōtē pedis tria ossa habere tātum constat, pręter quod grādineum dicitur. Imam plantā explent quina ossa. Digiti, xiiij, ossiculis constant. in summa pes, xxiiij, ossa cōtinet. Plantę ossa iisdem modis quibus in manu prodeunt. digiti quoq; eandem rōnem habēt. Hippocrates in humeris fœmoribusq; metū mortis esse tradidit. Periculosa etiā crura sūt & cubiti, nichilq; tuti⁹ reponi

potest q̄ planta, manus, & digiti, in quibus (vt quidā volunt) ossicula quēdā sunt inter articulos sita, quæ sesamoides vocant, ab antiquis prætermissa, quæ in anatomicis quoq; nostris nō inuenta sunt.

De laude dissectionis cap. postremū. CAP. XXXV.

Sed iam finem faciam dissectioni, dimittēdū tandem theatrū est, quoniam partes omnes humani corporis vtiliter magis q̄ verbose tractatæ sunt, atq; historiam ipsam breuiario quodam percurrisse nō fuerit alienum. Hortor omnes tum tyrones tum veteranos medicos, vel chirurgos, ad frequēs huiusmodi theatrum quod singulis saltem annis celebrandum sit. quoniā in eo vera videmus, aperta contemplamur, vt opera naturæ tanq̄ viuētia nostris subiaceant oculis, alioqui scriptura est picturę persimilis, quę sepe recordationis negligentia excitat, & animi caliginem discutit. sed qui litterarū confisi dūtaxat monumentis (vt inquit Plato) sine rerū conspectione res ipsas animo nō reuoluunt expressas, sepe falluntur. et opinionem potius q̄ veritatem mētibus tradunt. sicut nouiter nauigare incipientibus in depictis chartis contingit, in quibus insulæ, sinus, recessus, promontoria, veris quę oculis subiacent ad plenum non respōdent. Sed huiusmodi picturę res pridem notas commemorant, & viuētiū velut simulachra referunt. Scientis enim sermonem viuētē dicimus & animatū, & orationem eius scriptam, nō iniuria, imaginem quandam nuncupabimus. **F I N I S.**

¶ Rerum nomina per alphabetum inuentu facilia nō sine ratione prætexuimus.

l.i.	Anthropos	c.ii.	Astragalus	c.xxxiii.
	Acromphalon	c.iiij.	Biuertices	c.iiij.
	Auerfa manus	c.iii.	Bregma	c.iiij.
	Adenes	c.iiii.	Buccæ	c.iiij.
	Adeps	c.xii.	l.ii. Bubonocēlē	c.v.
l.ii.	Abdomen	c.iiii	Bilis folliculus	c.xv.
	Aluus	c.vi.	l.iii. Bronchos	c.xviii.
	Apocritica vis	c.x.	Biualuion	c.xv.
	Alcœotica	c.x.	Bronchocælæ.	c.xvii.
	Arquat ⁹ morb ⁹	c.xv.	Balbi	c.xxi.
	Aschites	c.iiii.	Blesi	c.xxi.
	Acetabula	c.xxiii.	l.iiij. Basis	c.xi.
	Anus	c.xxvi.	l.i. Chenicia	c.ii
l.iiij.	Asthma	c.ix.	Chondrus	c.iiij.
	Ambidester	c.xii.	Cinctus	c.iiij.
	Angina	c.xix.	Cœneona	c.iiij.
	Antiades	c.xix.	Cynolopha	c.v.
	Antipi	c.xxi.	Codyli	c.iiij.
l.iiij.	Attoniti	c.x.	Coxa	c.iiij.
	Affertiones	c.xii.	Chartilago	c.vij.
	Albugo	c.xxxi.	Crasia	c.iiij.
	Arachnoides	c.xxxii.	Cutis	c.xiiij.
	āphiblestroides	c.vt.s.	l.ii. Crenæ	c.x.
	Alula	c.xxxviii.	Colon	c.vii.
l.v.	Ahorta vena	c.iii.	Catocœlia	c.viiij.
	Apostemata	c.iiij.	Cecū intestinum	c.vii.
	Axis	c.xxiiij.	Cathectica vis	c.x.
	Atlas	c.vt.s.	Choledochus	c.xv.
	Atlantion	c.vt.s.	Coles	c.xix.
	Asphalia	c.xxiiij.	Cremafteres	c.xx.
	Ancon	c.xxvii.	Cletoris	c.xxiiij.
	Acetabula	c.xxxi.	Ceruix vuluæ	c.xxiiij.

Canalis vuluę	c.xxiiij		carcinomata	c.xxxix.
Cotyledones	c.vt.s.	l.v.	cephalica	c.iiij.
corona	c.xxvi.		chordæ	c.xiiij
condylomata	c.vt.s.		compages	c.xv
l.iii. Cinctus	c.iii.		cervicis vertebrę	c.xxiiij
colostratio	c.iiij.		cynolopha	c.xxiiij
Costæ nothę	c.v.		cercis	c.xxvii
cordis stragulū	c.vii.		cotyle	c.xxxi
cardiacus	c.x.		coxendices	c.vt.s.
cathelctica vis	c.xvii.	l.i.	Distentiones	c.x
Columella	c.xix.	l.ii.	Didymi	c.xix.
coelum	c.xx.	l.iii.	Diaphragma	c.iii
cranteras	c.xxij		Disseptum	c.vii
cutis rutila	c.xxiii.		Dispensatrix	c.xvii
cōstricta lingua	c.xxi.	l.iiii.	Distentiones	c.ix
l.iiii. Caput	c.iii.		Delirantes	c.x.
caluaria	c.v.		Diuinus oculus	c.xxv
Caput caninum	c.vii.	l.v.	Diaστοles	c.ii
custos cerebri	c.ix		Diazoster	c.xxiiij
comitaliter	c.x.	l.i.	Eqmētū capillorū	c.iii
conchos	c.xxv.		Eon	c.iii
cassij oculi	c.xxvi		Ethmus	c.iii
cerulei	c.xxv.		Epigastriion	c.iii
caprini	c.xxviii.		Edarion	c.xx
cornea	c.xxx		Eugion	c.xxiiij
candidū oculi	xxxi.	l.iii.	Aequimanus	c.xii
charoides	c.vt.s.		Epiglottis	c.xvii
ceratoides	c.xxxii		Effrenis	c.xxi
chrystalloides	c.xxxvi	l.iiii.	Epicranis	c.ix
corybantia	c.vt.s.		Aematoides	c.xxxi
cochliæ	xxxviii		Epinyctides	c.xxxiiij
cypseles	c.vts.		Epylopæ	c.vt.s.

	Epiphore	c.vt.s.		Hymen	c.iiii.
	Ethmus	c.xxxix.	l.ii	Hydrops	c.iiii.
l.v.	Emprosthotonō	c.xvi.		Hira	c.viii.
	Epistropheos	c.xxiii.		Hilla	c.viii
l.i.	Fibræ	c.ix.		Hernia	c.xx.
	Ferruminari	c.xii.		hostiū matricis	c.xxiiii
l.ii.	Frenum	c.xxi.		Hemorrhoides	c.xxv
	Fungi sedis	c.xxvi.	l.iii.	Hyoïdes	c.xix
l.iii.	Fistula cibalis	c.xvii.	l.iiii.	Hemisphæria	c.vii
l.iiii.	Fulvi oculi	c.xxviii.		Heterocrania	c.ix
	Funda	c.xxxi.		Hipopia	c.xxv
l.v.	Filamentum	c.iii.		Hematoides	c.xxx
	Fibræ	c.xiii.		Hyaloides	c.xxxv
	Fœmina	c.xxxi.		Hypochîsis	c.xxxvii
	Fœmora	c.iii.	l.v.	humerari ⁹ neru ⁹	c.xiiii
l.i.	Genæ	c.iii.		Hemiplexia	c.xv
	Globulus	c.iii.		Hierasyrinx	c.xxiiii
	Gibber	c.iii.		Humerus	c.xxv
l.ii.	Glans	c.xxi	l.i.	Interseptū nariū	c.iii
l.iii.	Guttur	c.x.		Iugulus	c.iii
	Gula	c.viii.		Ilia	c.iii
	Gurgulio	c.viii.		Ir	c.iii
	Glandulæ	c.xix.		Infamis digitus	c.iii
	Genuini dētes	c.xxii.		Internodia	c.iii
	Gelasini	c.vt.s.		Instrumentarię ptes	c.v
l.iiii.	Glaucmata	c.xxxiiii.	l.ii.	Ileon	c.viii
	Glauci oculi	c.xxviii.		Ilia	c.viii
	Gossipium	c.xxxvii.		Iliacus	c.viii
l.v.	Grādineū os	c.xxxiiii.		Ieiunum	c.viii
l.i.	Hypochōdrion	c.iii.		Iecoris fibræ	c.xiii
	Hypothēnar	c.iii.		Iecoris portæ	c.xiiii
	Hypogastrion	c.iii.		Ictericus	c.xv

	Indecorum	c.xx.		Macrobij	c.iii.
l.iii.	Iugulus	c.v.		Mesophrion	c.iii.
	Isophagus	c.vi.		Myrtax	c.iii.
l.iiii.	Ilamis,	c.ix.		Malū punicū	c.iii.
	Imagines	c.x.		Metaphrenū	c.iii.
	Iugulares ve.	c.xxiii.		Mensa	c.iii.
	Iugale os	c.xxiiii.		Medius digit⁹	c.iii.
	Iris	c.xxviii.		Medic⁹ digitus	c.iii.
	Interseptum	c.xxxix.		Morb⁹ gallicus	c.vi.
	Isthmoides	c.vt.s		Musculi	c.x.
l.v.	Ines	c.iii.	l.ii.	Medium	c.viii.
	Ischiæ	c.xxxi.		Messenterion	c.viii.
	Ischiadicus	c.vt.s.		Medianum	c.viii.
	Ischion	c.vt.s.		Messētericę venę	c.ix.
l.i.	Lardum	c.xii.		Morb⁹ regius	c.xv.
	Lagon	c.iii.		Morb⁹ gallic⁹	c.xxi.
l.ii.	Longanon	c.vi.		Matrix	c.xxiii.
	Lipothymia	c.vii.		Mariscæ	c.xxvi.
	Lactes	c.viii.	l.iii.	Mēbrana pleure.	c.vi.
	Lienosus	c.xii.		Mistra ciborū	c.xvii.
	Loci.	c.xxiii.		Mala	c.xix
l.iii.	Lingua minor	c.xix.	l.iiii.	Mydriasis	c.xxxiii.
l.iiii.	Labdoïdes	c.viii.		medici ocularij	.xxxvii.
	Lymphatici	c.x.		Menix	c.xxxviii.
	Lethargicus	c.xi.		Mentum	c.xl.
	Lusciolitas	c.xxvi.	l.v.	Musculorū nūs	c.xxii.
	Lobus	c.xxxviii.		Mascalister	c.xxiii.
	Lacus	c.xxxix.		Metaphrenū	c.xxiii.
	Lenticularis	c.xxxi.		Maleolus	c.xxxii.
	Longū cerebrū	c.ix.		Mons pedis	c.xxxiii.
l.v.	Lumbus	c.17. c.xxiii.	l.ii.	Nephreticus	c.xvi.
l.i.	Modiolus	c.ii.		Nimpha	c.xxiii.
					i.iii.

l.iiii.	Nerui cōuersiui	c.xxi			Os latum	c.vt.s.
	Nerui vocales	c.vt.s.			Omoplatum	c.xxvi
	Nyctalopæ	c.xxviii			Omocotyle	c.vt.s.
l.v.	Nexus	c.xiiii	l.i.		Pollex	c.ii
	Neruus latus	c.vt.s.			Paropiæ	c.iii
l.i.	Osphys	c.iii			Pterygia	c.iii
	Olecranium	c.iii			Phenæ	c.iii
	Opisthenar	c.iii			Procarpion	c.iii
	Omeomeriæ	c.v			Poplites	c.iii
	Organica pars	c.v			Perna	c.iii
	Officialis pars	c.v			Perniones	c.iii
	Ossium numerus	c.vi			Pingue	c.xii
l.ii.	Omentum	c.v	l.ii.		Peritoneon	c.iii
	Os stomachi	c.x			Paracentesis	c.iii
	Oscheum	c.xx			Pyloron	c.viii
	Osgenitale	c.xxiiii			Paterfamilias	c.x
l.iii.	Otis	c.xvi			Pancreon	c.xi
	Ofcedo	c.xxiii.			Parastatae	c.xvii
l.iiii.	Occipitium	c.xi			Præpucium	c.xxi
	Optici nerui	c.xiiii			Penis	c.xvii
	Oculi conditi	c.xxvii.	l.iii.		Præcordia	c.vi
	Oculi emissitij	c.vt.s.			Phrenes	c.iii
	Oculi ruffi	c.xxviii			Phreneticus	c.iii
	Oculi blandi	c.xxxvi			Pilare malum	c.iii
	Oculi torui	c.vt.s.	l.iiii.		Pleureticus	c.v
	Oculi truces	c.vt.s.			Pharyx	c.viii
	Ozena	c.xxxix			Phthisis	c.ix
l.v.	Oppillatio	c.iiii			Peripneumonia	c.ix
	Opisthotonum	c.xvi			Phœnicopteros	c.xvii
	Odos	c.xxiii			Paristhmia	c.xix
	Os sacrum	c.xxiiii			Pituïta	c.xiii
	Oropygium	c.vt.s.			Pili congeniti	c.iii

Pili postgeniti	c.iii	Stropheos	c.iii
Phantasmata	c.xi	Scapulæ	c.iii
Paracephalis	c.xi.	Sedes	c.iii
Parotides	c.xxiii	Scytalis	c.iii
palpebrę	c.xv	Sphyron	c.iii
peti oculi	c.xxviii	Stamen	c.iii
phacoides	c.xxxi	Seuum	c.xii
pupilla	c.vts. l.ii.	Sumen	c.iii
pterygia	c.xxxiiii	Sedis p̄cidētia	c.xxvi
procidentia	c.vts.	Sedes cōuersa	c.xxvi
polypus	c.xxxix	Stomachus	c.x.
probole	c.xl	Stamineū filamētū x.	
l.v. poroides	c.ii	Scortum	c.xx
Platys	c.xiii	Secundæ	c.xxiii
poples	c.xiii l.iii.	Septūtrāsuersum	c.iii
pleuritæ	c.xxiii	Spiritalis fistula	c.viii
psohæ	c.vts.	Stomachus	c.viii
pecten	c.xxx	Scēua	c.xii
patella	c.xxxii	Sophronisteres	c.xxii
l.i. Rhitides	c.iii	l.iii. Spheroïdes	c.vii.
l.ii. Rhoæ	c.iiii.	Sinciput	c.vii
Retentatrix vis	c.iii	Stephanitides	c.vii
Rimula	c.xxi	Spasmus	c.ix
Rhagades	c.xxvi	Spiramenta	c.x
l.iii. Rhoe	c.vi	Species	c.x
Reminiscentia	c.xi	Spec̄tra	c.x
l.iiii. Reticularis	c.xxxii	Syzygia	c.xiii
Rhagoïdes	c.xxxi	Sphagitides	c.xxi
Rhogoides	c.vts.	Sclerotica	c.xxxi
Reticularis	c.xxxii	Suffusiones	c.vts.
l.v. Radius	c.xxvii	Scaphi	c.xxxviii
l.i. Sinciput	c.iiii	Strumæ	c.xxxix

l.v.	Sistoles	c.ii.	Tibia	c.xxxii.
	Stamen	c.iiij.	l.i. Vetula	c.iiij.
	Stropheon	c.xxiiij.	Vertebra	c.iiij.
	Sacra fistula	c.xxxiiij.	Vilus	c.iiij.
	Spondylia	c.xxiiij.	Venter	c.ii.
	Spondilion	c.xxiiij.	Vmbilicus	c.ij.
	Scoptula opta	c.xxv.	l.ii. Ventrículus	c.x.
	Sura	c.xxxii.	Vretra	c.xvi.
	Sesamoïdes	c.xxxiiij.	Vrine stillicidia	c.xvi.
l.i.	Thorax	c.iiij.	Vreteræ	c.xxii.
	Thenar	c.iii.	l.iiij. Vomica	c.vi.
	Talus	c.iiij.	Vua	c.xix.
l.ii.	Tenasmus	c.vi.	l.iiij. Vertiginosi	c.x.
l.iiij.	Trachia arteria	c.viiij.	l.v. Vitiliginis	c.ii.
	Triualuium	c.xiiij.	Verucæ	c.ij.
	Tymes	c.xvi.	Venifecium	c.iiij.
	Tonsillæ	c.xix.	Vena regalis	c.iiij.
	Temnici dētes	c.xxii.	Vena media	c.v.
l.iiij.	Testa	c.vii.	Vena cōmunis	c.vi.
	Toni	c.xx.	Vena iecoraria	c.vi.
	Thalamæ	c.xxxix.	Vena lienaria	c.vi.
	Torcular	c.xxxix.	Vlipes	c.xxiiij.
l.v.	Tentondes	c.xiiij.	l.iiij. Zigoides	c.xxiiij.
	Tetanium	c.xvi.	l.v. Zoster ignis	c.xxiiij.

CF I N I S.

ALEXANDER BENEDICTVS VERO
NENSIS PHYSICVS MARCO SANVTO
VENETO PATRICIO SENATORI OP-
TIMO.S.P.D.



Vbitauerã semp senator optime in his
medicinę præceptis aliquid edere. quã-
doquidem difficillimũ noueram in tan-
ta rerum vetustate, obscuritate ac rubi-
gine lucem aliquã vel nitore, aut aucto-
ritatem artibus his quę exoluerunt in-
uenire posse. scisq; qua nocte dẽssima hæc latuerint.
Verum enim nobis occurrũt celeberrimĩ veteres au-
ctores. atq; ex posterioribus, Theodorus Gaza, ac
Hermolaus barbarus qui nuper his similia prætenta-
rũt. Tu quoq; patrociniũ tuo, veteriq; beniuolẽtia cũ
auunculo meo Ioanne Iacobo Angelo physico his die-
bus animum ita michi exacuisti, vt medicorũ nostro-
rum magnas ambages, animorumq; varietatem pene
incredibilem excitare nõ dubitauerim, hoc dũtaxat
libello qui immaturus est editus. Eum enim curatiões
quotidianę vsusq; & experientia cõcepere. Nectamen
est in dubio multis hæc nostra fastidio futura. a Gale-
ni enim tẽpore cõplures lingua externa scripserũt, quo-
quidem barbarorum feritas italiã inuasit. Et magis
litterarum decus q̃ vrbium ornamenta sustulit, ex qua
nobilĩ studiorũ strage, medicinę vilitas orta est, incon-
stantissimaq; omnium artium facta. Delere enim ali-
orum instituta vnicuiq; fas erat, atq; aliquide x media
(vt aiunt) barbarie rapere, glorię erat. Nos vero nichil
immutare nichil addere viribus nostris, sed priscam ac
romanam solũmodo dignitatem tueri enitimur. quæ

Alexandri Benedicti

ex foecūda obesitate in his artibus sterili tabe pene cōfecta est. Inuentis itaq; addere inter artium initia maxime decuit. Orpheus enim medentium primus sua placita constituit, quę mox Pythagoras sapientia clarus sustulit, Democritus deinde & Asclepiades eiusdē pręcepta immutarunt. Is ętate magni Pompei rhetori cę quoq; magister erat. Hippocrates itē medicinę princeps (ne nominatim omnia persequi videar) sua medēdi decreta condidit, & prima omnium abdicauit, quę Galenus secutus est. totam fere medicinam ad causarum agnitionem indiciorūq; noticiam, ad rerum qualitates, corporumq; diuersas habitudines atq; gradus reuocando, nichil intentatum inexpertūq; relinquentes, orbem vniuersum ita in sese circumegerunt, vt reliqui omnes inscitia impudenda dānarentur, ac publicam salutem decoquere viderentur si quid sine Hippocratis atq; Galeni auctoritate agere vellēt, quę omnia (vt diximus) turpi barbarorum colluie foedarūt. Inter vtriusq; tempora, & nostri quoq; latino sermone, licet pauci, celebrati sunt, inter quos. M. Cato. C. Valgius Pompeius. Leneus Cornelius ac Plinius operatricem ac empiricem sectantes extitere infelicibus medicinę artis auspicijs, quandoquidem huius theoriā prętermisit romana grauitas, alioquin in ceteris virtutib⁹ omnium gentium rapacissima. Desierunt paulo ante & bellorum ruinis apud gręcos medici, quorum iniuria in externarum gentium laudes cessit. Hinc Auicennę & Rasis aliorumq; auctorum volumina in tanta rerum inopia recepta sunt. Hinc attonitę quorundam persuasiones preciosa externa & aliena duntaxat estimantium, quę item in latinum male vertendo recentis-

ores romanam atq; græcam dignitatem relinquentes confusis rerum nominibus ad ineptias redegere. Sunt et ipsi exemplaribus græca latinaq; nomina originem artis indicantia, quod in anatomicis & venenatorū libris, ac ijs quos de omnibus morbis membratim humanum corpus grassantibus scripsim⁹, cōmunibusq; medendi p̄ceptis, satis liquido indicauimus. Tu igitur senator magnifice has medicinę collectiones (quos græci aphorismos vocare maluerūt) in rerū nostrarum leuem pergustationem suscipe, quæ de facili doctrina tua, ac auctoritate (si volueris) malivolorum ictus sustinere poterunt. Vale Venetijs.

Anatho-
mice.

De vene-
natis.

De oībus
morbis

De cōib⁹
medendi
p̄ceptis.

¶ Collectiones medicinę.

¶ ALEXANDRI BENEDICTI PHYSICI DE MEDICI ATQVE AEGRI OFFICIO COLLECTIONVM CAPVT PRIMVM.



Oni primū medici est, p̄ter ea quę religioni necessaria sunt, nō multos egros suscipere. Varijs enim morbis & mēs op̄imitur & corpus fatigatione continua languet.

Prudentis medici est insanabiles ac desperatos morbos non curare, ne hominem occidisse qui sorte sua interiturus erat existimetur.

- 3 Dubias valitudines, sine certa tñ desperatiōe, suscipias, necessarijs tñ indicare oportet rē in difficili esse, alioquin vel artem malo vinci, vel te errasse indicio sit.
- 4 Sati⁹ est tamen omnibus in rebus anceps auxilium experiri q̄ nullum, plurimorum sententia.

Alexandri Benedicti

- Vehementi malo, vehemēti omnino auxilio opus est. 5
Succurrendum semper parti maxime laboranti. 6
Cauendum est in secunda valitudine, ne aduerse au- 7
xilia consumantur.
Occursurus morbo nullus est qui originem ignorat. 8
Histrionis est exigui momenti morbum attollere, quo 9
plus exinde prestitisse videatur.
Morbus quandoq; qui per se exiguus est, maior, curā 10
tis negligentia fieri solet.
Non omnibus eadē remedia conueniunt, acciditq; vt 11
quos ratio nō restituit, temeritas quādoq; adiuuet.
Medici officium est, vt tute, vt celeriter, vt iucunde cu 12
ret, verum periculosa esse constat nimiam festinati-
onem & voluptatem.
Peregrina remedia semper querere, & preciosa dum- 13
taxat, impudentis est ostentationis
Cathartici vtivenenatis periculosum est, vnde ad te- 14
stamentorum insidias sepe oboritur occasio, in qua
re et officinarum fides necessaria est.
Aegrotantis proprietates nosse oportet, cuiq; amica, 15
queve inimica sint intelligere.
Remedia naturæ munera non ostendere, & in arca- 16
nis habere non decet, perfidię atq; avaricię crimine
manifesto
Alienam miseriam pudoris sociam indicare nefas est, 17
Magni medici se quandoq; errasse simplicius confiten 18
tur, ne q; eodē errore quo illi decepti sunt decipiātur
Cetera pręsidia superat egri gaudium, atq; animi se- 19
curitas, & si in pudore medicina quādoq; inueniat
Aeger obsequēs esse debet domesticis, medicoq; prę- 20
cipue qui falli nullo modo debet, occulta enim intē-
perantia soli egro periculum imminere certum est.

- 21 Nec cuius p̄sidiū p̄fitēti, valitudinis desiderio statim credat, solis medicis occidēdi impunitate relicta.
- 22 Carnificis est pendētibus fatis, et inter ipsos cruciatus ingēs precium exposcere, vel morbum protrahere, vel dūtaxat emouere, vbi extrahere oīo opus est.
- 23 Barbari bene merentibus gratiā nō referunt, & valitū dīne conflictātes multa promittūt, ad vitā exinde reuocatī conuicijs in vicem prosequuntur.
- 24 Famosi veneni vires, aut abortiendī modum, vel quæ conceptum inhibeant indicare scelus est.
- 25 Dubiē valitudinī assidere medic⁹ debet, & venarū pulsu vires sc̄pe p̄quirere, cæterasq; notas inspicere, qui & syderalis scientiæ haud ignarus sit necesse est.
- 26 Ergo quę bona sunt auguria denunciare debet, si quid tamen mali minatur infirmitas, necessarijs tantum significare fas sit.
- 27 Simplicium effectus tenere summa cura debet ex quibus cōposita & nobilitatis & plebis auxilia, inuentu etiam facilia habentur.
- 28 Periti medici, manū non p̄tinus vt veniūt apprehendūt, sed primū hilari vultu residēt, sermone leni sollicitudinē submouēt, nam & medici conspectus, ac alia multa de facili venarum rationem turbant.
- 29 A recta ratiōe nunq̄ discedendū est, & si nichil prodesse videatur, sic ab inceptis pariter peruersis statim, etsi nichil obfuisse cernātur.
- 30 Varijs auxilijs morbus expugnādus est, alioquin consuetudo naturam facit.
- 31 Prodest deniq; ægro in medendo spes fidesq;.



Collectionum

CAP. II.

1

Orborū cōtrarię q̄litates cōtrarijs expellūt.

2

Intemperantem morbi qualitatem vehes

k.iii,

Alexandri Benedicti

- mētī, & mediocrē mediocri auxiliō curare debem⁹
Vehementiora medicamēta, membrīs remotioribus 3
conueniunt.
Superiora intestina superne, inferiora iniecto clystere 4
commode sanantur.
Validissima causa est, quæ morbū habitudinī corporis 5
contrarium excitat.
Vbi natura repugnat, parum medicīna prodest. 6
In acutis morbis egre proficitur, nam & profect⁹ om 7
nis tempore expletur.
Ex multa fame nimia facietas, aut ex multa facietate 8
fames damnatur.
Ex nimio quoq; labore subitum ocium, aut ex nimio 9
ocio subitus labor sine periculo non est.
Cum quis mutare aliquid volet, paulatim assuescere 10
Ex itinere fatigatis, vel labore sudantib⁹, (debet. 11
aut a balneo veniētibus, frigidi potus pñiciosissimi
Extēpestatibus pessime sunt, quæ variant ma (sunt. 12
xime. obiter autumnus plurimos opprimit.
Corpora g̃state relaxata subito frigore excipiūtur. 13
Senectutē lōgiores morbi exercēt, acutis adolescentia 14
Siquis plenior, speciosiorq; ac colora- (implicatur. 15
tior supra consuetudinem factus est, sine suspitione
esse nō debet, quandoquidem neq; in eodem habi-
tu subsistere, neq; ultra progredi potest, fere igitur
ruina quadam reuoluitur.
In oibus corporis affectibus longior distantia tutio- 16
rem curationem promittit. Si vero materia omnis ef-
fusa est, propinquitā p̃feratur.
Priusq; in diuersum materiam abducas, membri dolo 17
res sedato. Cauendumq; ne ad principalia viscera
eadem superferatur.

- 18 Principalia corporis membra medicamentis de facili leduntur.
- 19 Cerebro ac iecori frigidiora non sine metu imponuntur, quæ & nervos offendunt.
- 20 In periculosis morbis, in quibus virium deliquium timeamus, dilatis auxilijs a vehementiori cathartico incipiendum est, alias leuiori vtendum.
- 21 Locorū transitus ex graui in salubrē utilis est.
- 22 Media hyeme aut æstate aluū trahere, aut secare, aut adurere malum est.
- 23 Maxima in medendo difficultas est, cū causa eiusq; effectus contraria auxilia requirant, vt colicis cruciatibus contingit.
- 24 Senibus tremulis nichil profunt medicamenta.
- 25 Scamonium medicinas omnes exacuit, qđ & stomacho inimicum perhibetur.
- 26 Frigefaciēdi & excalfaciēdi par tēpus est. In illo met⁹, in hoc audacia maior, calidis enī natura gaudet.
- 27 Humeſcandi, atq; exiccādi vires parī metu feruntur, verum hoc velocius euenit.
- 28 Natiua caliditas humido tēperato gaudet.
- 29 Sponte exiccari corpora non mirum est, caleſceri vero naturale non est.
- 30 Vehemētior caliditas mātēriam in lapidē conuertit, si corporis meatus introcluſi ſunt.
- 31 Habitum corporis frigidum caleſceri haud facile est, si iam conſtiterit, si increſcit q̃ facillime.
- 32 Frigida rursus habitudo initio celerius cedit calidis q̃ calida frigidis.
- 33 Calida corpora egre frigefiunt, egrius vero frigidiora calidis vincuntur.

Alexandri Benedicti

Immodica corporis frigiditas, mortis imaginē refert. 34

Immodicus calor siccitatem contrahit, frigus vero humi- 35
ditatem.

Ocium ac balneorum vsus corpus humidum reddit, 36
quod & vinum modice epotum efficit.

¶ Collectionum CAP. III.



Enuioribus magis sanguis, plenioribus vero 1
casso magis abundat

Tenuiores sanguinis detractionē facilius su- 2
stinent, pinguiores leduntur.

Vires corporis magis ex venis q̄ ex ipsa specie digno- 3

Mittere sanguinē vsum habenti expeditis- (scunt. 4
simum est, ignaro vero difficillimum.

Ex oī humore nichil sanguinis dimissione nocētius 5

Arteria incisa neq̄ coit neq̄ sanescit, vt sanguis vehe- 6
menter erumpat efficit.

Ex larga sanguinis detractiōe mali gñant̄ hūiores. 7

Missio sanguinis adeo nō prodest vt etiam interdum 8
maxime noceat.

Eadem si q̄ largissima sit, aluum sepius sistit. 9

Interest nō q̄ etas sit, neq̄ qđ in vtero geratur, sed quę 10
vires sint, imbecillo enī cuiq̄ male sanguis emittitur.

Integra atq̄ exigua sanguinis materia reliquis viciatis 11
humoribus male demitur.

Venisex qui ptius aut timide venā icidit vires tuetur, 12
verū quādoq̄ crassior materia intus retinetur

Qui cōfidētī⁹ latū vulnus infert, serius id sanescit, ve- 13
lociusq̄ aię defectum iducit, verū magis expurgat.

Latior scapellus hyeme, estate acutior esse debet. 14

Supinis vena incidenda est ne anima deficiat. 15

In febre ardenti detractio sanguinis qñq̄ obest 16


In febribus quibus neruorum contractiones accidunt 17

a sanguinis detractiōe abstinendum est, & si necessaria alioquin videatur.

- 18 In periodica febre modicus demitur sanguis, si rigores præsertim vehementissimi sunt.
- 19 Bilis furor atq; pituitę cruditas importunam sanguinis missionem sequitur.
- 20 Certum tēpus nō circūscribit sāguinis dimissio, obiter ruptis, cōuulsis, ex alto delapsis, qui etsi paulo ante cibum sumpserint, protinus demenda materia est.
- 21 Adolescentibus exigū sanguinis mitti conuenit, neq; nulli post longos morbos, aut a crapula.
- 22 Vētriculo aluoq; astricta met⁹ est sāguinē extrahere
- 23 Fastiditis tediū abstergendū est venis ex priusq; venā incidas, ex qua largius pfluuium & si rarum est, quotidiana extractione q̄ modica sit nocentius est.
- 24 Hyememaustro perflante sanguis recte mittitur.
- 25 Tardius sanescit ictus quo quis magis dolet.
- 26 Post sanguinis dimissionē cibo modico vtendum est, in qua vehemēter deligare, et præteritos ictus nō vitari importunum est.
- 27 Obesis deliganda brachia sunt vehemēter, macris la-
- 28 Profluente sanguine raro, suppresso frequēter (xius anima deficit, nisi largius educatur.

¶ Collectionum

CAP. IIII.

1 Vmecta atq; calida corpora alui deiectionē

 haud difficulter ferunt.

2 Aluus cita macris, tenuibus, mēbrisq; mol-
 libus nocet.

3 Biliosis alui deiectio grauis est, ac p̄parce viuētibus.

4 Importuna deiectio neruorū contractionē minatur

5 Pueris senibusq; temerarium est aluum soluere.

6 Hyeme ac æstate egre venter soluitur.

Alexandri benedicti

- Insuetis plurimum obest deiectio. 7
- Materię motus modũ idicat. stomachi nãq; fastidiũ 8
vomitũ suadet, vëtris pũctiones alui ductiõẽ iuitant.
- Membris certi meat⁹ sunt, vesica, iecoris gibbo, cauo 9
intestina respondent.
- Immodica exinanitio q̃ plurimũ malas febres excitat 10
- Ventre a fluxu præmature confirmato ac morbo ali⁹ 11
quo ob id supueniente aluũ cõcitare rursus oportet
- Materia quę vnũs naturę est, in vëtre facillime conti⁹ 12
netur atq; perficitur, quę vero varia sunt vario ven-
tris motu cõtrahuntur.
- Qui recta victus ratione vixerit, nec vomitu nec alui 13
ductiõẽ eget.
- Assumpta sepius medicamenta vbi sanguinis missio 14
necessaria sit, febres faciunt, ob id p̃postero vsi sunt
modo qui a prima purgatione nõ quieuerunt.
- Biliosis, vomitus catharticũq; mox ocium prodest. 15
- Cum bilem ruffam trahimus, & scamonio opus est, 16
qd̃ myrobalanũ dicunt addimus, vt virus auferat.
- Vëtrẽ deicere vbi intestina apostemata sunt, dãnãt 17
- Febre correptis aluus soluta salubrior est vomitu. 18
- In ventris fluore, cũ incocta pfluũt vomitus nocet. 19
- Vëtrẽ aut vomitũ cõcitare, cui corp⁹ integrũ est, verti⁹ 20
gines vëtrĩsq; dolores facit, maleq; materia soluitur
- In vomitu aut alui deiectiõẽ, vno exinanito humore 21
& alio incipiente, corpus recte purgari indicium est
- A purgationibus somnus plenior ægrum magnifice 22
exonerasse ostendit.
- Sitis quoq; vehemētior bene purgati infirmi nota est. 23
- Quę ex narib⁹ medicamiẽ extrahunt hydropises 24
- Torti, hoc est inexplanatę linguę, vehẽ (extenuãt 25
mentiora medicamenta male sustinent.

- 26 Qui catharticis nō assueuere, his vtī non debent, neq; stomacho defecti, q̄busq; humor lent⁹ est ac tenax.
- 27 Si p̄cordia tenta sunt, cathartica assumpta nocent.
- 28 Inflāmatis humoribus oppilatiscq; meatibus, medicamenta non dantur donec corrigantur vicia.
- 29 Qui ex stagno aquam bibunt, quiq; liene non laborant, medicamenta facilius ferunt.
- 30 Añ vētris purgationē sōn⁹ pdest, vires enī intēdit
- 31 Ab imbecilibus catharticis vigilię preferuntur, somno enim medicaminis vis remittitur.
- 32 Epoto medicamento exercitationes male sunt.
- 33 Qui calidę atq; infirmę habitudinis sunt, crudiq; stomacho, ptisana aut rhoiton iis conuenit, mox medicamento tutius vtuntur.
- 34 Cathartica syrio ardēte febres afferunt, a quarum potu comedere aut bibere siue dormire, nisi exacto opere nocet, alias ventrem contrahunt.
- 35 Pillulę cum iis quę eiusdē effectus sunt cogi debent.
- 36 Oris resolutio aluo cita sanatur.
- 37 Duobus vtī catharticis in die temerarium est.
- 38 Longinquior materia difficilius attrahitur.
- 39 Salis plurimus vsus, ante catharticum nocet.
- 40 Senecluti, ac quibus infirma ilia sunt, deiectiones ob sunt, quę interdum aluo cita tentantur.
- 41 Iecoris dolor qui a sanguinis dimissione aut vētris purgationibus accidit, aqua calida pota sanatur.
- 42 Quotidiano medicamentorū potu natura viciatur. obiter qui ijs assueuere q̄citissime piclitari certum est.
- 43 Siccę habitudinis corpora acriori medicamento ledunt.
- 44 Si alu⁹ leui medicamēto nō molliť, q̄es indicāda est
- 45 Vbi sanguinis missio sola mederi potest, medicamentū superaddere malum est, inflāmationes enī facit.

Alexandri Benedicti

Pillule vetustate indurate pessime sunt, nec nimium re- 46
centes laudantur. ¶ Collectionum CAP.V

Gibi potiusque crasse materie damnantur, vias 1
enim corporis intercludunt.

¶ Nichil agrotantibus utilius tempestiva ab- 2
stinencia, que tempore & modo & genere quirit.

Aeger neque superuacua materia onerandus, neque imbe- 3
cillitate perdendus.

Cibus simplex laudatur, sapes & condimenta prius 4

Plurimo cibo indiget qui increscit. (ciosa 5

Qui nimio cibo vtuntur, corpora non augent. 6

Valentissime materie cibus vti debet athlete agricolęque. 7

Valitudo ignota, aut inedia vincit, aut indicatur. 8

Ois curatio contrariis presidiiis curat, verumtamen abstinen- 9
tia victusque ratio sine periculo plerumque sanat.

A fame, cibo plurimo ac malo vti perniciosum est. 10

Quo acutiores morbi sunt, eo minus cibo indigent. 11

Si quis in acuta valitudine linquit animus ab imbecil- 12
litate refecimus, nec largius quidem.

Que genitale semen augment, lactis quoque abundantia 13
am faciunt, que diuerso genituram extinguunt, huius
quoque inhibent copiam.

¶ Collectionum CAP.VI.

In febre ardenti frigidam dari largius veta- 1
mus si stomachus imbecillus est.

Si inter morbi initia materia nimium feruet 2
statim ducenda, alioquin digerenda.

Instantibus quartanis theriaca preclare medetur 3



In quartanis nunquam neruorum contractiones fiunt, in 4
quibus & diaueratrum datur, & in tertianis diasca-
monium, circuitus enim soluunt.

Panis frigida madens febricitantibus appetentiam excitat 5

- 6 In acutis febrib⁹ vehemētes dolores piculū minantur.
- 7 Alba vrina in causode dolorem capitis nunciat.
- 8 Causodem subitus horror resoluit.
- 9 Senectutem ardens febris raro solet offendere, alias perniciosa.
- 10 Ipso accessiōis die nichil prēter vomitū tentādum.
- 11 In febre cib⁹ offerēdus non est, nā quod non integro corpori infertur, de facili corrūpitur. inter omnia tamen tempora inclinante febre minus dānatur.
- 12 Instante morbo satius est q̄ incipiente, omni tamen tēpore defectis subueniendum est.

Collectionum

CAP. VII.

- 1  Apillorum defluuiū quod etate contingit nunq̄ restituitur.
- 2  Seruari non potest cui cerebrū membranęq̄ incisę sunt.
- 3 Percusso cerebro vel membrana, biliosus vomitus insequitur, ac nerui distenduntur.
- 4 Vrina veterinarię silis p̄teritos capitis dolores oñdit.
- 5 Frontis dolore, quod ob similitudinem ouum dicitur, in faciem dormiunt.
- 6 Ventrem mollire, capitis doloribus vtile est.
- 7 Immodicis vigiliis tussis intercedēs mortifera est.
- 8 Oblivio quę sanis sponte prouenit, comitiales morbum, aut lethargiam, aut apoplexiā denunciat.
- 9 Vlcera quę insanientibus accidunt, pestifera sunt.
- 10 Vertiginosis senibus apoplexiā facile imminet.
- 11 Si in comitali morbo mens lesa est, aut neruorum facta resolutio, valitudinī spes non est.
- 12 Morbus comitalis añ pubertatē ortus qñq̄ finitur.
- 13 Apoplexiā pręnunciāt nocturnę suppressiones, quę et morbum comitiales, vel insaniam pręsagiunt.

Alexandri Benedicti

Demētia sepe in comitiale morbum vertitur, aut cōtra.	14
Morbus comitalis frequens, exitialis est, quem ner-	15
uorum contractiones antecedunt	
Melancholicis sanguinem frequenter dimitti, apople-	16
xiam vel similem morbum portendit	
Apoplexię, si febris accidit, ubi abscessus causa nō fue-	17
rit, triduo æger insepult⁹ esse debet, quo decretorio	
quandoq; tempore morbus finitur	
Neruoꝝ vitia tolluntur plurima, si occipitio studes.	18
Ebrietas neruis nocet, & conceptum inhibet	19
Qui colicis sepe laborāt, ij neruoꝝ resolutionē icurrūt	20
Infantium vrina viridis, neruorum contractionem vel	21
resolutionem prædicit	
In vulnere neruorum contractiones exitiales sunt, &	22
quæ ex arefaciente causa oriuntur	
Frigida estate superiniecta membris, frigidam neruoꝝ	23
rum materiam discutit, si vires adsunt	
Cum stupēt crebro membra, exitium denunciant	24
Cum mēbri stupor pseuerat, neruoꝝ vitia prælagit.	25
Timere ex somno mali morbi indicium est	26
Somnus statim a crapula, aurium vicijs nocet	27
Distillationes frigide febre maturant, calide acceduntur.	28
Quib⁹ capitis distillationes fluūt, raro pleuretici fiunt.	29
Austris caput humorem sepe recipit, qui mox aqui	30
lone sine intermissione distillat.	
Sternutamēta partum adiuuant, cōceptū vero expellūt	31
Vbi sternutamenta frustra tentantur, vires corporis	32
inualidæ sunt.	

Collectionum

CAP. VIII.



I cū oculorū vicijs capitis dolores sūt, hi pri⁹
discutiēdi, mox oculorū malis mederi oportet
Nichil oculis coitu nocentius: (tet

I

2

- 3 Crapula nocet oculis, magisq; quia cibo statim dormiunt.
- 4 Supinus somnus, ac vigilię moderate oculis profunt.
- 5 Sanguinis frequēs dimissio, oculorū claritati obest.
- 6 In epiphoris oculorū vel eorū vicijis oibus caput oleo perungere, aut auribus instillare perniciosum est.
- 7 Lippienti medetur deiectio.
- 8 Frequentiores in cibo lactuce claritati oculorū nocēt.
- 9 Surditati veteri difficulter succurritur.
- 10 Surdi quandoq; fiunt vbi biliosus fluxus ventris subsiterit.
- 11 Surditati aurium nichil biliosa aluo utilius.
- 12 Faucium tumoribus, sub lingua vena utiliter secatur.
- 13 Angina in peripneumoniam quandoq; vel in præcordia tendit, ac perimit.
- 14 Qui angine morbo intereūt, ijs pri⁹ nerui cōtrahūtur
- 15 Auriū purulētia importune persanata vertigines oculorum excitātur, redeunte haud dubio tolluntur.

Collectionum

CAP. IX.



Or nullo abscessu afficitur, quod si diu mala habitudine affligatur, nunq̃ sanatur.

Defecti, vino statim recreantur.

- 1 Vinum dilutius pueris, senibus meracius cōuenit.
- 2
- 3
- 4 Crocum, cordis vitalibus medicamentorum vires defert, stecas vero capiti.
- 5 Febres putridę cordis caliditatē et humiditatē arguūt
- 6 Materia quę peripneumoniam aut pleuresim facit, si ad cordis vitalia pertinet, protinus necat.
- 7 Humorū omnium superuacua exinanitio, cordis vires offendit.
- 8 Corde sponte frigefacto aut calefacto arefactove,


Alexandri benedicti

- ptisis certam originem habet. 9
Cor humectum febre putrida sæpe periclitatur. 9
Circa præcordia ortis vlceribus, sanguis ex sinistra na 10
re profluens, mortem subitam prænunciat.
Immodicus cordis tremor, animi prius defectum, 11
mox interitum affert.
In cordis affectibus auferre causam, ac quæ hylarita 12
tem custodiunt addere oportet.
Odorata oïa cordi cõueniunt, fediq; odoris locorũ cru 13
ciatibus.
Animi defectio, si pseuerat, insanabilis est. 14
Cõcitæ vomitiões, animæ extinctæ speciẽ reuocant, nisi 15
sudore deliquit, in quo casu etiã extremorũ ligaturæ
Asthma senibus difficilior est. (obsunt 16
In laterum doloribus, si materia in .xiiii. diebus non 17
excreatur, vomica oboritur. quæ rursus si .xl. diebus
non purgatur, tabes subit.
Pregnantibus senibusq; laterũ dolores letales sunt. 18
Aquilonibus, vere pleuretici fiunt, æstate item ac au 19
tumno pluuioso.
Pleuresis q̃ excreatiõib⁹ sanguineis nõ leuat, suppara 20
tiones interiores, vt diximus, aut exitiũ portedit.
Pulsus arteriæ distensus, pleuretico periculum mina 21
tur, præsertim si vires non sunt.
Salua nigra in .viii. die incipiens, pleureticis malum 22
presagium indicat.
Pthificis autumnus contrarius 23
Infantes a pthisi facilius liberantur 24
Pthificis pustulla in spatulis orta fabæ magnitudine vl 25
tra .lii. diem mortem minatur
Pleureticis nichil vtilius sanguinis missione, quib⁹ me 26
dicinæ stupefacientes plurimum nocent

- 17 Pleuretici qui conualuere, si rursus errore seu temeritate reciderint, haud dubio moriuntur.

¶ Collectionum

CAP. X

- 1  Aliditas stomachi non naturalis, lactuca com-
manducata conciliatur.
- 2 Stomacho equales medicinae propicie sunt.
- 3 Inexpertis aut dubiis leues primo vomitiones dari debent.
- 4 Exercitationes ante vomitum laudantur.
- 5 Ad vomitiones si vinum datur, copiosius bibi debet.
- 6 Biliosi estate ac meridie praesertim, tuto vomunt.
- 7 Cholera utiliter macris per vomitiones effunditur.
- 8 Qui leuamentum non praestat vomitus, inutilis est.
- 9 Crebrae vomitiones grauidis, auribus, dentibus, oculisq; nocent.
- 10 Sanguinem per vomitum emitti malum est.
- 11 Stomachi vulnus non sanatur.
- 12 Ad stomachum infirmum, varij humores effunduntur.
- 13 In ventre calido bilis generatur plurima, praesertim si cibis biliosus assumatur.
- 14 Frequens medicamentorum vsus, stomacho officit.
- 15 Stomachus qui faciliter sentit, temere quoq; leditur.
- 16 Mens commota nimia crapula, de facili discutitur.
- 17 Morbi ventriculi inextricabiles imbecillum hominem reddunt, obiter egre sanantur.
- 18 Ventris prospera habitudo, pingua adamat, quae & firmissimae materiae cibum facilius concoquit.
- 19 Veratro optime vere purgamus, autumno tolerabiliter si id in vsu est.
- 20 Ante veratri potum, pinguib⁹ & humidis vascendū est.
- 21 Veratrum egris non semper prodest, sanis semper nocet.
- 22 Pura corpora veratro leduntur. neruorum enim con-

Alexandri Benedicti

tractiones facit.

In omni stomachi cathartico aliquid stypticum addendum est. 23

In affecto stomacho, ubi materia dubia est, hiere compositio prodest. 24

Stomacho calido aqua gelida nocet usum non habenti. 25

Cum stomachum cathaplasmatibus refrigeras, ne pulmones aut iecur ledas cauendum est. 26

Oleosa & pingua stomacho inimica sunt. 27

Qui venerem coarguunt, stomacho consulunt. 28

Difficili vomitu stomachus vexatur. 29

Dolor stomachi ex aqua frigida interdum letalis est, ex quo & colicus dolor exoritur. 30

Si stomachi dolore pustula in dextro crure nascatur, in .xxvii. die agri exitum portendit, in quo tempore dulcia supramodum adamant. 31

Si ventris affectu pustula in supercilio orta nigra, fabae magnitudinis quae in ulceris genus mutetur, mortifera est. 32

Morborum fere omnium causa est stomachi infirmitas. 33

In longis morbis languens appetitus damnatur. 34

Sitim sedat somnus. 35

Stomacho sicco, corpus arescit, humido hydropis praenunciantur. 36

Stomachi habitudo sicca, diutina vix corrigi potest. 37

In fortiori stomacho cibus tenuissimae materiae viciatur. 38

In stomachi affectu, si super oculo ulceris genus paruum apparuerit ciceris magnitudine, pars rubens, partim viride, superueniatque mentis delirium in .xvii. die mortem portendit. 39

In leua dormire stomacho utile est, in dextra materiam per aluum educit. 40

- 41 Pueri amplexus citra sudorē stomachū corroborat.
- 42 Vomice stōachi calide siliq̃ egyptia sepe data medet̃
- 43 Ventris & intestinorum in fluxionibus acida eructa-
re, securitatis nota est.
- 44 Aluus nigra sanguini atro similis, repentina, periculo-
sa est, si etiam sine febre sit.
- 45 Nauseæ in pestilentia malum presagium est.
- 46 In decretorio tempore vomitus egrum a spasmo libe-
rat. idem & comitiales morbos & lethargiam sanat.
- 47 Contra singultus infinitos vomitus prodest, idem &
nephreticus utilis est.
- 48 Corporis vires proterit moeror, fames, dolor, nec mi-
nus grauis odor.
- 49 Sanguinis vomitiones, & nigra bilis malæ diiudican-
tur, deteriores quæ variant.
- 50 In febre sanguinē euomere periculosum est, alias quā-
doq; iuuat.
- 51 Vehementis clysterijs infusio vomitum sedat.
- 52 Si vomitus materia causa est, vomitiones medentur.
- 53 Calida pedes lauari, ac extrema fricari vomitiones se-
dant. Idem prestat & somnus.
- 54 Ex febre ardenti vel inedia frequēs singultus malum
augurium est.
- 55 Singultus infiniti ex ictu capitis letales sunt.
- 56 Singultus crebri, circa crissimum tempus, neq; spem
neq; metum promittunt.
- 57 Singultus sternutamento finitur.
- 58 Si vomitu singultus non discutiunt̃, ac erubescant ocu-
li, stomachi aut cerebri apostema significant.
- 59 Singultiētibus suppuratio in lateribus nata, in ortu so-
lis mortem presagit.

Alexandri Benedicti

- I**ecoris remedijs ducere ventrem ubi vrina
cienda sit vel contra, maxime damnatur. 1
Iecoris medicamenta vehementer contrita da
ri debent. 2
Abscessibus iecoris dulcia nocent, praesertim calida. 3
Epaticos stomaticosq; faciei color per se indicat. 4
Iecore male coquente, facies oculiq; tument. 5
Ventrís fluxus initio carnis loturę similis cum cibi ap
petentia frigora indicat, cū stomachi vero tedio hu
morum corruptorum nota est. 6
Vētris flux⁹, ubi corpus calidæ naturæ est, i virulentiā, 7
mox in fecē cōmutatur, quifāguis adustus dicit, cū
plurimum hæc omnia præcedit cholerica deiectio.
Ventrís profluuium, si corpus frigidum est, in cons 8
gelatum sanguinem, exinde in diuersam materiam
transformatur.
Deiectio rursus saniosa vel carnis loturę similis, infir 9
mam iecoris concoctionem ostendit.
Alba excrementa vixq; confecta, digerendi & attra 10
hendi vim inualidam significant, varia vero corrus
ptam digestionem ostendunt.
Rerimentorum leuitas albedoq;, attracticem virtus 11
tem viciatam indicat.
In fluxu sanguinis styptica remedia interdum nocēt, 12
obiter aperientia ac recreantia aromatis exiguo ad
dito ex mero præferuntur.
Iecoris dolore prurit⁹ occipitijs pollicisq; pedis, ac pu 13
sula citra colum nata, egrí perniciem die. iij. præsa
git, quod augurium vrinę difficultas, si affuerit, ma
gis confirmat.
Abscessus iecoris si ad lienem trāssertur, laudatur, edi 14
uerso periculosus est.

- 15 Abscessus, si calidus est, siue in dextro siue i sinistro latere, egrum plurimum inquietat.
- 16 In morbo arcuato durū fieri iecur perniciosissimū est.
- 17 Puro iecoris apostemati, nullum pręsidium est, si vetus malum est.
- 18 Passum iecorariam ventris deiectionem facit.
- 19 Ventris profluuium quo corpus affligitur, si contrahitur, leuat. si profluit, ledit. ac ediuerso.
- 20 Senibus in longa valitudine fluxus metum facit.
- 21 Aqua intercus vitio iecoris fere semper oritur.
- 22 Lienis magnitudo hydropa minatur, vel corporis maciē.
- 23 Hydropisis nocetior est quę ex acuto morbo oritur, vel quę in calido ac sicco corpore incepit.
- 24 Hydropici ex lienis q̄ ex iecoris duricie facilius sanantur.
- 25 Ex longa hydropē, dyspnœa, aut crebri anhelitus, ventrisq̄ profluuium, triduo interitum pręnunciat.
- 26 Gingiuarū & oris vlcera in hydropē mortē minantur.
- 27 Aqua quę cutem subierit, si simul omnis effunditur, letalis.
- 28 Hydrops quę iecoris apostemati superuenit, difficulter sanatur.

Collectionum

CAP. XII.

- 1 **D**ysentericis post aurem sinistrā enata pustula erui magnitudine, sitisq̄ interueniens in xx. die, mortis presagia sunt.
- 2 Intestinorum & stomachi leuitas, quę torminibus oritur, egrum pręcipitat.
- 3 Alui deiectiones ex atra crassaq̄ bili non sanantur.
- 4 Aquosa deiectio quę mox vnctioni similis profluit, damnatur.
- 5 In dysentericis neruorū cōtractiones, vomitiones, sine

Alexandri Benedicti

- gultus crebri, ac dementia deniq̃, dira auguria sunt. 6
Balbi ventris fluxu facile periclitantur, alias (vt dixi- 7
mus) egre medicamentis purgantur.
Si in pueritia mollis est aluus, eadem in senectute con- 8
trahitur. & ediuerso.
Qui ventris profluuium moriuntur, ijs primū vena for- 9
micans percipitur, mox intermoritur pulsus.
Iliacus morbus, nisi resolutus est intra .vii. diem, leta- 10
lis est.
Colicus dolor vi pestifera quādoq̃ regiōes & prouin- 11
cias occupat, letiferaq̃ contagia imitatur.
Febricula colicos dolores sanat si ex spiritu vel fleg- 12
mate oriuntur.
Ex iliacis doloribus vomitiones & singultus crebri ac 13
deliratio, dirum augurium faciunt.
Ex stranguria iliacus dolor, in .vii. hominem rapit, 14
nisi febris cum sudore presidium afferat.
Pregnantibus tenasmus exitialis est. 15
In febris initio mortuae tinea, in remissione vero viuæ 16
per aluum transmissæ spem prænunciant.
Cum hemorroydas resecamus, singulatim eas aufe- 17
rimus. in qua curatione, vna demū dimittēda, alio-
quin egro exitium minari.
Ani fistula interius secanda non est, alioquin inuolū- 18
tario excrementa emittuntur.

¶ Collectionum

CAP. XIII.



- S**Enum exulcerationes q̃ vesicæ facilius sanan- 1
tur.
Vesicæ calculi pueritiā, renum vero sene- 2
ctutem infestant.

- 3 Calculi morbus ad posteros transit, ideo hereditariū malum dicitur
- 4 Pinguiores, renum calculi, vesicæ vero maciem sollicitant.
- 5 Vrinę difficultatibus, si tenasmus superuenerit in. vii. die exitium portendit, nisi profluuium malo subueniat.
- 6 Melancholicos iuuat moderata venus
- 7 Nīmia venus corpus eneruat, & febres acutas & ardentes excitat, colicosq; dolores irritat.
- 8 Oris graueolentia, nīmia quandoq; oboritur venere.
- 9 Infirmi stomacho tutius venerem negligunt.
- 10 A crapula vel inedia libido dānatur.
- 11 Corruptur nīmia salacitate foecunditas.
- 12 Ebrietas conceptum inhibet.
- 13 Pedes oleo feruentis naturę peruncti venerem stimulant.
- 14 Viri hyeme, foemineę estate salaciores sunt.
- 15 Qui nudis pedibus ambulant, libidinem extinguunt.
- 16 Veneris imaginationes nocturnas leuat semen lactu-
cę ex vino potum.
- 17 Vuluę viciis iecoris habitus corrumpitur. vnde aqua intercus sepe oritur.
- 18 Steriles foeminas infirmas esse, verum foecundas cele-
rius senescere haud dubium est.
- 19 Si nidor foeminarum naturalibus subditus ori respō-
det, foecunditatis nota est.
- 20 A mensibus si natura humens est, conceptus non ad-
mittit.
- 21 Vbi hyemem nothus, ac ver aquilo perflant, abortiē-
di periculum est.

Alexandri benedicti



- Māmis cucurbitula imposita mulierū mēstrua sistit 22
Si grauidis vbera emoriuntur, abortus imminet 23
Vbi gemini in vtero sunt, si alterum vber emoritur, al- 24
terum partum enectum esse indicium est.
Pregnantem citra quartum aut vltra septimum men- 25
sem purgare, metus est.
Quibus menses in totum premature subsistunt, citi- 26
us moriuntur.
Vulue strangulationes quę retardatis mensibus fiūt, 27
minoris periculi sunt q̃ quę retento genitali semine 28
accidunt.
Vulue strangulatus autumnno magis sentiuntur. 29
Suffuse sanguine mamme furorem venturum esse te- 30
stantur.
Mulier sanguinem vomens profusis menstruis libe- 31
ratur.
Quę mēsis nō purgatur, sanguinis ex naribus pro- 32
fluuiō tuta est.
Locis laborantibus, aut difficulter parientibus, sternal- 33
tamenta profunt.

¶ Collectionum. CAP. XIII.

- Inum ieiunis potum articulis nocet. 1
 Podagrici morbi a maioribus sæpe contra- 2
huntur.
 Ver podagras magis incitat, autumnus mi- 3
nus excitat.
Podagræ veteres quæ vario humore proueniunt, sa- 4
nari non possunt.
Podagras quadoq; varices ortæ sedant. 5
Coxæ dolor ex cruditate oritur, verum & locorū do- 6
lore sæpe contrahitur.

- 7 Articularius morbus membra resoluit.
- 8 Ischiadicos inurere summum presidium est.
- 9 Biliosa podagra quæ medicamentorum usu nimio premitur, perniciem minatur.
- 10 Huic item vomitus magis quàm deiectionis subuenit.
- 11 Articulorum vitia, si iuuenes tentarunt, neque callum induxerunt, solui possunt, maximeque torminibus, aut alui deiectione.
- 12 Infaniam emendant varices enatae, aut per ora venarum subita sanguinis profusio, aut tormina.
- 13 Membra quæ resoluuntur, si non mouentur & macrescunt, in pristinum habitum non reuertuntur, magisque si vetus malum est, vel senectuti acciderit.

Collectionum CAP. XV.

- 1  Mnia exiccantia non mordentia carnem alunt.
- 2  Ulcera in alia parte corporis quàm in carne sita, omniaque quæ rotunda sunt, difficulter complentur.
- 3 Instans suppuratio discutienda est, subsistens resolueda, incresecens utroque modo oppugnanda est.
- 4 Cera inter vinctiões additur, ne rerum vires protinus elanguescant.
- 5 Gulæ vlcus ex vulnere, cum plurimum letale est.
- 6 Viscida atque stiptica vi, cicatricem inducimus.
- 7 Ulcera exiguo nutrimento vincuntur, balneoque initio leduntur.
- 8 Suppuratis, vulneribus ve neruosis, linamento opus non est.

¶ Alexandri Benedicti Physici collectionū medicinalium FINIS.

Nicolaus Perottus Bartholomeo Traiano .S.

Hodie inter versandū nōnullos libellos meos, codex quidam Hippocratis michi in manus incidit, philosophi mediciq; vt antiquissimi ita optimi. Eum cū (vt fieri solet) aperuissem legereq; vel potius relegere cepissem, æque admiratus sum & singularē viri facundiā, & summā integritatē. Erat enim in principio libri iusiurādū eius, optimū sane testimoniū illius eloquētię & virtutis. Id ego latinū feci, tibiq; & amicissimo michi & in philosophia ap- prime erudito, ac iam medicinę studiis incūbenti, cōfē- stim misi. vbi si eloquētiā eius non potui imitari, saltē sententiā effinxi. quo vt tu ita p te ceteri qui medicinę dant operā, quales esse debeāt ab Hippocrate discāt.

Hippocratis iusiurandum.

Est or apollinē medicū, & Esculapiū, Hygi- āq; & Panatiā Esculapij filias, & deos, ac deas oēs, me (q̄tū i me erit & q̄tū ingenium meū valebit) hęc oīa obseruaturū q̄ hoc iu- reiurando atq; his tabellis cōtinentur. Tributurū me p̄ceptorī in eo a quo hęc artē edoctus sum non mī- nus q̄ parenti a quo sum genitus, vitā cū eo cōmunica- turū. Res omnes quas illi necessarias esse intelligā pro virib⁹ meis sūministraturū, progeniē eius, fratrū loco habiturū. hęc artē sine mercede & sine pactiōib⁹ edo- cturum. P̄cepta omnia libere & fideliter traditurū, meis & p̄ceptoris mei liberis ceterisq; discipulis q̄ se le- gibus medicinę astrixerint atq; iurati fuerint, alij p̄- terea nemini. In curandis egrotis pro virib⁹ & p̄ inge- nio meo rebus necessarijs vsurū, nemini egritudinē di- laturū, nichil per iniuriā facturū. Rogatū mortale ve- nenum nemini daturum, neq; id cuiq; cōsulturū, neq;

mulieri pregnantī ad interficiendū conceptū foetū po-
tionē porrecturū. vitam meā atq; artem meā puram
atq; integrā seruaturū, laborātis lapillo haudq̃q̃ exci-
surū, sed expertis hui⁹ artis hoc negociū permissurū,
quancūq; domum ingressus fuero, dūtaxat liberādis
ægotis operā daturū. omnē iniuriā, omnē corrupte-
lam, omne genus turpitudinis, res etiā venereas spōte
mea euitaturū, siue muliebria corpora curauero, siue
virilia, siue hominis liberi, siue serui, quę inter curādū
vel videro, vel audiero, vel etiam extra curā in vita ho-
minum cognouero quæ reticēda esse intelligā, nemini
aperturū, sed intemeratam taciturnitatē seruaturum.
Præseus igitur iusiurandū integre atq; incorrupte ser-
uantī michi omnia tā in vita q̃ in arte mea p̃spera fœ-
liciaq; succedant, & gloria in eternū parata sit. Trans-
gredienti vero atq; periuro, cōtraria oīa eueniant.

FINIS.

CImpressum in alma Parisiorū academia Per Hen-
ricum Stephanum artis formulariæ industriū
opificem/ ex opposito scholæ Decretorū ha-
bitantē. Anno domini omnium autho-
ris & conseruatoris millesimo quin-
gentesimo quartodecimo
pridie Nonas
Ianua-
rias.

